四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一四三冊目次

證治準繩六種四十四卷（五）（明）王肯堂撰　明萬曆三十年至三十六年刻本　○○一

證治準繩六種四十四卷（五）

（明）王肯堂撰

明萬曆三十年至三十六年刻本

心

金壇王肯堂宇泰甫輯

錢心主驚　實則叫哭發熱飲水而搐虛則困臥悸動不安　心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也導赤散主之　心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合面臥　心氣實則氣上下行澁若合面臥則氣不得通故喜仰臥使氣得上下通也瀉心湯主之　心病見冬火旺心勝腎也當補腎治心輕者心病退重者下竄不語腎怯虛也補腎地黃丸治心瀉心湯

潔心主熱自病或大熱瀉心湯主之　實則煩熱黃連瀉心湯主之　虛則驚悸生犀散主之　肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之　肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大靑丸主之　脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之　腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之

劉凡心臟得病必先調其肝腎兩臟腎者心之鬼肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求於肝淸其源也五臟受病必先傳其所勝水能勝火則腎

之受邪必傳於心故先治其腎逐其邪也故當退腎氣益肝氣兩方或診其脉肝腎兩臟俱和而心自生疾然後審其心家虛實治之　薛仰面臥者因其心胸實熱故喜仰面而向虛也合面臥者因心胸虛熱故喜合臥而就實也實則調治心肝虛則調補脾肺二者別之盡其狀矣其咬牙等證多有雷同不必拘泥如用瀉心導赤等劑邪氣雖去而病仍作當調補元氣或反甚急溫補元氣其心氣冬見或亥子時病益甚或下竄不語者乃腎水虛而心火甚也用地黃丸其乳下嬰兒須母服之　若叫哭發熱作渴飲水[illegible]搐有力仰面而睡者屬心經實熱用瀉心湯導赤[illegible]發熱飲湯抽搐之力驚竄咬牙合面而睡者屬心經虛熱用補心散若喘嗽面赤壯熱飲水肺乘心也用瀉白散若搖頭劄目身熱抽搐肝乘心也用柴胡淸肝散若合目昏睡泄瀉身熱脾乘心也用瀉黃散若竄視驚悸咬牙足熱腎乘心也用安神丸

海心苦緩急食酸以收之五味子　心欲輭急食酸以輭之芒硝　以鹹補之澤瀉　以甘瀉之人參黃芪甘草　心虛以炒鹽補之虛則補其母肝母以生薑補肝如無他證錢氏安神丸是

子143-002

安神丸錢氏　治心虛疳熱神思恍忽
麥門冬去心焙　馬牙硝　白茯苓
乾山藥　寒水石研　甘草各半兩
硃砂壹兩研　龍腦壹字研
右末之煉蜜為丸芡實大每服半丸沙糖水化下
無時
入物定志丸錢氏　補益心神安定魂魄治痰去胸中
邪熱理肺腎
人參壹兩半　菖蒲　遠志去心
茯神去心　茯苓去皮各壹兩　硃砂壹錢

白朮　麥門冬去心各半兩　牛黃貳錢另研
右為細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下三十丸無
時
髓竭不足加生地黃當歸　肺氣不足加天門冬
麥門冬五味子　心氣不足加上黨參茯神菖蒲
脾氣不足加白朮白芍藥益智　肝氣不足加
天麻川芎　腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮
膽氣不足加細辛酸棗仁地榆　神昏不足加硃
砂預知子茯神
心實以甘草瀉之如無他證重則瀉心湯輕則導赤
散
瀉心湯錢氏　瀉丁心
黃連去須壹兩
右為極細末每服一字至半錢壹錢臨臥溫水調
下　海藏云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也
實則瀉其子
導赤散錢氏　瀉丙小腸
生乾地黃　木通　甘草各等分
右同為末每服叁錢水壹盞入竹葉同煎至伍分
食後溫服　一本不用甘草用黃芩

論瀉心散導赤散瀉心小腸實火之劑蓋心為脾
母脾為心子然心既病則脾土益虛矣用者審之
生犀散錢氏　治心經虛熱
生犀錯取末貳錢　地骨皮自採佳　赤芍藥
柴胡根　乾葛各壹兩剉　甘草半兩炙
右為麤末每服壹貳錢水壹盞煎至柒分溫服食
後
論前方云治心經虛熱其所用藥多屬瀉心瀉肝
脾之劑虛熱二字恐錯誤也如心經自病而血虛
熱者用秘旨安神丸脾虛奪心之氣而熱者用秘

旨補脾湯肝木不能生心火而虛熱者用地黃丸

秘旨安神丸　治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參　半夏湯泡　酸棗仁炒

茯神各壹錢　當歸酒洗　橘紅

赤芍藥炒各柒分　五味子伍粒杵　甘草炙叁分

右爲末薑汁糊丸芡實大每服壹丸生薑湯化下

發熱

辨證 錢 風溫熱壯熱相似　潮熱時間發熱過時即止來日依時又熱此欲發驚候也　壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也　風溫者身不熱而口中氣熱又有風濕證者但溫而不熱　傷寒熱口熱呵欠頓悶項急曾云傷寒熱十[illegible]鼻流清涕發熱無汗面[illegible]右腮有紫紋　痘瘡熱噴嚏悸動耳尖冷曾云麻豆熱面赤足冷身發壯熱呵欠頓悶咳嗽噴嚏時或作驚腹脹自啼及中指爪冷者是也　變蒸熱脣上白泡珠起耳冷曾云變蒸熱氣[illegible]驚少哯乳寫黃上脣失有小泡如水珠子即變蒸也不須用藥攻治　疳[illegible]熱面黃臭炭土羸瘦鼻下赤爛　驚風熱發搐悸顫脈數煩躁顛叫恍惚曾云驚風熱偏身發熱面光自汗心悸不寧脈數頻躁治法與急驚證同所用藥餌必先解表

湯 小兒之病惟熱居多夫熱有潮熱驚熱夜熱餘熱食熱疳熱壯熱煩熱積熱風熱虛熱客熱癖熱寒熱血熱瘡疹熱十六者大同而小異熱之始發必有所因也其潮熱發歇有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發旦止餘熱寒邪未盡食熱肚腹先發疳熱骨蒸盜汗壯熱一向不止煩熱心躁不安積熱頰赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定痰熱涎嗽飲水寒熱發如瘧狀血熱辰巳發熱

瘡疹熱耳鼻尖冷諸證得之各有所歸其間或有三兩證交互者宜隨其輕重而處治之

薛小兒之熱有肝心脾肺腎五臟之不同虛實溫壯四者之不一及表裡血氣陰陽浮陷與夫風濕痰食各當詳之心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯熱飲水巳午時益甚肝熱者左頰先赤便難轉筋尋衣捻物多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚脾熱者鼻上先赤怠惰嗜臥身熱飲水遇夜益甚肺熱者右頰先赤手掐眉目喘咳寒熱飲水日西熱甚腎熱者頦下先赤兩足熱甚骨蘇蘇如蟲蝕熱甚不能起於牀夜間益甚仍當辨其虛實實則面赤氣麤口燥唇腫作渴飲冷大小便難或掀衣露體煩啼暴叫伸體而臥睡不露睛手足指熱宜用表下虛則面色青白恍忽神緩口中虛冷噓氣軟弱喜熱惡寒泄瀉多尿或乍涼乍溫怫鬱驚惕上盛下泄夜則虛汗屈體而臥睡而露睛手足指冷宜用調補壯熱者肢體大熱熱不已則發驚癇溫熱者肢體微熱熱不已則發驚搐陰虛則內熱陽盛則外熱以手輕捫之則熱重按之不熱此皮毛血脉之熱熱在表也重按之筋骨之分則熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在裡也不輕不重按之而熱此肌肉之熱熱在表裡之間也以虛實分屬表裡而言之壯熱惡風寒爲元氣不充表之虛熱也壯熱不惡風寒爲外邪所客表之實熱也壯熱飲湯爲津液短少裡之虛熱也壯熱飲水爲內火銷爍裡之實熱也若夫內外皆熱則喘而渴齒乾煩寃腹滿四肢熱逢風寒如炙於火能冬不能夏是皆陽盛陰虛也脉尺寸俱滿爲重實尺寸俱弱爲重虛脉洪大或緩而滑或數而鼓此熱盛拒陰雖形證似寒實非寒也熱而脉數按之不鼓此寒盛格陽雖形證似熱實非熱也發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脉洪大按之無力或兼目痛鼻乾者此血虛發躁也當補其血如不能食而熱自汗者氣虛也當補其氣仲景論內外不足發熱自汗之證禁不可發汗如飲食勞役雜病發熱誤發其汗則表必虛也身熱而汗出者風也發熱身疼而身重黄者濕也增寒發熱惡風自汗脉浮胸痞者痰也發熱頭痛脉數者食也寸口脉微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脉弱爲陰不足陽氣下入陰中則發熱陰陽不歸其分則寒熱交爭也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也晝則發熱煩躁夜則安靜是重陽無陰也當亟

瀉其陽峻補其陰至若身熱脈弦數戰慄而不惡寒者癉瘧也發熱惡寒脈浮數者溫病也若四肢發熱口舌咽乾是火熱乘土位濕熱相合故煩躁悶亂也若身體沉重走注疼痛乃濕熱相搏風熱鬱而不得伸也

錢肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之　薛肝熱者左頰先赤便難轉筋多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚宜瀉青丸柴胡飲子

心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也導赤散主之心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合面臥　薛心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯熱飲水巳午時益甚宜瀉心湯導赤散安神丸

脾熱則目黃肚大怠惰嗜臥身熱飲水四肢不收瀉黃散主之　薛脾熱者鼻上先赤其熱在肌肉遇夜益甚

肺熱手掐眉目鼻面甘桔湯主之咳嗽寒熱壯熱飲水涼膈散主之若肺虛熱唇深紅色少服瀉白散　薛肺熱者右頰先赤日西熱甚輕則用瀉白散重則用涼膈散及地骨皮散

腎熱兩足不喜衣覆地黃丸主之　薛腎熱者頦下先赤兩足熱甚骨酥酥如蟲蝕熱甚不能起於牀夜間益甚宜用滋腎丸

瀉青丸見肝臟　瀉心湯

導赤散　安神丸並見心臟

瀉黃散見脾臟　瀉白散見肺臟

梔子清肝散一名柴胡梔子散　治三焦及足少陽經風熱發熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛寒熱往來

柴胡　梔子炒　牡丹皮各壹錢

茯苓　川芎　芍藥

當歸　牛蒡子炒各柒分　甘草叁分

右水煎服

柴胡清肝散　治肝膽三焦風熱怒火或乍寒乍熱往來寒熱發熱或頭髮瘡毒等證

柴胡壹錢半　黄芩炒　人參

川芎各壹錢　山梔炒壹錢半　連翹

甘草各伍分　桔梗捌分

右水煎服

柴胡飲子　解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脈洪實

弦數大便堅實

黄芩柒分　甘草肆分　大黄捌分

芍藥柒分　柴胡　人參各伍分

當歸壹錢

右每服壹錢薑水煎

龍腦飲子　此瀉脾經熱可代瀉黄散用治小兒蘊熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡臥不寧及除痰熱咳嗽中暑煩躁一切風壅

甘草炙肆兩　大梔子炒叁兩　藿香葉半兩

石膏壹兩　縮砂一　括蔞各柒錢半

右爲末每服壹錢蜜水調服不拘時治傷寒餘毒潮熱虛汗加竹葉煎服

滋腎丸　治腎熱

黄栢酒拌炒焦叁錢　知母貳錢　肉桂伍分

右爲末熟水丸桐子大每服二十丸至三十丸食前百沸湯下

實熱小兒實熱者頭昏頰赤口內熱小便赤澁狀如豆汁大便堅鞕或秘澁不通腹急宜四順飲子大黄朴硝湯八珍散畧挨動臟腑即安　**陽實**則面赤濃黄氣麤口熱燥渴唇腫大小便難掀揭露衣煩啼暴叫宜四順清涼飲加柴胡　薛氏又有伸體而臥睡不露睛手足指熱等證　按實中宜分表裏表實宜汗裏實宜下半表半裡宜和解今一以利下爲主非通論也治法并方更於後表裏條內求之　雲岐云小兒實熱在內者四順飲之類在上者吐之　丹溪云小兒熱病六一散妙藥也

孝先生三解牛黄散　治實熱潮熱

白殭蠶炒去絲嘴　全蠍炙　防風

白附子　桔梗　川大黄

甘草炙　白茯苓　川黄芩

人參　川鬱金皂角水煮

等分末服半錢壹錢薄荷蜜湯調

牛黄涼膈丸　治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡臥不安口乾多渴唇焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

牛黄壹兩壹分　甘草爁拾兩　寒水石

牙硝枯　石膏各貳拾兩　紫石英飛

腦麝各伍兩　膽星柒兩半

末之蜜丸每兩作叁拾丸温薄荷人參湯嚼壹丸食後服常服半丸治急驚茲薄荷水化

【虛熱】虛熱者，因患後平復，而氣未勻，四體羸弱，時多發熱，治宜調氣補虛，其熱自退。如錢氏白朮散、異功散、四君子湯之類。或未退，人參生犀散治之。【楊虛】多則面色青白，眺忽神緩，口中清冷，嘘氣軟弱，泄瀉多尿，夜出虛汗，宜惺惺散。　薛又有寒熱惡寒作涼作溫，拂鬱驚惕，上盛下泄，煩燥而臥，睡而露睛，手足指冷等證。　曾虛熱因病後發熱無時，一日三五次者，此客熱乘虛而作，先以四君湯加黃芪、當歸，溫米清湯調服，次投錢氏白朮散，或四順湯，常帶涼服，及用溫膽湯，參入涼水送下黑錫丹，固守元氣。　海藏云：風熱邪熱，四君子湯加生薑、荊芥煎。　雲岐云：小兒客熱在內，先用導赤散，次用瀉黃散。　薛氏以虛實分屬表裏，及熱盛拒陰，寒盛格陽，血虛氣虛發熱等證，俱仲景、東垣諸賢辨論妙法，宜詳玩而熟記之，則虛熱似實熱之證，庶幾不至誤認，而全活眾矣。

【錢朱】監簿子五歲，忽發熱，醫曰此心熱也，頰赤而唇紅，煩燥引飲，遂用牛黃丸三服，以一物瀉心湯下之，來日不愈，反加無力而不能食，又下之，便利黃沫。錢曰：心經虛而有留熱在內，必被涼藥下之，致此虛勞之病也。錢先用白朮散生胃中津液，次以生犀散治之。朱曰：大便黃沫如何？曰：胃氣正，即瀉自止，虛熱也。朱曰：醫用瀉心湯如何？錢曰：瀉心湯者，黃連一物耳，黃連性寒，多服則利，能寒脾胃也。坐久，眾醫至，皆曰實熱。錢曰：虛熱。若實熱，何以瀉心湯下之不安，又加面黃頰赤，五心煩躁，不食而引飲？醫曰：既虛熱，何大便黃沫？錢笑曰：便黃沫者，服瀉心湯多故也。錢與胡黃連丸治愈。　鄭人齊郎中者，家好收藥散施，其子忽臟熱，齊自取青金膏三服，并一服餌之，服畢至三更，瀉五行，其子困睡，齊言子睡多驚，又與青金膏一服，又瀉三行，加口乾身熱，齊言尚有微熱未盡，又與青金膏。其妻曰：用藥十餘行未安，莫生他病否？召錢氏至，曰：已成虛羸。先用前白朮散，時時服之，後服香瓜丸，十三日愈。　嘉靖甲寅，敬臣之女年十二，患脾胃素弱，自夏入秋，時瀉時止，小腹微痛，至八九月間遂成痢疾之證，發熱凡二十餘日不止，汗泄熱解，汗已復熱，自中脘至小腹膨脹堅硬，大便溏，氣喘咳嗽作嘔，俱晝輕夜重，徹夜煩躁不睡，身寒服暗，譫語，其母以為必死矣。立齋先生診之曰：脈浮大而無根，此大虛證也，非獨參湯不可。乃用參壹兩，加熟附子分，煨生薑三片，日進二劑，仍併查煎服之，大下痢積，其氣則

脾腹漸覺熱漸減脈漸斂然手猶尋捻不已鼻孔出血先生曰此肝經也煎六味丸料與之一服如脫乃晝服獨參并附湯夜服六味丸料脈漸有根諸證漸退先此手足恒熱至是乃始覺寒先生喜曰此病邪盡退而真氣見矣然猶飲食不進乃單用六君子湯加炮薑遂能食咳嗽獨甚與補中益氣湯嗽遂止夜始有睡凡弱女之得生皆先生力也向非先生卓有定見專治其本而其末自愈則為舌中之骨必矣敬肯施療之顛末以告同患此者幸無所惧亦推廣先生一念之仁於萬一云爾王敬臣書

惺惺散 方見痘疹

錢氏白朮散 方見渴

異功散 方見吐瀉

人參生犀散 見後條

固真湯 見驚長

黑錫丹 見雜病

當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴晝夜不息其脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白虎湯必死宜此主之

黃芪 叁錢　當歸 錢壹

右水煎服

補中益氣湯 治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等證

人參　黃芪炒　白朮

甘草　陳皮各五分　升麻

柴胡各三分　當歸一錢

右薑棗水煎空心午前服

加味逍遙散 即逍遙散加牡丹皮山梔 治肝脾血虛等證

當歸　甘草炙　芍藥酒炒

茯苓　白朮炒　柴胡各壹錢

牡丹皮　山梔炒各伍分

右水煎服

愚按前方若乳母肝脾血虛內熱寒熱徧身搔癢肢體作痛頭目昏重怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛胸乳腹脹小便不利致兒為患者宜用之又治婦人陰虛發熱兒飲其乳以致患瘡者

表裏 錢身熱不飲水者熱在外　身熱飲水者熱在內　海內服飲子治熱在內而不飲　迎退飲治熱在外而不飲　潔壯熱惡風寒為元氣不充表之虛熱也壯熱不惡風寒為外邪所客表之實熱也壯熱飲湯為津液短少裏之虛熱也壯熱飲水為內火銷

燥渠之實熱也按傷風惡風傷寒惡寒豈可以惡風寒爲元氣不足而不惡風寒爲外邪所客乎薛氏之意亦同而治則滯擬人前說可見參須以東垣外感內傷辨論詳之則無失矣

表熱 表者六熱而二便調和風邪結於表而發者用惺惺散加麻黃汗之

敗毒散　治傷風瘟疫風濕頭目昏眩四肢作痛增寒壯熱項強睛疼或惡寒咳嗽鼻塞聲重

柴胡　前胡　川芎

枳殼炒　羌活　獨活

茯苓　桔梗　人參各壹兩

甘草半兩

右爲末每服貳錢生薑薄荷水煎

消風散　治小兒解脫致令風邪客於皮毛入於藏府則令惡風發熱胸膈痰涎目澀多睡詳見風門九

清解散　治感風發熱頭疼鼻塞涕流及溫壯惡主之

北參　防風　天麻

北前胡　茯苓　北梗

枳殼生　甘草各等分　細辛

柴胡錢半　川芎錢

右末每服二錢水小盞薄荷乾葛煎溫和服

集驗荊朮散　治小兒傷風傷寒或瘡或疹此藥無寒無熱疏風順氣一切瘡疹

荊芥穗　赤芍藥各　蒼朮制貳兩

甘草兩半

細末隨大小二三錢又名沖和散　傷風傷寒壯熱咳嗽鼻塞聲重生薑葱白湯下　傷風潮熱或變蒸發熱薄荷湯下　風熱傷肺鼻塞氣壅紫蘇湯下　暴卒急驚風熱宜急驚門疏風散　久病後急慢驚熱保嬰全蠍散　發汗去節麻黃湯調　盜汗白汗牡蠣浮麥湯調　丹毒風熱煎四順飲湯調　眼暴赤熱肺熱羌活黃芩生地黃湯調　口舌腮項熱肺生瘡煎防風牛蒡子湯調　咽喉重舌煎升麻枳殼大黃防風薄荷湯調

人參羌活散　治傷寒發熱頭痛身疼或潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活　白獨活　柴胡

川芎　人參　甘草炙

白茯苓　枳殼麸炒各壹兩　前胡

桔梗　地骨皮　天麻各半兩
㕮咀每服貳錢水半盞薑三片棗半個薄荷壹葉煎
溫服無時瘡疹未發亦可服
羌活散　治傷風時氣頭痛發熱身體煩疼痰壅咳
嗽失音鼻塞聲重及解時行下痢赤白
人參去蘆　羌活　赤茯苓去皮
柴胡去蘆　前胡去蘆　川芎
獨活　桔梗各等分　枳殼
蒼术　甘草各壹兩
右剉每服貳錢水壹盞薑二片薄荷三葉煎柒分

無時溫服發散風邪入葱白同煎痢證入倉米煎
人參羌梗湯　治小兒傷風發熱鼻塞咳嗽時行瘡
疹
人參柒分　細辛伍分　桔梗
乾葛　升麻　白术
茯苓　柴胡各伍分　薄荷
甘草各伍分
每服水壹鍾薑三片煎伍分不拘時服
紅綿散　治小兒四時感冒寒風遍身發熱變蒸諸
驚胎驚丹毒等熱並皆治之及急慢驚風亦宜服
之
人參貳錢半　天麻　殭蠶炒
麻黃去節　全蝎去毒　甘草炙
辰砂另研
右件爲末然後入硃砂和勻再研極細每服半錢
用水半盞煎數沸入乾胭脂少許再煎一沸溫溫
服不拘時
惺惺散見瘡疹
四順清涼飲　治小兒血脉壅實臟府蓄熱頰
赤作渴五心煩熱睡臥不安四肢驚掣及因乳哺

不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調大小便
澀欲發驚癇或風熱結核頭面生瘡目赤咽痛瘡
疹餘毒一切壅滯欲熱泄瀉不止加木香煨大黃
赤芍藥　當歸　甘草
大黃各等分
判碎每歲小兒用貳錢水陸分薄荷貳葉煎捌玖
沸去查不拘時服小便不通加燈心木通
大黃朴硝湯　治小兒驚熱涎風前後不通
川大黃　甘草　朴硝各壹兩
右剉碎每服貳錢水半盞入蜜少許煎至叁分不

拘時服

柴胡飲子　治傷寒五六日發熱潮熱大便秘乳母多服

柴胡　人參　芍藥
當歸　黄芩　大黄
甘草炙各半兩

㕮咀隨大小加減煎

五和湯　主宣利臟府積熱調和榮衛

當歸去蘆　赤茯苓去皮各半兩　甘草炙
大黄　枳殼水浸去瓤剉片麩炒黄各半兩

右件㕮咀每服貳錢水壹盞煎柒分無時溫服

寬熱飲　主伏熱在裏風壅滿氣促昏悶或脾胃停滯口久飲食減少而黄脉實發熱無時並宜服之

枳殼去瓤壹兩剉片巴豆拾伍粒作貳片去殼膜心同炒枳殼見微黄色去巴豆
大黄剉壹　粉草半炙錢　玄明粉半貳錢

右前叁味剉焙爲末臨入玄明粉乳鉢内同前藥末杵勻無時調服半錢至壹錢兒小者抄壹字並用蜜湯或薄荷湯

三黄丸　治三焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心膈煩躁不美飲食大小便秘澀五臟實熱或下鮮血痔瘡熱瘡

黄連　黄芩　大黄煨各等分

右爲末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸白滾湯下量大小加減服

表裏俱熱　七寶散　治小兒溫壯伏熱傷寒煩躁面赤氣喘夜熱曉涼此藥涼心臟消風熱

川大黄煨　赤芍藥　甘草炙
川當歸各貳錢半　麻黄　白朮
荊芥穗各貳錢

右爲末壹歲壹錢水半盞葱白壹寸薄荷壹葉煎

至叁分不拘時溫服

雙解飲子　即通聖散合六一散方見傷寒太陽病發熱條

白虎湯　治傷寒或吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲數升者宜服之又治夏月中暑汗出惡風寒身熱而渴

知母叁兩　甘草炙兩　石膏捌兩另研
糯米叁合

右每服貳錢水煎至米熟爲度

半表半裏熱　小柴胡湯　治傷寒溫熱身熱惡風頭

痛項強四肢煩疼往來寒熱脇痛耳聾咳嗽痰實
中暑瘧疾並服之方見瘧疾
愚按前方若肝膽經風熱肝火瘰癧寒熱往來日
晡發熱潮熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或
脇痛胠滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或肢體搐
動唇目抽劄及乳母有前證致兒爲患者並宜服
之

【餘熱】餘熱者謂寒邪未盡傳經之遺熱也仁齋曰傷
寒汗下後而熱又來乃表裏俱虛氣不歸元陽浮於
外不可再用涼藥蓋熱去則寒起古人戒之法當和

胃氣使陽氣收斂歸內其熱自止宜以參苓白朮散
主之 【愚按】有小兒熱證用表裏藥後其熱俱退既退
復熱者何也蓋蒸熱至此則以除來或再解表攻裏或
施涼劑熱見愈且以陰陽辨之何者爲是推其原乃
表裏俱虛而陽浮於外陰伏於內所以又發熱宜用
溫平之藥和其裏則體熱自除按錢氏白朮散去木
香加扁豆水煎及黃耆六一湯安神散自然平復若
日久汗多煩渴食減脈微緩者飲熱可服真武湯雖
附子性溫取其收斂陽氣內有芍藥性寒一寒一溫
停分得宜用之無不驗矣 【愚按】汗後血虛而熱益甚

者六神散加粳米汗後氣虛而惡寒發熱者補中益
氣湯汗後陰虛陽無所附而熱者用四物湯加參耆
汗後陽虛陰無所附而熱者用四君湯加芎歸

實脾散 治小兒餘熱不除

川芎 茯苓 甘草
白朮

右剉散用水煎食遠服

參苓白朮散 主脾胃虛弱飲食不進多困少氣中
滿痞噫嘔吐逆此藥不寒不熱性味和平常服調
脾悅色順正去邪

人參去蘆 白茯苓去皮 粉草
白朮 白扁豆如蒸製 山藥去皮
縮砂仁 薏苡仁 桔梗剉炒各壹兩
蓮子肉去心

右剉焙爲末每服半錢至壹錢用棗湯空心調服
或溫米湯亦可

安神散 治吐瀉者病後心虛煩悶觸物易驚氣鬱
生涎涎與氣搏睡不利寧預防變生他證

人參 白茯苓 半夏製
甘草炙 陳皮去白 枳實製各壹錢

右剉每服貳錢水壹盞姜貳片棗壹枚竹茹小團
煎柒分無時溫服有微熱渴入麥門冬去心同煎

簡易凝神散 治小兒經汗下熱去復作收斂胃氣
清涼肌表神效

人參 白朮 白茯苓
山藥 扁豆 粳米
知母 生地黃 甘草各半兩
淡竹葉 地骨皮 麥門冬各壹分

細末每貳錢水小盞薑貳片棗壹枚煎無時

錢氏白朮散 黃芪六一湯見自汗

嬰童百問 幼科三 二十五

真武湯見自汗 六神散見夜啼

嬰孩壯熱者一向不止由血氣壅實五臟生熱蒸發
於內則眠臥不安精神恍惚熏發於外則表裏俱熱
煩躁喘麤甚則發驚癇也輕劑火府丹地黃煎重劑
雙解散七寶散大黃朴硝湯

地黃煎 治小兒壯熱煩心眠臥不安

生地黃汁 白沙蜜壹合 酥壹合
生門冬汁

右重湯熬至成膏每服數匙

火府丹 治小兒壯熱

生地黃 木通 甘草

黃芩

右末壹錢煎服

金蓮飲子 治小兒盜汗壯熱赤眼口瘡心煩躁悶
咽乾多渴潮熱不止

防風 甘草炙 連翹
柴胡 山梔子

右為末每服貳錢用水陸分煎至叁分食後服

黃龍湯 治發熱不退或寒熱往來

柴胡伍錢 黃芩炒 甘草炙各貳錢
赤芍藥叁錢

嬰童百問 幼科三 二十六

右每服壹錢薑棗水煎

牛黃膏 治壯熱咽喉涎響或不省人事或左右手
偏搐或脣口眼鼻顫動此熱涎內蓄風邪外感也
宜急服之

蝎尾 巴豆肉 梅花腦
辰砂 鬱金 牛黃少許
麝香

右為末每服壹匙蜜水調下量兒大小

梔子仁湯 治陽毒壯熱百節疼痛下

梔子仁 赤芍藥

子113 011

知母　升麻　黃芩(酒炒)
石膏　柴胡　甘草(各伍錢)
杏仁
右每服貳錢生薑貳片水煎服

六物黃芩湯　治壯熱腹大短氣往來寒熱飲食不化
黃芩　大青　甘草(炙)
麥門冬(去心)　石膏　桂
右每服貳錢水煎服

五物人參飲　治壯熱咳嗽心腹脹滿
人參　甘草　麥門冬(去心)
生地黃　茅根
右每服貳錢水煎服

溫壯　溫壯與壯熱相類而有小異一向熱而不止是壯熱也但溫溫然不甚盛是溫壯也若大便臭而黃者此腹內有伏熱以四順飲子治之若糞白而酸臭則挾宿食不消當服紫霜丸輕者少服重者節乳哺增加丸藥當取微利可也

紫霜丸

柴芩湯　治小兒溫壯伏熱來去
竹葉　麥門冬　人參(去蘆)
赤茯苓　甘草　黃芩(各伍錢)
右剉散用水煎入小麥貳拾粒竹葉叄片

二黃犀角散　治溫壯心熱夜臥不安大腑秘結
犀角屑　大黃　鈎藤鈎
梔子仁　甘草　黃芩(各半)
右為末每服五分沸湯調下量兒加減

牛黃散　治溫壯潮熱寒熱往來
牛黃　甘草　柴胡
梔子仁　龍膽草　黃芩(各貳錢)
右為末每服半錢以金銀薄荷湯調下

驚熱　驚熱者遍身發熱或熱而不甚面青自汗睡夢虛驚顛叫恍忽有因驚而生熱者有因熱而生驚者錢氏導赤散涼驚丸安神丸之類皆可治也

七寶散

天竺黃散　治小兒驚風熱
天竺黃　川鬱金　山梔子
白殭蠶　蟬殼　甘草(各等分)
右為末每服半錢熱水薄荷湯[illegible]皆可服不拘時

甘露散　治小兒驚熱通利小腸大驚涎清心凉上

煩渴安神穩睡加辰砂名加減甘露散

寒水石　石膏（研各壹兩 堅白有稜者）

生甘草末

右件為末和勻每服一小或壹錢或半錢熱月冷服寒月熱服用湯調或燈心湯調夜驚心熱不安臥皆可服小便不通秋麥門冬燈心湯若驚熱入硃砂少許不拘時服一方有赤茯苓壹兩蘇沈方用滑石不是石膏錢氏名玉露散每服壹字或半錢或壹錢食後溫白湯調下

辰砂金箔散　治小兒心膈邪熱神志不寧驚惕煩渴恍忽怔忡夜臥不安齒斷腫爛及痰實咳嗽咽膈不利

辰砂（研另）　桔梗（各貳錢半）　人參

白茯苓（各壹錢半）　蛤粉（飛研壹錢）　牙硝（枯壹錢半）

甘草（炙壹錢半）　片腦（壹分）　金箔（壹片）

右為末每服一歲半錢薄荷湯調不拘時白睟小兒臟腑多熱睡臥不穩大便不利蜜湯調壹字

本治小兒驚熱

全蝎　天南星　人參（各叁錢）

蛇蛻（叁錢）

右為末薄荷湯調下

骨蒸熱　小兒一歲至十歲衣絮皆不得着新綿又不得冬月以火烘衣被勿令食桃杏楊梅果實又不得食炙煿熱麵之類皆令兒體熱或因傷寒後食肉太早令兒體熱者有之或作骨蒸者宜服生犀散克効湯地骨皮飲上宜散金蓮飲子治之　將骨蒸熱身體虛羸遇晚而發有熱無寒解後渴汗方止此乃瘠病之餘毒傳作骨蒸或腹內有癖塊有時微痛用參苓白朮散蘿蔔三稜煎湯調服或投化癖丸先療脾虛宿滯次以柴胡飲爲治仍忌雞酒羊麪毒物

人參生犀散　治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦及大病瘥後餘毒不解或傷寒病後食羊肉體熱不思食

犀角（鎊）　地骨皮　秦艽（去土）

麥門冬（去心）　枳殼（麩炒）　川大黃（蒸）

柴胡（去蘆）　赤茯苓（去皮）　赤芍藥

桑白皮（炒）　黃芪　人參

鱉甲（去裙醋炙黃各等分）

右剉碎每服貳錢水半盞烏梅半箇煎至叁分不拘時服

地骨皮飲　治小兒骨蒸潮熱往來心膈煩悸及傷寒後氣未解

柴胡(去蘆)　地骨皮(各貳)　知母

甘草(炙)　鱉甲(醋炙)　黃芩

人參(各貳錢半)　赤茯苓(兩半)

右剉碎壹歲貳錢水陸分烏梅各壹片煎叁分不拘時服

柴胡飲　治骨蒸疳氣五心煩熱日晡轉盛口乾無味渴多身瘦胸滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡　人參　當歸(酒洗)

黃芩　赤芍藥　甘草(炙各壹兩)

桔梗(去蘆剉炒)　北五味(去梗)

[illegible](各半兩)

右剉每服貳錢水壹盞烏梅小角韭貳片煎柒分無時溫服

鄭氏犀角飲　治小兒骨蒸潮熱盜汗肌瘦

犀角屑　鱉甲(醋炙)　柴胡

知母(各半兩)　地骨皮　胡黃連(各壹兩)

川大黃　桃枝(各半兩)

㕮咀叁歲壹錢服水半盞煎服無時

靈犀飲　治骨蒸潮熱盜汗咳嗽可食多渴面黃肌瘦肚急氣麄瘡熱餘熱通用

犀角屑　胡黃連(各半兩)　白茯苓

人參　川芎　秦艽

甘草　羌活　柴胡

桔梗　地骨皮(各壹兩)

㕮咀叁歲壹錢水半盞烏梅竹葉各少許煎

魁芴湯(見熱)　化癖丸(見癖)

煩熱　五心熱甚煩躁不安手足時欲露出小便赤澀謂之煩熱八珍飲子七寶散皆可服之若昏深紅飲

水不止以竹葉石膏湯加朱甘露散治之

一粒金丹　治小兒五臟積熱胸膈煩悶五心煩熱

人參　犀角　玳瑁

琥珀　防風(各壹)　茯苓

寒水石(煅)　甘草(各貳錢)　龍腦

硃砂(水飛各半錢)

右爲細末入麝半錢用陳米糊丸芡實大金箔貳拾伍片爲衣麥門冬去心煎湯下

絳雪丹　治小兒煩熱

芒硝(壹兩)　硃砂(壹兩)

右為末飯丸芡實大每歲壹丸沙糖水化下
地黃煎丸　治小兒風癖上膈熱煩鼻衄口瘡咽喉
腫痛口舌生瘡或血熱在心常熱多渴飲水
生地黃　熟地黃各　薄荷葉壹兩半錢
甘草炙微　山梔仁　玄參各壹錢半
片腦半錢
右為末煉蜜為丸如芡實大每服壹丸白湯磨化
乳後服
竹葉石膏湯　治小兒虛羸少氣氣逆欲吐四體煩
熱

石膏參兩　半夏泡　人參各柒錢半
麥門冬去心壹兩　甘草炙柒錢半　淡竹葉半把
右剉碎每服貳錢用水陸分粳米叁肆拾粒生薑
貳片煎至叁分去柤不拘時服
加味甘露散見癖熱

潮熱　熱有作止每日應時而發謂之潮熱如潮信之
不失其期也錢氏云假如潮熱是一臟實一臟虛而
內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈且如日中發
潮熱者是心虛也肝為心之母則宜先補肝肝實而
後瀉心心得母氣則內平以潮熱愈也醫見潮熱妄
謂其實乃以大黃朴硝輩諸冷藥利之利既多矣不
能禁約而津液內竭縱取一時之瘥鮮有不成疳病
而身瘦也　薛潮熱有風寒有積食癖之分陰陽虛
實五臟之異如汗出身熱呵欠面赤者風熱也傷寒
時疫陰陽相勝外感熱也肚脹口乾作蒸盜汗疳熱
也大小便秘澀汗下不行積熱也腹背先熱夜發旦
止食熱也涎嗽飲水乳食不消辨熱也又有煩熱者
氣粗喘促心躁不安顏赤口瘡焦髮癇證瘡疹熱者
耳鼻尖冷血熱者巳午間發至夜則涼虛熱者困倦
少力發於病後陽邪干心則來去不定陰陽相勝則

寒熱如瘧前證在小兒有因乳母或姙娠七情厚味
遺熱或飲食停積衣衾過暖及頻浴熱湯而為患若
寅卯辰時熱而力盛飲水者肝經實熱也用柴胡清
肝散熱而力怯飲湯者肝經虛熱也用六味地黃丸
巳午時熱心經也實用導赤散虛用秘旨安神丸申
酉戌時熱肺經也實用瀉白散虛用秘旨保肺湯亥
子丑時熱腎經也用地黃丸大凡壯熱飲水大便秘
結屬實熱用二黃犀角散下之熱渴飲湯大便如常
屬血虛用四物湯補之若下後陰虛陽無所附而仍
熱用四物參芪汗後陽虛陰無所生而仍熱用四君

芎歸若汗下後煩渴面赤血虛發躁也當歸補血湯若見驚搐等證肝血虛而内生風也用四物天麻鈎藤鈎類赤口乾小便赤澀大便焦黄表裏俱實熱也用清涼飲子如大便已利或熱未止表邪未解也惺惺散末應加麻黄微汗之既汗而仍熱此表裏俱虛氣不歸源陽浮於外而虛熱也六神散加粳米陽氣下陷於陰中而發熱者用補中益氣湯若乳下嬰兒當兼治其母 曾氏先用百解散發表次以當歸散及三解散治之脉實者以大柴胡湯下之虛浮數者百解散微汗之若發熱而嘔者小柴胡湯和解之

錢地骨皮散 治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母 甘草炙 半夏湯泡次

銀柴胡去蘆 人參 地骨皮

赤茯苓各等分 如有驚熱加蟬蛻天麻黄芩若加秦艽名秦艽飲子

右為細末每服貳錢生薑叁片水煎食後温服量大小加減 海藏云地骨皮散即小柴胡湯加減法自汗者地骨皮散無汗者柴胡湯三黄湯仲景所用錢氏改為丸散加減並出古法

生犀散 見心部

田犀角飲 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾晚潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末 地骨皮 麥門冬

枳殼麩炒 大黄 柴胡

茯苓 赤芍藥 黄芪

桑白皮 人參 鱉甲醋炙各等分

右為麁末每貳錢入青蒿少許水煎看兒大小加減壹鍾煎捌分食後温服

錢小兒潮熱盜汗胡黄連柴胡等分為細末煉蜜丸芡實大每服壹丸酒化開入少水煎小沸服

錢秦艽散 治潮熱減食蒸瘦

秦艽去蘆切焙 甘草炙各壹兩 薄荷葉切焙半兩

右為麁末每服貳錢水壹鍾煎捌分食後温服

保潮熱有時胸滿短氣者桃枝丸與服見積

人參芎歸散 治小兒虛勞内熱潮熱或徧身瘡

北參 當歸 遠志泡取肉甘製焙

北前胡 柴胡 地骨皮

防風 北桔梗 枳殼麩製

半夏曲各壹錢半 川芎 赤芍藥

茯苓 麥門冬去心各貳錢 甘草炙壹錢

右剉細每服貳錢水小盞薑叁片紫蘇葉叁肆葉

發瘡者無服猪肚黃連丸方見疳門別作小丸不
惟治疳治渴其發熱而脹者可與服貳拾丸

十味人參散 治潮熱身體倦怠

柴胡 甘草 人參
茯苓 半夏 白朮
黃芩 當歸 芍藥
葛根

右㕮咀水壹鍾薑叁片煎服

薛方

柴胡清肝散見肝熱 六味地黃丸見腎

導赤散見心部 秘旨安神丸見心部
瀉白散見肺部 秘旨保脾湯見脾部
二黃犀角散見溫壯 四物湯見失血
當歸補血湯見虛熱 六神散見夜啼

曾氏方

百解散 主和解百病虛慢陰證不宜

乾葛貳兩半 升麻 赤芍藥各貳兩
黃芩壹兩 麻黃製去節壹錢半 薄桂去粗皮貳錢半
甘草壹兩半

右剉每服貳錢水壹盞薑貳片葱壹根煎柒分無時溫服有風熱減加薄荷同煎

當歸散 順調氣血和解表裏與利心腹疎理百病及治溫熱停積白痢煩躁不寧

當歸酒洗去蘆 赤芍藥 甘草半生半炙壹兩
大黃半生半泡壹兩貳錢 川芎 麻黃去節各半兩

右剉每服貳錢水壹盞薑貳片煎柒分無時溫服

三解散一名小和心湯 主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁氣急渴水驚啼煩悶丹毒口瘡痰嗽搐掣

人參 防風各壹兩 天麻
茯神去皮木根 鬱金如無山梔仁代 白附子

大黃各貳錢半 赤芍藥 黃芩
殭蠶各伍錢 全蝎拾伍尾去尖毒 枳殼貳錢如前製
粉草陸錢

右碎焙爲末每服半錢至壹錢用溫薄荷湯無時調下或燈心湯

大柴胡湯 解利風熱痰嗽腹脹及裏證未解

柴胡肆兩去蘆 黃芩 芍藥各壹兩半
大黃 半夏如前製各半錢 枳實如前製柒錢
甘草壹兩小方故加用

右碎每服貳錢水壹盞薑貳片煎柒分無時溫服

小柴胡湯（方見潮熱）

晝熱　全嬰方小兒每早食後發熱夜則涼世醫多謂虛勞或為疳熱不知此血熱證也宜龍膽丸地黃膏之類時時與服即瘥　按全嬰方所云血熱者巳午發熱遇夜則涼與東垣所謂夜則發熱晝則明了不同然東垣所云血熱者指陰虛而生內熱也夜則發熱晝則明了取其晝陽夜陰也鄭氏所云血熱者指小兒血盛實而言也蓋謂巳午者心火用事之時也心主血血氣行至巳午則陽氣盛陽氣與正氣相搏故至期而發熱非其時者非血熱也　**治驗**　一小兒寅卯時發熱或兼搐有痰服抱龍瀉青二丸而愈後復患服前藥兼咳嗽氣喘不時發搐面赤色或青黃或浮腫或流涎予謂咳嗽氣喘脾肺氣虛也不時發搐肝木乘脾也面青黃肝入心脾也浮腫流涎脾氣虛也用益智丸以養心血補中益氣湯以補脾氣而愈

一小兒巳午時發熱驚悸發時形氣倦怠面黃懶食流涎飲湯予謂心氣不足所致不信反服涼心之藥更加吐瀉睡而露睛手足並冷幾至慢脾風先用六君薑桂湯佐以地黃丸而愈　一小兒申酉時發熱面赤腹中作痛或用峻利之劑下之致發搐吐痰作渴腹痛按之即止此脾胃傷而變證也用七味白术散補中益氣湯頓安

龍膽丸　治小兒食後多發熱或夜則涼此血熱證疳熱皆可治

宣黃連（去毛）　赤芍藥（各半兩）　草龍膽（去蘆）

青皮（去穰各貳錢半）　檳榔（壹箇）　麝香（少許）

右為末猪膽汁少入麪糊為丸麻子大每服貳拾丸米飲空心服

六合湯　治小兒血熱每日巳午間發熱遇夜則涼

當歸　大黃　川芎

熟地黃

右為末每服壹錢水半盞煎至叁分無時服

猪膽丸　治小兒每日早飯後發熱夜則身涼此血熱也

胡黃連（半錢）　宣黃連　赤芍藥（各半兩）

右為末猪膽汁和成劑入在膽中懸用漿水煮熟取出飯為丸如菉豆大每服叁拾丸米湯送下日三服無時

夜熱　海藏云夜熱屬陰四物飲之如此血熱在夜也脉經云小腸有宿食常暮發熱明日復止此宿食

夜熱也　[醫治]一小兒亥子時發熱形氣倦怠面黃嬾食流涎飲湯用益黃散而愈後復發服前藥及清熱之劑病發不時睛臥露睛作渴少食大便頻黃此脾虛而肝木勝之無力氣下陷也用補中益氣湯佐以地黃丸而愈又治一小兒夜間發熱腹脹此脾虛肝盛朝用五味異功散夕用四味肥兒丸熱止乃朝用六味地黃丸夕用異功散而瘥　[錢]朱監簿子五歲夜發熱曉即如故衆醫有作傷寒治者有作熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃

取白术散末一兩煎藥汁三升使任意取足服朱生曰飲多不作瀉否錢曰無生水不作瀉縱多不足怪也但不可下耳朱生曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神皆此藥也至晚服盡錢視曰更可服三升又煎白术散三升服盡得稍愈第三日又服白术散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而安　[湯]風痰熱晚熱早涼喉木無時此候乃痰作潮而生風熱即宜金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下涎次服惺惺散加南星白附子

四順飲 見寒熱　益黃散 見脾胃

補中益氣湯 見虛熱　地黃丸 見腎

異功散 見吐瀉　四味肥兒丸 見疳

白术散 見渴

金星丸　治風熱結聚喉內痰鳴喘急咳嗽面紅顋腫咽膈壅塞發熱狂躁多渴

鬱金末　雄黃二錢五分　膩粉半分

巴豆去皮去油

右為末米醋糊丸麻子大薄荷臘茶下

奪命散 見驚　惺惺散 見咳嗽

四物二連湯　治血虛勞五心煩熱晝則明了夜則發熱脇肋并一身盡熱日晡肌熱

當歸　生地黃　白芍藥

川芎　黃連　胡黃連各等分

右水煎服

積熱 久熱也潮熱亦久但無面黃喉炭上鼻下爛也

[三因]小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以四順清涼飲子利動臟府則熱去既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺惺散紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再

解表或以詞不可醫誤致夭傷者甚多此表裏俱虛
氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用
六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內身體便涼
熱重者用銀白散　曾有熱服此浮肺面黃足冷發
熱從頭至肚愈甚或則飲食之氣惡心及腸疼嘔吐
治法詳載傷積論中　按曾氏所謂積熱乃積腹中
有癖而熱與久積之積不同不妨並存之
清涼飲子寅熱　惺惺散並益
紅綿散
白殭蠶炒伍兩　天麻生用壹兩　南星切薄片湯浸貳兩

蘇木節另研貳兩
右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至
六分溫服凡小兒風熱頭目不清並宜服之若傷
寒有表證發熱者每服入去節麻黃末五分有裏
熱心煩渴者入滑石末半錢同煎服之
六神散
人參　白茯苓　乾山藥
白朮　白扁豆　甘草炙各等分
右為末每服一大錢水一小盞棗一枚薑二片同
煎至五分服此藥用處甚多治胃冷加附子治風

證加天麻治痢加罌粟殼
銀白散
乾山藥　白朮　白茯苓各半兩
人參　白扁豆　知母
甘草炙　升麻各等分
右為末每服一大錢水一小盞棗一枚生薑二片
同煎溫服不拘時候
桃枝丸　疎取積熱及結胸又名桃符丸
巴豆霜　大黃　黃檗各壹錢
輕粉　硇砂各半錢

右細末麵糊丸粟米大煎桃枝湯下一晬兒五七
丸五七歲二三十丸未晬兒二三丸臨臥服
梔豉飲子　治小兒蓄熱在中身熱狂躁昏迷不食
梔子仁七枚　豆豉半兩
右用水三盞煎至二盞看多少服之無時或吐不
吐立效
梔子湯　治小兒積熱心臟小便赤腫口內生瘡
梔子仁　木通　當歸尾
白芷各貳錢　防風　甘草各壹錢
右為細末麥門冬煎湯送下

三黃丸 見熱門

甘露飲 治煩赤咽乾心煩躁睡不穩身熱頭痛
兼中暑發渴昏悶小便不通噤氣入腎苓芋中齒牙
加金珠散薄荷湯空心調服

寒水石 由千手細研者 石膏 半生半熟硬而有光壁者各壹兩
甘草 參錢剉乾入陰火焙

右除前二味外甘草剉曬或焙同為細末每服半
錢至一錢溫湯無時調服或麥門熱水

益元散 解暑毒利小便理煩渴除驚悸

滑石 陸兩 粉草 細剉壹兩

右二味或曬或焙研為細末每服一錢至二錢溫
熱水無時調服涼水亦可

尊安飲 推陳致新除邪輔正和益脾胃宣通氣血
調順飲食踈解風寒寧心化痰去煩渴熱不拘證
在表裏並宜可投常服百病不生真元益固補養
諸虛亦有奇驗此與宣明論當歸飲相類不遠治
法最多其藥品之外惟加枳殼半夏

人參 去蘆 當歸 細剉 大黃 生用
柴胡 去蘆 枳殼 去穰 半夏 泡裂
芍藥 洗淨 黃芩 防風 去蘆

甘草 壹兩 滑石末 陸兩

右剉除滑石末臨入和勻每服二錢水一盞薑二
片煎七分無時溫服或加棗一枚同煎

調胃散 桃枝丸取積後熱後服之

人參 參錢 白朮 炒 甘草 炙
白茯苓 罌粟子 各壹錢 白附子 半分
藿香 丁香 各半錢

右為末紫蘇湯下半錢或一錢

寒熱 寒熱者證如瘧狀陰陽相勝也先寒而後熱陽
不足先熱而後寒陰不足寒多而熱少陰勝陽也熱
多而寒少陽勝陰也寒熱相半陰陽交攻也寒熱爲
曰陰陽乍離也陽盛發熱陰盛發寒也其有頭疼汗
出者有嘔吐不食者有增寒而飲水者壯熱而飲湯
者有筋骨疼痛者或瀉或秘或內寒而外熱或內熱
而外寒又有寒而腹中痛熱而腹中鳴是有食積也
治法必於食積者當用白餅子下之次行補助以錢
氏白朮散寒多熱少者小柴胡湯加桂熱多寒少者
白虎湯加桂寒熱相半者並用小柴胡湯主之 醫
經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則
內寒寒熱往來此乃陰陽相勝也故寒氣并於陰則

發寒陽氣并於陽則發熱寸口脉微為陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脉弱為陰不足陽氣下入陰中則發熱陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則發熱下盛則發寒陽勝則乍熱陰勝則乍寒陰陽相勝虛實不調故邪氣更作而寒熱往來或乍寒乍熱也少陽膽者肝之府界乎太陽陽明之間半表半裏之分陰陽之氣易於相乘故寒熱多主肝膽經證以小柴胡湯加減調之若無見寒熱起居如常久而不愈及大病後元氣未復悉屬陰虛生熱陽虛生寒宜用八珍湯補

之甚者十全大補湯有食積為病亦令寒熱用保和丸消之若兼嘔吐泄瀉用六君子湯厥冷飲熱人參理中丸作湯不止七味白朮散食積既消而寒熱尚作者肝邪乘脾所勝侮所不勝也用異功散加柴胡山梔其瘧證寒熱詳見瘧門

白餅子 痰　　白朮散 渴

小柴胡湯 半表半裏熱　　白虎湯 表裏俱熱

八珍湯 虛羸　　十全大補湯 虛羸

保和丸 宿食　　六君子湯 脾

人參理中丸 吐瀉　　異功散 吐瀉

變蒸論

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸畢即覺性情有異於前何者長生臟腑意智故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生癸屬足少陰腎藏精與志六十四日二變一蒸生壬屬足太陽膀胱其發耳與骫冷至九十六日三變生丁屬手少陰心經心藏神其性為喜一百二十八日四變二蒸生丙屬手太陽小腸其發汗出而微驚一百六十日五變生乙

屬足厥陰肝肝藏魂喜哭一百九十二日六變三蒸生甲屬足少陽膽其發目不閉而赤二百二十四日七變生辛屬手太陰肺肺藏魄主聲二百五十六日八變四蒸生庚屬手陽明大腸其發膚熱而汗或不汗二百八十八日九變生己屬足太陰脾脾藏意智至三百二十日十變五蒸生戊屬足陽明胃其發不食腸痛而吐乳又手厥陰心包絡手少陽三焦此二經俱無形狀故不變而不蒸也前十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日為

一大蒸計三百八十四日長其經脉手足手受血故
能持握足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足
一歲之日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者
微止不可別治又六十四日爲二大蒸計四百四十
八日又六十四日三大蒸計五百一十二日共五百
七十六日變蒸旣畢兒乃成人也變者變生五臟也
蒸者蒸養六腑也所以成人變者上氣蒸者體熱每
經一變一蒸情能旣異輕則發熱微汗其狀似驚重
則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼躁渴輕者五日
解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘

續感寒邪者但變蒸則耳冷骶冷上脣發泡狀如[illegible]
珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲
日夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則
嚏嗽毛聳凡五臟六腑筋脉骨節循環各有證應其
治法和平之劑微表之熱實者微利之或不治亦自
愈【湯】千金變蒸論云凡兒生三十二日一變六十
四日再變變且蒸九十六日三變一百二十八日四
變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變
且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且
蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積

三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六十四
日復大蒸蒸後一百二十八日復大蒸凡小兒自生
三十二日一變再變爲一蒸凡十變而五小蒸又三
大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所
以變蒸者是榮其血脉改其五藏故一變竟輒覺情
態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕
重其輕者體熱而微驚耳冷尻冷上脣頭白泡起如
魚目珠子微汗出重者體壯熱而脉亂或汗或不汗
不欲食食輒吐哯目白睛微赤黑睛微白又云目白
者重赤黑者微變蒸畢自精明矣此其證也單變小

微兼蒸小劇凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先
期五日後期五日爲十日之中熱乃除耳或違日數
不歇切不可妄治及灸刺每藏云言變蒸通一十八次蒸前三百二十日爲十八
小蒸後二百五十六日爲十大蒸也兒平典切不悞而吐也【無】若身熱耳熱尻
亦熱此乃他病可作別治【翻】變蒸治法平和者微
表之實熱者微利之古方紫霜丸黑散子柴胡湯皆
可有寒無熱并吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主
之前證蓋小兒所不免者雖勿藥亦可也前藥峻厲
非惟臟腑不勝亦且反傷氣血余嘗見一小兒至一
變發熱有痰投抱龍丸一粒卒至不救愼之愼之其

有不熱不驚略無證候而暗變者蓋受胎氣壯實故
也

紫陽黑散　治小兒變蒸壯熱亦治傷寒發熱

麻黃 貳錢半去節　大黃 壹錢半炒黑為末　杏仁 貳錢半去皮尖

右件同一處搗和並略燒存性再以杏仁研膏和之密器盛每服一豆許乳汁調和灌之

紫霜丸 方見積

柴胡湯　治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參　甘草 各貳錢微炙　麥門冬 去心各貳錢

龍膽草 炒黑　防風 各壹錢　柴胡 伍分

右每服壹錢水煎

當歸散　治變蒸有寒無熱

當歸 貳錢　木香　官桂 去皮

甘草 炙　人參 各壹錢

右每服壹錢薑棗水煎

調氣散　治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

木香　香附子　人參

橘皮　藿香　甘草 炙各壹錢

右為末每服壹錢薑棗水煎服 幼科類萃此方有製厚朴壹錢

平和飲子　治嬰兒變蒸於三日後三日進一服可免百病百日內宜服

人參 去蘆　甘草 炙各半錢　白茯苓 壹錢去皮

升麻 貳分煨

右㕮咀用水煎不以時候服稟受弱者加白朮[illegible]錢肥大壯實者不用

參杏膏　治小兒變蒸潮熱

人參 去蘆　杏仁 去皮尖　川升麻 煨各壹錢

甘草 貳錢炙

右為極細末百日已前每服一字用麥門冬去心煎湯食遠調服

心痛

小兒心痛當於大人心痛門參用之

心痛吐水者蟲痛　心痛不吐水者冷心痛

錢氏靈脂散　治小兒蟲咬心痛欲絕

五靈脂貳錢　白礬半錢火飛

右同研每服一二錢水一鍾煎至五分溫服無時當吐出蟲

聖惠治小兒心痛但覺兒將手數數摩心腹即啼是心痛不可忍宜服芍藥散方

赤芍藥　人參去蘆　白朮

黃芩　川大黃剉碎炒　當歸已上各壹分

右擣羅為麤散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小加減溫服

茅先生治小兒心痛金鈴散

金鈴子炮去皮核　蓬莪茂炮各壹兩　茴香

木香炮　荊三稜炮各半兩

右為末每服一錢半錢用熱酒調下

煩躁

薛仲景云火入於肺則煩入於腎則躁夫心者君火也火王則金爍水虧惟火獨存故肺腎合而為躁也活人云但煩熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼故知非傷寒也頭不痛脈不緊故知非裏寒也不可發汗攻下當與竹葉湯兼嘔者與橘皮湯又心虛則先煩而後渴翕翕發熱其脈浮緊而大是也蓋煩者心中煩擾而內熱故屬陽躁者肢體躁動或裸身欲入井中為外熱故屬陰外熱者無根

之火也是以為虛在小兒當辨其嗞煎不安是煩嗞啼不定是躁嗞煎者心經有熱精神恍惚煩滿生驚嗞啼者心經有風煩躁驚搐也熱甚者黃連解毒湯輕者導赤散風熱者至寶丹脈數而實便閉有熱者神芎丸此皆實熱之治法也若煩而頭痛短氣口乾咽燥不渴者虛也用四君加芎歸因藥攻伐而作渴者用竹茹湯煩而不得眠者酸棗仁湯心神顛倒煩熱欲吐者朱砂安神丸面戴陽目內赤六脈洪大按之全無者血虛發躁用當歸補血湯若躁而裸體欲入井中脈沉細或浮大按之如無者此皆陰盛發躁

也宜用參附湯有回生之功

清熱解毒丸　治五臟積熱毒氣上攻胸膈煩悶咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐臥不寧及傷暑毒面赤身熱心煩躁而渴飲食不下

寒水石　石膏各捌兩　青黛肆兩

右研末入青黛和勻蒸餅七箇水調爲丸如芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯下如中諸毒並宜服之及驚風潮熱痰涎壅塞心胸煩躁頰赤多渴坐臥不穩每服半粒量大小加減

竹茹湯　出

橘皮湯

橘皮壹兩半　甘草炙　竹茹[illegible]

人參貳錢伍分

右每服五錢水煎食前服

黃連解毒湯　治時疾三日汗已解若煩悶乾嘔口燥呻吟發熱不止

黃連炒壹錢　黃檗炒半兩　梔子炒肆枚

黃芩炒貳錢

右每服二三錢水煎未効再服亦治熱痢

導赤散

至寶丹　治諸驚癇心熱及卒中客忤煩躁風涎搐搦或傷寒狂語伏熱嘔吐

生犀角鎊　生玳瑁鎊　琥珀

朱砂水飛　雄黃水飛各　金箔伍拾片半爲衣

銀箔伍拾片　片腦　麝香壹錢

牛黃半兩　安息香[illegible]

右各另研爲末和勻入安息香膏如乾入熟蜜少許丸桐子大每服一二丸人參湯化下量兒加減用之

神芎丸　治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁作渴或大便澀滯或積熱腹滿驚風潮搐等證

大黃生　黃芩各貳兩　生牽牛末壹兩

滑石肆兩　黃連　薄荷葉

川芎各半兩

右爲末水糊丸如桐子大每服三四丸溫水下

酸棗仁湯

酸棗仁去殼取仁　甘草炙　生地黃

梔子仁　麥門冬　人參

當歸身各等分

右剉細加燈心水二鍾煎七分去滓溫服不拘時

朱砂安神丸 心

當歸補血湯 虛熱

注夏

薛脾爲太陰位屬坤土喜燥而惡濕故凡脾胃之氣不足者遇長夏潤溽之令則不能升舉清陽健運中氣又復少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰不收兩脚痿弱嗜卧發熱精神不足飲食少思口中無味呼吸短乏氣促日中視物䀮䀮小便赤數大便不調名曰注夏此皆禀賦陰虛元氣不足之證丹溪補陰論言之詳矣育子者其可不知冬月養陽之道乎治法用補中益氣湯去升麻柴胡加炒黑黃[illegible]

因勞役發熱血虛脉大者用當歸補血湯氣血兩虛者八珍湯肝腎陰虧者地黃丸大便作瀉者人參理中湯若乳母肝火乘脾寒熱少食者柴胡梔子散胃火作渴者竹葉石膏湯小兒多因乳母之氣不調而致當戒忿怒調飲食適寒溫則可以遠病矣又如今人夏月皆以香薷湯浸冷代茶飲之殊不知香薷利水大損元陽厚朴剋伐大瀉真氣況脾性喜溫而惡寒夏月陰盛於內冷飲傷脾若胃强有火濕熱爲病之人固無大害其脾胃虛弱中氣不足者必爲腹痛少食泄瀉疾中之疾矣此大人亦所當戒者況小兒

乎愼之愼之

補中益氣湯（氣虛 熱） 當歸補血湯（血虛 熱）

八珍湯（血虛 熱） 地黃丸（腎）

人參理中湯（吐 瀉） 柴胡梔子散（發 熱）

竹葉石膏湯（發 熱）

淸暑益氣湯 治暑邪干衛身熱自汗

黃芪 蒼朮（泔浸 各壹錢） 升麻（柒分）

人參 白朮 陳皮（炒）

神麴（炒） 澤瀉（各伍分） 甘草

黃蘗（酒 炒） 當歸身 麥門冬（去心）

青皮（炒） 葛根（各叁分） 五味子（玖粒）

右水煎服

淸燥湯 治小兒自汗或因熱傷元氣大小便秘澀

黃芪（炒） 蒼朮（各伍分） 白朮

陳皮 澤瀉 人參

白茯苓 升麻 麥門冬（去心）

當歸身 生地黃 神麴（炒）

猪苓 黃蘗（酒炒 各叁分） 五味子（玖粒）

黃連（炒） 甘草（炙 各貳分）

右每服一二錢水一鍾煎服

舌

舌者心之候脾之脉絡於舌也二經有熱無所於泄而發於舌如舌絡微緊時時舒舌謂之弄舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌舌漸漸腫大塞滿口中謂之木舌 曾凡患此證是脾與心肌受極熱有所謂重舌木舌又謂之舌黃鵝口名雖異皆熱也大抵重舌生於舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脉係舌傍肝之絡脉係舌本心之絡脉係舌根凡此三經或爲濕熱風寒所中則舌捲縮或舒長或腫滿宜消黃散綠袍散主之及當歸散羌活散與服

當歸散（發熱） 羌活散（發熱）

【弄舌】發弄舌者脾臟微熱令舌絡微緊時時舒舌治勿用冷藥及下之當少與瀉黃散漸服之（田氏云若肥實者用牛黃散治之） 或欲飲水醫疑爲熱用冷藥下之者非也飲水者脾胃津液少故也又加面黃肌瘦五心煩熱即爲疳宜加胡黃連輩 若大病未已用藥後弄舌者凶 【薛】小兒舌微露而即收者名弄舌此屬心脾虧損用溫脾散補之舌舒長而良久不收者名吐舌乃心脾積熱用瀉黃散主之或兼口舌生瘡作渴飲

冷癖胃經實熱亦用前散作湯飲熱癖胃經虛熱用
四君子湯食少作渴或大便不實脾胃虛弱也用七
味白术散口角流涎或腮頰患肺胃虛風熱也先用
人參安胃散次用七味白术散若午後甚者脾血虛
也四物多加參术茯苓木瓜用補中益氣湯及審五
臟相勝若因疳瘦所致當兼治諸疳門

瀉黃散（脾）　溫脾散（發熱）
白术散（渴）　人參安胃散（脾）
四物湯（失血）　補中益氣湯（虛贏）

重舌　重舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重

舌其著舌下如此者名重舌其著頰裏及上腭如此
者名重腭其著齒齗上如此者名重齗皆刺之出血
可也　治法用苦竹瀝漬黃檗末點舌上如不愈後
用真蒲黃傳之不過三次愈（一用蒲黃微炒研細每挑些摻舌下更以溫水蘸綿裹指輕輕按之按罷摻藥）　馬牙硝塗舌下日三度
先用新水揉口并舌上下後用皂莢針燒灰入腦
子少許每用半字摻舌上下出涎立效（亦治木舌）　燒烏
賊魚骨細研和雞子黃傳喉及舌上　亂髮灰細研
以半錢傳舌下日不住用之　桑白皮煮汁塗乳飲
之

張烏魚散　治小兒重舌
烏魚骨（少許）　蜣螂（燒灰）　蒲黃（各伍錢）
枯白礬（貳錢伍分）
右為極細末用雞子黃調塗舌下嚥津無妨
青液散　治小兒重舌及口瘡
青黛　朴硝（各壹錢）　龍腦（壹字）
右為細末用蜜調鵝翎蘸少許傳之
當歸連翹湯　治小兒心脾有熱致生重舌
當歸尾　連翹　川白芷（各叁錢）
大黃（煨）　甘草（各壹錢）

右㕮咀用水一盞煎食前服
救金散　治小兒重舌及木舌
雄黃（貳錢）　鵬砂（壹錢）　腦子（少許）
甘草（半錢）
右為細末乾摻舌上或用蜜湯調鵝翎刷嚥
綠袍散　治重舌及滿口內外瘡毒咽膈不利
薄荷（去梗）　荊芥穗（貳味各伍錢）　青黛
玄明粉　鵬砂（叁味各貳錢半）　百藥煎
甘草（貳味各叁錢）
右剉焙為末除玄粉鵬砂二味在乳鉢內細杵匀

前藥末再杵勻用壹字至半錢乾點舌上令其自
化或新汲水入蜜調點舌上亦好

木舌 木舌者舌腫漸漸粗大滿口不急治即塞殺人
也 曾木舌者舌腫硬而妨乳食此爲風熱盛也以
當歸散瀉黃散玉露飲皆可服之次消黃散點擦舌
上蓋舌者心之管心熱則生瘡破裂肝壅則血出如
湧脾閉則白胎如雪熱則腫滿風則強木口合不開
四肢壯熱氣喘語塞即其候也治法涼解上焦及心
肝脾三經邪熱疎風化痰初用百解散加五和湯水
薑燈心煎投次以牛蒡湯同當歸散入生地黃木通

煎服 治法用局方中紫雪貳錢半竹瀝半合和之
時時抹入口中自消 百草霜滑石芒硝爲末酒調
傅

瀉黃散 脾 玉露飲 熱見

消黃散 治風熱上攻舌硬腫大不消
風化朴硝 真蒲黃 各半兩
右蒲黃晒乾爲末同朴硝乳鉢內細研勻每用一
字或半錢點擦舌上下

百解散 見[illegible] 五和湯 見失血
牛蒡湯 見[illegible]

川硝散 治小兒木舌
朴硝 壹兩 真紫雪 伍錢 食鹽 貳錢半
右爲細末每服五分入竹瀝三兩點用白湯調塗
舌上嚥津無妨

舌白胎 丹溪云舌上生如微粒桑白皮汁傅之三兩
次妙

舌上瘡 本草治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞
子置醋中塗足底二七即愈 千金方以蜂房燒灰
屋間塵各等分和勻傅之 又以桑白汁塗乳與兒
飲之 又以羊蹄骨中生髓和胡粉傅之 外臺以

品以烏賊魚骨燒末雞子黃和塗之 嬰孺燒蒸
爲灰每日少許傅之 張雞峰方野薔薇根剉碎每
用一匙頭以水二盞煎至八分去滓熱含冷即吐了
治口舌生瘡久不差

舌上血出 千金翼治舌上黑有數孔出血如湧泉此
心臟病也方
戎鹽 黃芩 黃蘗
大黃 各伍兩 人參 桂心 各貳兩
甘草 炙壹兩 右七味末之鍊蜜丸如梧子每服
十丸日三服仍燒鐵烙之

諸失血證

【曾】小兒九道出血何為而然蓋人之所有者血與氣也心者血之主肺者氣之主氣主呴之血主濡之榮養百骸灌溉絲脉升降上下榮衛諧和自然順適一或不調疾由生矣或外為六淫所侵内因七情所沮氣乃留而不行血乃壅而不濡内外抑鬱不能流注以榮於身必有妄動之患叔和以乳脉為失血之義在七表屬陽故也陽明主乎多氣多血未有不因熱而得蓋氣血俱熱熱鬱内逼失其常度是以妄行

有在襁褓患此證者固非七情所傷皆因乳母執著不自寬釋及啖辛辣之物流于乳絡兒飲之後停滯不散鬱蒸於内亦能動血或居重幃暖閣火氣熏逼不令常見風日積溫成熱熱極則涉泄或吐或衄或大小腑亦多血來者　有氣虚而邪熱乘之則血不得循流故道滲於諸經亦生走失之證其面皏白脉沉微血淡紫口氣緩是也　又況嬰孩脆弱易虚易實因熱内攻血隨氣行或壅而上逆或下而忘返遂有吐血衄血瀉血溺血之證然而血不苟動因氣使之風不自生因熱而起由是而論可以類推治法先明虚實審得病源隨經施治藥餌無差則不失其機要　實則小柴胡湯加生地黄絲茅根或苦參亦好並用水煎服或㕮咀五苓散合五和湯亦加絲茅根苦參水煎及投消毒飲及用局方鷄蘇丸三黄丸間服　虚則理中湯及人參芎歸湯皆可服間有醫者見其血盛以為熱極過投涼劑遂使血寒不能歸源而妄流其色紫黑而凝滯或成小片當服薑附之劑以温之自然流暢毋致妄行為佳

小柴胡湯（方見熱證）　五苓散（方見驚證）

五和湯（方見熱證）　消毒飲（方見瘡疹）

局方鷄蘇丸（治大吐血）　三黄丸（方見熱證）

理中湯（方見吐瀉）

人參芎歸湯　治九道血妄行

人參（去蘆）　川芎　當歸（酒洗）各半兩

荊芥（穗）貳錢

右每服貳錢水一盞煎七分温服無時

黄芩丸　治小兒衄血吐血下血

右以黄芩為末煉蜜丸如鷄頭大三歲一丸濃鹽湯下柏葉石榴花為末吹鼻治衄血吐血一方定州瓷器末治嘔血破血止血

茅花湯　治鼻衄不止吐血下血

用茅花一大把水三盞煎濃汁一盞分二服即瘥

無花根梗代之亦治血痢黑痢

吐血　全嬰論云夫吐血者榮衛氣逆也榮者血也衛者氣也榮衛相濟不失常道一有所勝則致妄行血者水也決之東則東流決之西則西流氣之使血其勢如此巢氏云血者是有熱氣盛而血虛熱乘於血血性得熱則流散妄行氣逆則血隨氣上故令吐血也又或飲食太飽之後脾胃內冷不能消化忽吐所食之物氣血相衝因傷肺胃亦令吐血若久嗽氣逆面目浮腫而嗽吐血者是虛損也　薛清者為榮濁者為衛榮行脈中衛行脈外蓋榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六腑故能入於脈夫榮者陰血也所主在心統化在脾藏內在肝宣布在肺輸泄在腎灌溉一身滋養百脈諸經由此而生毓焉然血之所統者氣也故曰氣主呴之血主濡之是以氣行則血行氣止則血止陽生陰長夫倡婦隨之道也若氣一傷則變證百出故妄行則吐衄衰涸則虛勞降下則便紅熱陷則溺赤滲於腸胃則為腸風陰虛陽搏則為崩漏此皆氣有殄戾之患而血乃生滲溢之患也然養陰者可不先知　陽之道乎小兒患之多因稟賦積熱或食膏粱厚味或乳母七情鬱火所致治法若氣虛血弱當以人參補之陽旺則陰生血也若四物湯者獨能主血分受傷為氣不虛也若左寸關脈數而無力血虛也四物湯加參朮浮而無力氣虛也補中益氣湯尺脈數或無力腎虛也六味地黃丸右寸關脈數而有力者肺胃熱也犀角地黃湯後用四物湯加參苓白朮尺脈數而無力陰虛也用六味地黃丸若面黃目澀眵多手麻者脾肺虛也用黃芪芍藥湯

四物湯　治血虛發熱煩躁或晡熱作渴頭目不清若因脾虛不能生血者用四君子湯

當歸　熟地黃各貳錢　芍藥

川芎各壹錢

右水煎服

補中益氣湯 虛熱　六味地黃丸 方見

犀角地黃湯　治傷寒溫病失於表汗致內有瘀血吐血而色黃大便黑及瘡疹出多以此解之

犀角鎊　牡丹皮各壹兩　生地黃捌錢

赤芍藥柒錢

右銼每服貳錢水煎服

黃芪芍藥湯　治衄多歲血黃眼澀多眵手麻

黃芪叁兩　甘草炙　升麻

葛根　芍藥炒各壹兩　羌活半兩

右每服叁錢水煎服　按此手足太陰陽明藥也然血虛久則陽亦虛矣故血不足則麻木陰虛火動變證百出實非風也此出升陽滋陰例

人參黃芪散　治虛勞客熱消瘦倦怠口燥咽乾日晡潮熱五心煩熱盜汗胸滿食少作渴咳唾時有膿血

天門冬去心叁兩　半夏　知母炒黃

桑白皮　赤芍藥炒　黃芪炒

紫菀　甘草炙　鱉甲醋炙以上各半兩

白茯苓　柴胡　秦艽

生地黃　熟地黃　地骨皮各貳兩

人參　桔梗各壹兩

右剉散每服三五錢水煎服大人亦得一方有生薑

栢枝飲　治小兒衄血吐血

栢枝乾者　藕節乾者

右等分爲末三歲半錢藕汁入蜜沸湯調下一方

白芍藥爲末磨犀角汁調治咯血衄血

辰膠散　治小兒吐血

阿膠炒　蛤粉等分　辰砂少許

右爲末和粉紅色三歲一錢藕汁和蜜調下

紫參散　治吐血

紫參　山梔子　生乾地黃各壹兩

刺薊燒灰　亂髮

蒲黃　伏龍肝

右件都搗勻每服半錢至一錢煎竹茹湯調下

【衄血】衄血者是五臟熱結所爲也血隨氣行通流

臟腑冷熱調和不失常度無有壅滯亦不流溢血得寒則凝結得熱而流散熱乘於血血隨氣發溢於鼻竅又有因傷寒瘟疫諸陽受病不得其汗熱無所泄故鼻從而出也　春冬衄者用生地黃研取汁加生蒲黃少許砂糖井花水浸服之愈　秋夏衄者用車前草一握洗淨同生薑一處研取汁入生蜜一匙先拌食柴鼻次用新汲水和蜜并車前草生薑汁飲之即愈　又方生蘿蔔取根搗自然汁仰面滴入鼻管中即止次以新汲水和蜜蘿蔔汁飲之良　【薛】因驚仆氣散血無所羈而鼻衄者用異功散加柴胡山梔

左臉青而兼赤者先用柴胡清肝散後用地黃丸右
臉赤乃肺大腸實熱也用瀉白散鼻色赤乃脾胃實
熱也用瀉黃散微赤乃脾經虛熱也用異功散加升
麻柴胡色深黃用濟生犀角地黃湯後用楊氏地黃
散淡白色用六君子湯須間色赤用四物湯加山梔
赤甚用五淋散小便赤色用六味丸補中益氣湯唇
色白用六君子湯久不愈用麥門冬飲子若初病元
氣未虧乳食如常發熱壯熱二便秘結作渴飲水臥
不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元氣已
虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄瀉肢體畏寒臥而露

睛者悉屬形病俱虛當補正氣為要

湯氏地黃湯　治榮中熱及肺壅鼻血生瘡一切丹
毒

生地黃　赤芍藥　當歸
川芎各等分

右㕮咀水煎去查量大小加減服如鼻衄臨熟入
生蒲黃少許生瘡加黃芪等分丹毒加防風等分
同煎累驗

柴胡清肝散肝熱　地黃丸腎
瀉白散肺　瀉黃散脾
異功散脾
六君子湯脾　五淋散淋
六味丸即地黃丸腎

麥門冬飲子　治吐血久不愈者

五味子杵粒　麥門冬去心　黃芪各壹錢

龍膽丸　治小兒衄不止

黃連　龍膽草各等分

右為末糊丸如小豆大三歲三十丸或作散子以
濃鹽水送下

蘗皮湯　治小兒衄血

當歸身　人參　生地黃各五分

右水煎服

槐花散　治衄血

槐花炒壹兩　蒲黃半兩　川麯藭壹分

右搗羅為細末每服半錢新水調下

蘗皮　山梔子各壹兩　甘草炙半兩

右㕮咀三歲一錢水一小盞煎三分去滓服

膠黃散　治小兒大衄口鼻耳出血不止十五六歲
兒陽盛多此病

阿膠壹兩　蒲黃半兩

右爲末三歲半錢生地黄汁微煎調下食前服

便血尿血 大便下血者是大腸熱結損傷所爲也蓋氣既傷風邪自入或蓄熱或積冷或濕毒於脾胃或飛食傷於臟腑因兹冷熱交擊亦然而作致動血氣停留於內凝滯無歸滲入腸中故大便下血也或有腹脹冷氣在內攻衝亦令大便下血又因風冷乘虛客入脾胃或瘀血在於腸胃濕毒下如豆汁又飛傷於臟亦能便血若上焦心肺積熱施注大腸亦令大便下血也亡血脾弱必渴久則血虚其人必肌體萎黄頭髮不黑矣　溺血者蓋心主血與小腸相合血之流行週遍經絡循環臟腑若熱聚膀胱血滲入脬故小便血出也　薛 經云肺朝百脈之氣肝統諸經之血又云氣主呴之血主濡之蓋榮血為水穀之精氣灌溉五臟六腑四肢百骸若脾胃有傷榮衛虛弱行失常道故上為衄血吐血下為尿血便血矣若外感風邪則血鮮為腸風內傷則血濁為臟毒又熱入大腸則大便下血熱入小腸則小便出血然小兒多因胎中受熱或乳母六淫七情厚味積熱或兒自食甘肥積熱或六淫外侵而成若因母食厚味者加味清胃散怒動肝火者加味小柴胡湯憂思鬱怒者加

味歸脾湯稟父腎燥者六味地黃丸兒有積熱小便出血者實熱用清心蓮子飲虛熱用六味地黃丸大便出血者犀角地黄湯風邪外侵者倉廩散病後元氣下陷者補中益氣湯發痢見血者四君加黃連製吳茱萸瀉後見血者四君加吳茱萸製黃連若嬰兒以治母為主餘當臨證制宜

清胃散　小柴胡湯

歸脾湯　地黃丸

清心蓮子飲

五倍丸 治小兒大便下血如腸風臟毒

右以五倍子乾為末煉蜜丸如小豆大三歲三十丸米湯下

訶灰散 治小兒因痢大便有血

右以訶子燒灰存性一半為末米湯調下食前三歲一錢

桃膠丸 治小兒小便出血陰莖中痛

右以桃膠一塊如棗大水一盞半煎三分日進三服下石子如豆石盡止藥

火府散 治小兒小便出血

木通　生地黃　甘草

黄芩

右爲末水一盞煎六分不時温服

車前散　治熱盛積於小腸甚則尿血

牡蠣半兩燒爲粉　車前子　甘草炙微黄剉

川朴硝各壹分

右擣羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓温服量兒大小加減不拘時候

語遲

五臟有五聲心聲爲言若兒稍長應語而語遲由在胎時母卒驚怖內動兒臟邪乘于心心氣不和舌本無力故語遲也

錢菖蒲丸　治小兒心氣不足五六歲不能言

石菖蒲壹錢　人參切去蘆半兩　川芎貳錢

天門冬　麥門冬去心焙各壹兩　赤石脂叁錢

直指有當歸川芎朱砂

右同爲細末煉蜜丸如菉豆大或麻子大温水下五七丸至一二十丸不計時候日三四服久服取效又有病後腎虛不語者宜兼服錢氏地黄丸

海藏云地黄丸足少陰也與菖蒲丸上下通經

張氏菖蒲丹　治數歲不能語

菖蒲壹寸九節者　遠志去心　桂心各壹兩

人參去蘆　黄連去鬚　酸棗仁各半兩

右爲細末煉蜜和如芡實大每服壹粒至貳粒煎生薑湯化下不拘時候

聖惠　治舌本無力語遲芍藥散

赤芍藥壹兩　黄耆剉半錢　犀角鎊

檳榔　甘草炙各半兩

右為末每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒
不計時分加減溫服

錢病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能嚥藥此
非失音為腎怯不能[illegible]當補腎地黃丸
主之失音乃猝病耳[illegible]失音聲逆亦同

鷄頭丸　治小兒諸病後不能語

雄鷄頭一箇炙　鳴蟬三箇炙焦　大黃一兩濕紙裹煨熟
甘草一兩炙　黃芪切焙　川芎
遠志去心　麥門冬去心　當歸去蘆焙各
人參去蘆　木通各半兩

右同為細末煉蜜丸小豆大平旦用米飲下五丸
空心日三四兒大者加之久服取效鷄蟬二物宜
[illegible]死者用之不可旋殺孫真人所謂殺生求生去
生更遠不可不知也
[illegible]嘗治五六歲兒不語者灸心俞三壯　張氏灸兩
足踝各三壯

汗

鄭　夫汗者心之所藏在內為血發外者為汗蓋汗乃
心之液故人之氣血平則寧偏則病經云陰虛陽必
湊則發熱而自汗陽虛而陰必乘則發厥而自汗皆
由陰陽偏勝而致也小兒血氣嫩弱膚腠未密若厚
衣溫暖熏蒸臟腑臟腑生熱熱搏於心為邪所勝故
液不能內藏熏出肌膚則為盜汗也又或傷於冷熱
冷熱交爭陰陽不順津液走泄亦令睡中汗自出其
間有虛實之證虛者謂諸病後大汗後血氣尚弱液
溢自汗或潮熱或寒熱發過之後身凉自汗日久令
人黃瘦失治則變為骨蒸疳勞也丹溪云盜汗者謂
睡而汗出也不睡則不出汗出方其睡熟也濈濈然
出焉覺則止而不復出矣亦是心虛宜斂心氣益腎
水使陰陽調和水火升降其汗自止錢氏云上至頭
下至項謂之六陽虛汗不須治之

醫　薛自汗者汗不待發表而自出也經曰飲食飽
甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於
腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾又曰陰
虛而陽必湊則發熱而自汗陽虛而陰必乘則發厥

而自汗東垣云表虛自汗秋冬用桂春夏用黄芪丹溪云汗者心之液也自汗之證未有不由心腎俱虛而得之者巢氏云虛勞病者陽氣偏虛則津液發泄而爲汗夫自心爲主陽之藏火也陽主氣人身津液隨其陽氣所在之處而生亦隨其火所擾之處而泄則爲自汗矣治法當用參芪甘温益氣之藥使陽氣外固而津液内藏則汗止矣若元氣虛者夏月用六君子湯加山藥山茱萸冬月用加減八味丸十全大補湯血虛者四物加參芪有熱者當歸六黄湯氣血俱虛者十全大補湯心腎虛熱者六味丸虛寒者八

味丸心經血虛者團參湯胃經氣虛者六君子湯飲食勞倦者補中益氣湯嗜卧倦怠者升陽益胃湯熱傷元氣者清燥湯暑干心胞絡者清暑益氣湯外傷風邪者惺惺散虛勞羸瘦者人參養榮湯思慮傷脾者歸脾湯怒動肝火者小柴胡湯肝經虛熱者加味逍遥散肝經濕熱者龍膽瀉肝湯泄瀉脉微者人參理中湯手足汗者補中益氣湯胸腹汗者四君子湯當心一片有汗者茯苓補心湯黄汗者茵蔯五苓散血汗者血餘散敷之此皆去汗之大法也仍推五臟相勝主之若汗出如油喘而不休此爲命絶柔汗發黄此爲脾絶汗出不流如貫珠者爲絶汗數者並不治若六陽虛則汗出上至頭下至項亦多主難治

實小兒脾虛自汗多出額上沾粘人手速救胃氣全蝎觀音散用蓽茇煎湯調服及沉香飲爲治　脾虛瀉自汗遍身冷而出有時遇瀉則無瀉過即有此候太虛急當補脾投益黄散參苓白术散附子理中湯

肺虛自汗其候右臉色多晄白肺脉按之無力蓋久因咳嗽連聲不已痰少不活乃肺經虛氣上壅致令汗出宜令補肺散爲治及以藿香飲調脾此又益母救子之義也　慢驚自汗偏體俱有其冷如冰此

證已危金液丹固眞湯主之

有實證自汗外因感冒風邪發熱無問昏醒浸浸汗出當救表解肌用百解散水煎服或間投五苓散温白湯調下

錢治病有等　張氏三子病大者汗徧身次者上至項下至胸小者但額有汗衆醫以麥煎散治之不效錢曰大者與香瓜丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈

香瓜丸

柴胡 去蘆　鱉甲 醋炙黃　黃蘗
黃連　蘆薈　青皮 各等分
右除黃瓜外同為細末將黃瓜割其頂填入諸藥
至滿却蓋口用杖子插定火内煨熟將黃瓜及藥
同用麪糊丸如菉豆大每服二三十丸食後冷漿或
新水下大者五七丸不及十丸
中部 胃怯汗上至頂下至臍此胃虚當補胃益黃散主之
心汗 錢六陽虚汗上至頂不過胸也不須治之　喜汗厚
衣卧而額汗出也止汗散主之
止汗散　用故蒲扇灰研細每服二錢溫酒調下無

時
薛氏方十全大補湯　治諸虚不足自汗不食時發
潮熱等證
白茯苓　人參　當歸
白术　黃芪 炒　川芎
肉桂　白芍藥 炒　熟地黃
甘草 炒各等分
右每服二三錢加薑棗水煎服
八珍湯 即前方去肉桂黃芪方見治驗各門
人參養榮湯　治病後時自汗或發潮熱口乾食少

心虛驚悸欬而下利 即前方去川芎加陳皮五味子遠志
升陽益胃湯 下利　加減八味丸 虛羸
清燥湯　清暑益氣湯 注夏
惺惺散 痘　歸脾湯 作痛
小柴胡湯 發熱　加味逍遙散 發熱
龍膽瀉肝湯 肝經諸熱　人參理中湯 吐瀉
茯苓補心湯 瘡　茵陳五苓散 黃疸
曾氏方
全蝎觀音散 吐瀉　沉香飲 吐瀉
益黃散 脾　參苓白术散 吐瀉

理中湯 吐瀉　補肺散 欬嗽
藿香飲 脾胃　金液丹
四真湯 脾胃 驚　百解散
五苓散 驚 吐瀉
團參湯　治小兒虛汗或心血液盛亦發為汗此藥
收斂心氣
新羅人參　川當歸 各三錢
右剉細用雄猪心一箇切三片每服二錢猪心一
片井水一盞半煎至一盞食前兩次服
牡蠣散　治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗

牡蠣火　黄芪　生地黄各等分
右剉散每服二钱或加浮麥煎
撲汗方
黄連　牡蠣粉　貝母各半兩
右用米粉一升傅之
血餘散　治汗不止
用男子亂髮一握煆存性為細末以絹袋盛置乾
撲之
盜汗睡則汗出寤則自收也錢氏曰小兒睡而自汗
出者肌肉虛也止汗散主之徧身汗出者香瓜丸主
之至胷下至臍此胃虛也當補脾益黄散主之

自汗屬陽虛盜汗屬陰虛蓋陽為衛氣陰為榮血
血之所主心也所藏肝也熱搏於心故液不能內斂
而外泄於皮膚人卧則靜而為陰覺則動而為陽故
曰自汗屬陽盜汗屬陰也多因心腎不交水火不能
既濟腎虛則閉藏之令失守故有是證宜用六味丸
十全大補湯血虛內熱者當歸六黄湯心經有熱者
導赤散肝經虛熱者六味地黄丸血脫盜汗者當歸
補血湯肝膽風熱者柴胡清肝散食積內熱者二陳
枳實山梔胃氣虛熱者六君子湯及浮麥散血氣俱

虛者人參養榮湯餘證見自汗當參覽之〔附〕有夜
睡中而汗自出者名盜汗此因陽虛所致久不已者
令人羸瘠枯瘦心氣不足津液妄出故也用茯神湯
加黄耆水煎柴燒鹽燒服
〔錢〕黄芪散　治虛熱盜汗
牡蠣煆　黄芪　生地黄各等分
右為末煎服不拘時
白术散　治自汗盜汗
白术叁錢　小麥壹合炒
用水壹鍾半煮乾去麥為末以　黄芪煎湯量兒

大小調服忌蘿蔔辛辣炙煿之類乳母尤忌〔又〕〔圓〕
參湯亦治盜汗
當歸六黄湯　治血虛盜汗內熱晡熱者
當歸　熟地黄各伍分　生地黄炒叁錢
黄連炒黑　黄栢炒黑　黄芩炒黑各叁分
黄芪炒伍分
右水煎服
沉香鼈甲丹　治潮熱盜汗
沉香　草龍膽　當歸酒焙乾
鼈甲童子小便炙一宿　天靈蓋酥炙　綿黄芪剉各壹兩

川黄連　川大黄（濕紙煨各）

右件搗羅爲細末煉蜜和如黍米大每服拾粒用
麥門冬去心煎湯下量兒大小加減

從蓉丹　治血少肌瘦盗汗
肉從蓉（酒浸一宿去皮炙乾）　鼈甲（塗醋炙黄去裙襴各）
壹兩　當歸　綿黄芪
何首烏（各半兩）
右件搗羅爲細末煉蜜和如黍米大每服十粒溫
米飲下食前量兒大小加減

麻黄湯　治肌熱盗汗（幼科三）　全五
升麻　綿黄芪　人參（去蘆頭各壹兩）
熟乾地黄（半兩）　已上搗羅爲細末次用
天竺黄　牡蠣粉（各半兩研勻）
右件通拌勻每服半錢至一錢煎竹葉湯調下

牡蠣散　止盗汗
牡蠣粉（貳兩）　麻黄根（爲末）　赤石脂（細研）
糯米粉（各壹兩）　龍腦（研壹錢）
右件再研拌勻每用豆匙頭新綿包每日及夜常
常撲身體頭面有汗處

虎杖散　治實熱盗汗虎杖水煎服量多少與之無

時

海藏云晉郎中子自嬰至今病盗汗凡七年矣諸藥不效予
與涼膈散三黄丸三日病已蓋腎爲五液化爲五濕
相火逼腎腎水上行乘心之虚而入手少陰心火炎
上而入肺欺其不勝己也皮毛以是而開腠理玄府
不閉而爲汗出也出於睡中者爲盗汗以其覺則無
之故經曰寢汗憎風是也先以涼膈散瀉胸中相火
相火退次以三黄丸瀉心火以助陰則腎水還本臟
玄府閉而汗爲之自已

嘗有小兒無疾睡中遍身汗出如水覺而經久不乾（幼科三）　全六
此名積證盗汗脾冷所致用三稜散水煨薑煎服大
投益黄散參苓白术散

三稜散（癖積）

有時時冷汗微出髮根如貫珠面額上濈濈然此爲
驚肝證宜鎮驚丸或琥珀抱龍丸及茯神湯加麻黄
根水煎服取效

鎮驚丸　琥珀抱龍丸
茯神湯（二方並見驚篇）

噫氣

脾經曰脾病則面黃善噫噫者寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃而為噫又善思善味其證當臍有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜臥四肢不收經曰脾主四肢有是者脾也又曰二陽一陰發病主驚駭背痛善噫何謂也竊謂上焦受氣於中焦中焦氣未和不能消穀故為噫耳中焦亦脾胃之分也脾土虛寒由命門火衰不能溫蒸水穀古人有服兎絲子旬日間飲食如湯沃雪亦此義也宜進補脾宜人參理中湯補右腎宜用八味丸胃氣虛不能運化水穀者六君子加木香鬱結傷脾者加味歸脾湯木尅土者四君柴胡升麻兼嘈雜者加吳茱萸半夏治者審之

理中湯 吐瀉

八味丸 方而

加味歸脾湯 驚悸

本事枳殼散 治心下痞悶或作痛多噫

枳殼 去瓤麩炒　白朮 各半兩　香附子 炒壹兩

檳榔 叁錢

右為末每服一錢空心米飲調下

四味萸連丸 治脹噫氣吞酸食不能化

吳茱萸 炒　黃連 炒　神麴

荷葉 各等分

右為末煮神麴糊丸桐子大每服二十丸白湯下

黃連當隨病微甚或炒黑炒黃用之

下氣

【薛】劉河間云腸胃鬱結穀氣内發而不能宣通於腸胃之外故喜噫下氣也若癲癇勞瘵氣下泄而不止者必死乃眞氣竭絶腠理閉塞穀氣不能宣通於腸胃之外故從腸胃中泄出要旨云下氣屬心虛經云夏脉者心也心脉不及下氣爲泄者是也經又云飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行此平人也若七情内傷六淫外侵飲食不節房勞過度致脾土之陰受傷轉運之官失職不能輸化故下氣也又曰陰精所奉其人壽陽精所降其人夭陰精者乃五穀之精上榮心肺以降腎肝故曰其人壽陽精者乃胃中之清氣陷入腎肝不能升浮上輸心肺故曰其人夭若飲食過度腸胃鬱結用平胃散癲癇勞瘵用補中益氣湯心氣虛弱用補心丸心氣虛寒用補心湯脾胃虛寒用理中湯肝木乘脾用六君子湯加木香脾氣鬱結用加味歸脾湯脾氣下陷用補中益氣湯命門火衰用八味丸腎氣不足用六味地黃丸大凡噫氣下氣者其脉不及木位内經云短則氣病以其

無胃氣也諸病見此脉難治但純補胃氣爲善

平胃散 不能食

補心丸 即茯神散爲丸方見驚悸

補心湯 癎

理中湯 吐瀉

加味歸脾湯 驚悸

八味丸 不能食

子113 046

尋衣撮空

【薛】尋衣撮空許叔微謂之肝熱夫肝主筋筋脈血枯而風引之故手指爲之撮斂也宜確服六味地黃丸間有回生之功錢仲陽用瀉青丸此治肝經實熱蓋尋衣撮空皆病後之證治者求其實熱則百無一二矣治者審之王海藏治[illegible]尋衣撮空摸床手揚搖頭錯語失神脈弦浮而虛血脫內躁熱之極也氣粗鼻乾此爲難治用生地黃連湯主之　王少參孫女

十二歲脾胃素弱後成痢疾發熱小腹膨脹堅直大便泄瀉氣喘咳嗽徹夜煩躁不睡鼻塞眼暗譫語其脈大而無根用人參一兩附子三分服漸減脈漸斂然猶尋衣撮空鼻孔出血用六味地黃丸料二服如脫乃晝服獨參當附湯夕服地黃丸料脈漸有根諸證漸愈又用六君子補中益氣湯而痊　一小兒停食夜驚腹痛服消食丸瀉數次尋衣撮空面青黃或色白此脾土受傷肺金休囚肝火旺而然耳先用異功散加升麻以補脾土用六味地黃丸料以滋肝血稍定各二劑漸愈却用補中益氣湯六味地黃丸間以異功散而痊　一小兒膝癰誤觸其膝出血甚多忽然昏憒[illegible]此陽[illegible]陰散而虛寒用十全大補湯加附子三分四劑未應用人參一兩附子五分急煎服稍退又二劑頓退乃朝用異功散夕用八珍湯而安　一小兒傷風表汗後患前證惡風面白手足冷用補中益氣湯加五味子汗頓止而諸證漸退又用四劑而安乃服十全大補湯而愈

生地黃連湯　治血脫尋衣撮空搖頭妄語

川芎　生地黃　當歸各錢半

赤芍藥　梔子　黃芩

黃連[illegible]　防風壹錢伍分

右每服三錢水煎服

子143 047

喜笑不休

經曰心藏神有餘則笑不休又曰在臟為心在聲為笑在志為喜又火太過曰赫曦赫曦之紀其病笑譫狂妄又云少陰所至為喜笑又云精氣并於心則喜此數者皆言屬心火也若笑不休呻而為腹痛此水乘於火陰擊於陽陽伏熱生狂妄譫語不可關心之損矣扁鵲云其人唇口赤色者可治青黑者必若腎水虧涸不勝心火而喜笑不休者用六味地黃丸肝火熾盛能生心火而喜笑不休者用柴胡清肝散

餘兼別證各從其證而參治之　一小兒喜笑常作不安面赤飲冷手足並熱先用黃連瀉心湯末二服稍定又用六味地黃丸料煎服頓愈常服此丸則安月許不服仍復作又服愈矣　一小兒患前證面青赤此肝心二經風熱所致也用柴胡梔子散六味地黃丸漸愈又因乳母大怒發熱先用加味柴胡湯又用加味逍遙散毋子服之並愈　一小兒年十四歲用心過度飲食失節患喜笑不休脉洪大而虛面色赤而或白余用補中益氣湯而愈次秋科舉出勞發前證復作或兼譫語脉洪大按之微細如無

並兩齊蒸煎服稍定又二劑而愈又因勞役用心作汗作渴煩躁似癇證先用當歸補血湯二劑頓安又十全大補湯而尋愈

子143 048

瘡瘍

癰疽證治已詳瘍醫準繩其在小兒雖肌體柔脆治天眞未鑿鮮丘壑之毒亦無五苦七惡之診初生周晬前後徧體生瘡俗忌療治其他小小癰癤自可敷貼而消若憎寒壯熱沉困躁擾為心腹之害又當求其本而治之乳下嬰兒母子俱服是在醫師神而明之無按圖索驥之理薛氏乃擬大科癰疽證治贅附保嬰近於駢拇枝指矣若夫辨流窮源明經絡分表裏審順逆則無大小之異有專科書在又何贅焉今第以小兒所專者集為是編以至危且急殺人須臾如丹毒故首列之且獨加詳焉

〔總論〕夫瘡瘍皆因臟腑不調經絡壅滯而得或由胎毒或是風化為蟲或則熱氣有盛或是驚入皮膚其大者是滯於血脈而横出於皮膚之間若節其氣血則易破若或風纏則生癮軫或是外邪所入即多瘙痒而不定其食毒則滯死其血氣久則化為膿也或作發瘡者驚木無物亦踐其血氣在臟而為積在腑故出皮膚為瘡發遍身而四肢難較風瘡亦發形甚小世呼為疥熱瘡癢發處不定

疥蟲窠疥常發於腔後作其窠窠內有蟲如蟣子義因腹中蛲蟲隨穴而化其瘡即較而再發或片子如癬相似其有死血痒若以藥餌較其足歸腹中須是取却蟲方妙及與殺蟲藥

曾內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火火鬱內發致有斯疾蓋心主乎血血熱生風風熱內甚遍相傳襲故火能生土血汗陽明主肌肉風熱與血熱相搏發見皮膚其瘡不一有黃膿而作者土生金母歸子也始生微痒而熱輕痛痛潰爛為熱極血凝化水氣滯甚至寒熱作而飲食減尤為可慮宜宣泄風毒經解胃熱用當歸散加黃連升麻乾葛水蒿葱燈心煎服及三解散牛蒡湯木通散雖服塗以四黃散一抹金

當歸散（解熱） 三解散（方見）

牛蒡湯（咽瘡） 木通散（方）

四黃散 治小兒身上一切熱瘡疥癩痒抓破有汁不乾

淨黃連 黃檗 黃芩

大黃 滑石（各等分） 五倍子（去蟲屑）

右剉為末用清油和調二錢至三錢塗搽患處

仍服四順散消毒飲

一抹金治小兒遍身生瘡潰爛如糜梨燥痛膿汁不
乾

黎蘆淨洗焙　蛇床子去皮土　紅丹水飛過叁味各伍錢

硫黃　赤石脂　明白礬火飛過

五倍子去蟲屑　黃檗炙去皮各半　輕粉伍拾貼一

右前八味或曬或焙為末仍同輕粉在乳鉢再杵勻用生肥猪膏碎切以瓦鉢和藥末爛杵塗抹患處或清油調搽亦可

【湯】小兒血氣凝滯而有熱毒之氣乘之故結聚成癧癧腫毒也未結之先微見有紅頭癧子隱起作疼者急用不語唾夜半頻頻塗之敗醬不可用即消散若已結者宜用天烏散貼方若內顯躁熱不寧等證即須內服漏蘆散真良方也熱甚者用青解毒丸四順清涼飲防風連翹玄參劑亦可服五福化毒丹尤良連翹湯可服青露散搶之留小孔後用驚毒掩子收瘡口熱甚者涼膈散亦可服下方後附列

【胎毒瘡湯】保嬰寶鑑云初生芽兒一塊血也無形證也無脉有驚即係是胎驚有熱即係是胎熱與兒實與乳母一體凡患瘡疾但審乳母肝經有熱用加味小柴胡湯之類肝經虛熱用加味逍遙散之類腎水不能生肝用地黃丸心經積熱用柴胡梔子散心經虛熱用茯苓補心湯膏粱積熱用東垣清胃散脾經鬱熱用錢氏瀉黃散脾經虛熱用錢氏異功散若服犀角丸化毒丹外敷寒涼之藥復傷生氣乃促其危也

【胎毒瘡湯】因食膏粱厚味或乳母七情鬱火所致若腫骨作痛氣血凝滯也用仙方活命飲以瀉便秘熱毒內蘊也用四順清涼飲佐以如聖餅解硬色赤熱毒凝聚也用活命飲佐以隔蒜灸解散不消欲作膿也用托裏消毒散不成膿或成膿不潰氣血虛也用八珍湯潰而肉赤不斂脾血虛也用四物參朮肉白而不斂脾氣弱也用四君芎歸食少體倦而不斂脾氣虛也用六君當歸升麻凡藥對證無有不愈設或妄行攻毒元氣虧損則變惡證而難治矣大抵瘡瘍屬腑者易治元氣無虧者不治自愈屬臟者難治元氣虧損者則變為惡證疾行註代元氣虧損尤難療理故切不可用峻厲之劑觀東垣丹溪云但見腫痛參之脉證虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用驅逐敗毒不免有虛虛之禍矣

漏蘆散治小兒癧瘡及丹毒瘡痛

當歸散(見前)

解表消毒飲 治小兒瘡瘍腫焮痛便利調和脈浮而洪有表證者用之

黃芪(炒二錢) 葛根

升麻 赤芍藥 玄參

牛蒡子(炒研) 麻黃(去根節) 甘草(各伍分)

連翹(壹錢) 更看是何經分野加引經藥 手少陰加細辛(叁分) 足少陰加獨活(柒分) 手太陰加桔梗白芷(各伍分) 足太陰加蒼朮(柒分) 手厥陰加柴胡(柒分) 足厥陰加柴胡青皮(各伍分) 手太陽加藁本(伍分) 足太陽加羌活(柒分) 手陽明加白芷(伍分) 足陽明加升麻葛根(各柒分) 手足少陽加柴胡(柒分)

一劑生薑三片葱白一根煎七分溫服不拘時

化毒飲 治小兒瘡瘍腫硬痛深大便祕澀脈沉而實有裏證者用之

瓜蔞(半個子炒研) 連翹 牛蒡子(炒研)

當歸 白芍藥(各壹錢) 川大黃(壹錢)

芒硝(伍分) 甘草(六分)

右用水一鍾煎至柒分入溫服不拘時

連翹散 治癰癤等

連翹(壹兩) 沉香 黃芪(各半兩)

白斂 川朴硝 川大黃(炮)

甘草(各壹分)

右搗為麤散每服一錢水一盞抄入麝香壹錢煎五分去滓放溫食後服

寄生散 治毒腫甚者

桑寄生 獨活 川大黃(各壹兩)

犀角屑 朴硝 甘草(各半兩)

右搗羅為細末每服一錢水一盞煎五分去滓放溫服量兒大小加減

玄參劑 解諸般熱消瘡癤

生地黃 玄參(各壹兩) 大黃

末之煉蜜圓梧桐子大每服一圓燈心竹葉煎湯化下入沙糖少許亦可加羌活川芎赤芍連翹防風

涼膈散 治小兒臟腑積熱煩躁多渴頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡臥不寧譫語狂妄腸胃燥結便溺赤澀一切風壅並宜服之

川大黃 朴硝 甘草(各貳兩) 連翹(肆兩)

梔子仁　黃芩　薄荷葉各壹兩

右㕮散每服二錢水一盞入竹葉七箇蜜少許煎四分食後溫服大小加減

四順清涼飲 發熱

右解表攻裏之藥皆為腫瘍挾有內證者設也潰瘍勿拘此例

托裏榮衛湯　治瘡瘍外無焮腫內亦便利調和乃邪客經絡宜用此藥調理

黃芪炒　紅花各壹錢　蒼术米泔浸炒　柴胡

連翹　羌活　防風　當歸身酒拌

甘草炙　黃芩　人參各壹錢　桂枝柒分

右用水一鍾酒半鍾煎八分食遠服

秘方托裏散　治一切瘡毒始終常服不致內攻

瓜蔞大者壹枚　當歸酒拌　黃芪如前法製

白芍藥各壹兩半　皁角刺炒　金銀花

天花粉　熟地黃各壹兩

右為粗末每服以三歲兒為率用藥壹兩以酒一鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封重湯煮之仍覆以蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈

仙方活命飲

金銀花　橘皮各叁錢　皁角刺炒　穿山甲蛤粉炒

防風　沒藥　白芷　乳香

當歸各壹錢　貝母　天花粉　甘草節各捌分

右每服五錢酒煎服嬰兒每服一兩母子同服為末酒調服亦可毒在表者加麻黃散下毒在內者加大黃下之當臨時制宜此解毒回生起死妙劑

神効解毒散　治一切瘡毒初起腫者即消已潰仍腫者即散已潰毒不解者即愈

金銀花壹兩　甘草節伍錢　黃芪　皁角刺炒

當歸各叁錢　乳香　沒藥各貳錢

右為散每服二錢酒煎溫酒調服亦可嬰兒病乳母亦服如瘡已潰腫痛已止者去乳沒金銀花倍加黃芪甘草

治發背癰癤方

羌活壹兩　穿山甲炒焦半兩　生人骨煅存性半兩

麝香少許

右末煎麻黃薄荷酒調如陰瘡頭平向內者服之即突出其功效不可盡述若小兒痘瘡黑陷者只一服而起萬不失一

玄參丸　治疹痘後餘毒不散遍身生瘡不已大能

解毒

玄參　赤芍藥　生地黃

赤茯苓　荊芥　防風

木通　桔梗　黃芩

朱砂　青黛各等分

右爲細末煉蜜圓芡實大每服一丸薄荷湯下大

小加減服之

五福化毒丹　治熱毒蘊積頰赤咽乾口舌生瘡或

頭面瘡癤譫語不寧　方見驚搐

按前方生血凉血解毒疏熱中之劑形病俱實者殊

有良驗但一二丸即止不可過多過多則反傷元

氣變證不可言也

犀角消毒丸　治積熱及痘疹後餘毒生瘡

生地黃　防風　當歸

犀角鎊屑　荊芥穗各壹兩　牛旁子杵炒

赤芍藥　連翹　桔梗各柒錢

薄荷　黃芩　甘草各伍錢

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

按前二方善損中氣傷陰血若大人形病俱實脾

胃健旺者庶可用之恐東兒臟腑脆嫩不能勝此

經云氣主呴之血主濡之氣者胃中冲和之元氣

若胃氣一傷不能嘘濡消散膿已成者不能腐潰

膿已潰者不能生肌收歛因而難治甚致不起不

可不慎也

托裏消毒散　治胃經虛弱或因尅伐致瘡不能潰

散瘡未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生

人參　黃芪　當歸酒拌

川芎　芍藥炒　白术炒

茯苓各壹錢　金銀花　白芷

甘草五分　連翹各伍分

作二劑水煎徐徐服

散　治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及

惡寒發熱宜用此補托之

人參氣虛倍用　黃芪炒　當歸血虛倍用

白术倍用　茯苓　芍藥酒炒各伍分

熟地黃貳錢右自製

右作兩三劑水煎服

八味茯苓補心湯　治心氣不足血氣不和而患瘡

證昔製

茯苓　酸棗仁炒各一錢　五味子炒

當歸酒洗壹錢 人參去蘆伍分 白朮炒壹錢
菖蒲伍分 遠志去心伍分 甘草炒伍分
右作二三服水煎
外治天烏散貼方
天南星 赤小豆 草烏
黃柏
右等分為末生薑自然汁調貼患處用米醋調尤
佳
青露散 治背疽一切惡瘡圍藥不胤開
白芨 白斂 白薇
白芷 白鮮皮 朴硝
青黛 黃檗 大黃
天花粉 青露葉即芙蓉葉 老龍皮即老松樹皮
右各等分為細末生薑自然汁調塗留小孔如乾
再用生薑汁潤
驚毒掩 治瘡癤初發掩上即退已成速破
葱根柒箇 木鱉子柒箇 白芷叁錢
巴豆拾粒 黃丹肆兩 香油肆兩
右先用油入前四味武火熬用柳木篦攪以白芷
焦黑為度用絲濾去滓再入銚用文火燉却入黃

丹燉令紫黑色成膏為度治諸般瘡癤去膿收瘡
口
驚毒諸般腫痛掩子
蒲黃 大黃 黃檗
連翹 白芷 白及
白斂 真粉 牡蠣
丹參各等分
右為末水調塗腫處
敷藥鐵箍散 治一切瘡癤癰疽
芙蓉葉 黃檗 大黃
五倍子 白芨
右為末用水調搽四圍
按前方乃寒涼解熱收斂之劑或有用白蘞商陸
根者有用寒水石天花粉者有用蒼耳金銀花者
有用芭蕉赤小豆者有用草烏白芷之類者皆不
分寒熱溫涼之雜劑內經云先腫而後痛者形傷
氣也先痛而後腫者氣傷形也又云五臟不和九
竅不通六腑不和留結為癰外科精義云凡瘡腫
高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋脉肉色
不變發於骨髓蓋必有諸中而後形諸外故受證

之經與所患之位各有不同豈宜一槩外敷凉藥惟脾胃無虧血氣不和者庶幾有效若服化毒之類脾胃復傷血氣凝滯亦不能消矣至如疔瘡之類正欲宣拔其毒若復用前藥肌肉受寒血氣凝滯必致毒氣入內而不救治法必察其腫之高漫色之赤白痛之微甚作膿之難易出膿之稠薄生肌之遲速以別其屬陰屬陽或半陰半陽或純陰純陽而用相宜之藥以凉之熱之和之又當審受證之傳變五臟之相勝而以調補脾胃為主庶不致變惡證也

神功散　治瘡瘍初起腫焮者用之可消加血竭更好丹毒未破者亦可用之

黃蘗炒　草烏生用

右各另為末等分用漱口水調敷常漱口水潤之

右敷貼散腫排膿生肌收口等方並見瘍醫準繩宜於彼中查之茲不贅述

【丹毒】〔聖惠〕凡小兒一切丹皆由風毒在於腠理熱毒搏於血蒸發其外其皮上熱而赤如丹塗之狀故謂之丹也若又不歇則肌肉壞爛若毒氣入腹則殺人也今以一方同療之故號一切丹也　嬰童寶鑑小兒諸丹毒歌丹火初成似火燒天火渾身赤轉饒伊火觔邊青黑色風從額上起根苗谿骨殺道標丹毒如帶纏紅槩火調留火發時一日且改變無常五色標家火頻連雙腋乳天竈內踝及陰尻背并膝赤飛丹病股內臍陰尿竈招　巢氏云火丹候往來如傷寒赤着身而日漸大者是也　又云丹火候狀發赤如火燒須臾燦漿起是也　嬰孺方云火丹者往來如傷寒赤着身體不從傷火而付名如日出時以從其處又名日丹宜同用千金[illegible]　廬散　〔醫經〕云赤紫丹瘤皆心火內鬱而發赤如丹砂心主血而火性熱血熱相搏陰滯於陽卽發丹毒心虛寒則痒心實熱則痛從腹生出四肢者易治自四肢生入腹者難療當用百解散表之次以當歸散加連翹荊芥水煎服及牛蒡湯加炒麻仁研碎同煎與服熱拔毒其次赤葛散或初用化丹湯亦好　行身上發時亦如前證不甚燥痒但見出浮于遍體神將不悅名陰濕毒證先以沖和飲加南木香水薑煎服次用當歸散雄黃散然此二證不問赤白若入腹入腎多致為害不可輕視如常自取困爾　〔湯〕小兒丹毒乃熱毒之氣極與血相搏而風乘之故赤腫及游走徧身者又名赤

為風入腎入脈則殺人也大抵丹毒雖有多種病源
則一有赤丹毒遍身痒者或女子十五六而脈未通
者多發丹疹皆由血有風毒乘之宜服防己散

葛根白朮散　治小兒赤白丹毒

白朮　枳殼各壹錢　茯苓貳錢
木香壹錢半　葛根叁錢　甘草貳錢半

右剉散用水一盞煎不拘時服

犀角解毒散　治小兒赤丹瘤壯熱狂燥睡臥不安
胸膈悶滿咽喉腫痛遍身丹毒

牛蒡子炒壹兩伍錢　防風　甘草各貳錢半
荊芥穗伍錢　犀角壹錢半

右剉散用水煎不拘時服

防風升麻湯　治小兒丹瘤赤腫

防風　升麻　山梔去殼
麥門冬去心　木通　甘草節各壹錢

右㕮咀用淡竹葉三片煎食遠服

荊芥散

防風　天花粉　羌活
生地黃　當歸　蟬蛻各等分

右水煎服

百解散見前

防己散

漢防己半兩　朴硝　犀角
黃芩　升麻各壹分　黃芪各壹分

右㕮咀竹葉水煎量大小加減

牛蒡湯見前

化丹湯　解利丹毒遍身燥痒發熱煩啼

川獨活　射干　麻黃去節
青木香　甘草　黃芩
薄桂各伍錢去粗皮　石膏末

右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服

治小兒一切丹毒漏蘆湯一名漏蘆散

漏蘆　麻黃去根節　連翹
川升麻　黃芩　白斂
甘草　川芒硝各壹分　川大黃壹兩剉微炒

一方加枳實壹分麩炒微黃　赤芍藥一分剉

右爲麄末每一錢水一小盞煎至五分去滓溫服
無時

丹　小兒黑斑紅斑瘡痒癮疹並用防風通聖散治之

治小兒月內發一切丹藍葉散

藍葉　黃芩　犀角屑

川大黃剉微炒　柴胡去蘆　梔子仁壹分湯上各

川升麻壹分　石膏壹分半　甘草半分微炙

右為麤末每服一錢水一小盞煎至五分去滓下竹瀝半合更煎一兩沸放温無時量兒大小加減服後同

治小兒一切丹遍身壯熱煩渴升麻散

川升麻壹分　黃芩壹分　麥門冬叁分去心

葛根叁分　川大黃剉微炒　川朴硝壹分

右為麤末每服一錢水一小盞煎至五分去滓温

服無時

治小兒一切丹毒遍身赤痛大黃散

川大黃半兩剉微炒　防風半兩去蘆　川升麻壹分

黃芩壹分　麻黃根節壹分去　秦艽壹分去蘆

川朴硝貳分

右同㕮咀每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服無時

治小兒丹瘤臟腑壅熱太過心神煩悶大小便不通大黃散

川大黃微炒　川升麻　川朴硝

葵子　梔子仁壹分

右為麤末每一錢水一小盞煎五分去滓量兒加減溫服以利為度

治小兒一切丹發無常處身熱如火燒宜川升麻膏

川升麻　川大黃　護火草

蛇銜草　梔子仁　寒水石

川芒硝　藍葉　生地黃

芭蕉根　羚羊角屑　梧桐皮各半兩

右細剉以竹瀝浸一宿明日漉出却入鐺中以臘月豬脂一斤慢火熬一食久乘熱以綿濾去滓候

冷成膏甕盒盛旋取磨塗之兼以膏如棗大竹瀝化服之

千金治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒氣瘡癤方

漏蘆　連翹　白斂

芒硝　甘草炙各壹分　大黃肆分

升麻　枳實　麻黃去節

黃芩各壹分半

右以水一升煎取九合兒生一日至七日取一合分三服八日至十五日取一合半分二服十六日至二十日取二合分二服二十日至三十日取三合

合分三服三十日至四十日五合分三服

又方治小兒丹毒大腫身熱百治不折

寒水石拾陸分　乾藍青切　竹瀝各壹升
犀角　柴胡　杏仁去皮尖熬研各八分
生葛汁肆合澄清　知母拾分　甘草伍分
羖羊角陸分　芍藥柒分　梔子拾壹分
黃芩柒分　蜜貳升　石膏拾叁分

右水五升并竹瀝煮三升三合去滓內杏仁脂葛汁蜜微火煎二升三歲兒服二合大者量加之藥分太大嬰兒服未得

又方治小兒丹數非一皆主之

大黃　甘草　當歸
川芎　白芷　獨活
黃芩　芍藥　升麻
沉香　青木香　木蘭皮各壹兩
芒硝叁兩

右以水一斗二升煮取四升去滓內硝湯中適寒溫搨之乾再用差乃止

湯張三太尉女年十五歲病此諸醫百藥俱試而不能中召余視之以生料四物湯加防風黃芩一日而愈

生料四物湯　治血熱生瘡遍身腫痒及脾胃常弱不禁大黃等冷藥尤宜服之

生地黃　赤芍藥　川芎
當歸　防風各半兩　黃芩壹錢半

右㕮咀水煎量大小加減忌麪豬羊肉豆腐

丹小兒赤瘤主傷血熱宜生地黃木通荊芥苦藥帶發表之類外以芭蕉汁塗患處

治小兒一切丹毒大赤腫身體壯熱如火已服諸藥未減宜服藍青散方

藍青　知母　梔子仁
甘草微炙　杏仁去皮尖雙仁麩炒微黃各半兩
寒水石　石膏　犀角屑
柴胡去苗　黃芩各壹兩　赤芍藥
羚羊角屑各叁分

右為麄末每服一錢水一盞煎至五分去滓入竹瀝蜜生葛等汁共一合更煎三兩沸放溫無時服量兒大小加減

解毒散

寒水石　滑石　石膏各等分

右為末入辰砂少許量兒大小燈心湯下

赤葛散　治因血熱與風熱相搏遍身丹毒燥痒日久不消

赤葛（貳兩）　甘草（減半）

右㕮咀每服二錢無灰酒一盞煎七分無時溫服不飲酒者止用水一盞入酒一分同煎服

泉州大智禪師（又有）經進必效方載神聖治小兒頭面皮膚忽生瘡痒火燎丹發起赤腫帶有碎小瘡及赤暈上瘡初發如錢漸暈闊一二尺良久遍身入口耳到臟腑即不救此證可畏速治之此乃自積熱得

甘草（壹兩或半兩）

右㕮咀入水一盞或半盞煎湯溫溫令乳母含口內含漱徐徐吐淋洗病處以手掌與指不得犯指甲仍與兒甘草湯嚥一用仰不並開良久再淋三

瘡

治小兒丹上起吹紅散子

蕉根（半斤）

右為末每服二錢溫酒調下立效

治小兒一切丹毒通用

護火草（半兩）　紫朴　硝石（各半兩）一

右為末冷水調塗乾即再塗以差為度

治小兒一切丹毒遍身發熱硝石散

硝石（壹兩）　乳香（三分）

右為末以雞子清調塗之

又方

太陰玄精石（不拘多少）　為末水調塗

治小兒諸丹遍身如火纏腰即殺人

葵菜子（不拘多少）研細酒調飲兼塗丹上　一方以酒研細溫服無時

治小兒一切熱毒丹及赤腫疼痛

大黃　馬牙硝（研各壹兩）

又先將大黃為末入牙硝同研水調塗患處乾再易之

簡要濟衆方治小兒丹毒從臍中起

竈下黃土年深者（細研）　右以屋漏水或新汲水和成泥貼之乾即易

子母秘錄治小兒一切丹煩

柳葉（壹斤）　右用水一斗煮三升去滓搨洗七八次

綠袍散

綠豆（伍錢）　大黃（□）

右為極細末用生薄荷汁入蜜塗
白玉散
白玉即滑石　寒水石各[illegible]錢半
右為極細末用醋調塗或井水調塗亦得
碧雪
芒硝　青黛　寒水石
石膏　朴硝　馬牙硝
甘草各壹錢
右為極細末傅
朱黃散　治小兒赤瘤丹毒用鈹刀子踈去瘤頭赤
出惡血毒汁
土硝伍錢　大黃壹錢
右為極細末用新汲水調勻塗
[方]又傅丹毒方只一夜消盡用花紫石生薄荷皆自
然汁調鵝毛刷上患處為妙
胎毒發丹　[論]胎毒發丹者因胎毒內伏或頻浴熱湯
或著烘衣或乳母飲食七情內熱致邪為患發於頭
面四肢延及胸腹色赤遊走不定古人云從四肢起
入腹囊者皆不治當急令人隨患處遍吮毒血各聚
一處砭出之急服活命飲併用內忠砭以其肌肉

壞行也若發散過劑表虛熱而赤不退者用補中益
氣湯加防風白芷寒涼過劑胃氣受傷而熱赤不退
者用異功散加柴胡升麻或兼發搐等證用四君升
麻當歸釣藤鈎若復用攻毒必致不起頭額間患者
當用鎌砭之　一小兒患丹赤暈走徧遍身難以悉
砭令人吮四肢胸背數處使毒血各凝聚而砭之先
用活命飲末酒調二服又以金銀花甘草節為末用
人乳汁調服漸愈月餘後兩足皆腫仍砭之服前藥
而痊數日後兩足復赤或用犀角解毒丸之類致乳
食不進肚腹膨脹此復傷脾胃而然也敷神功散服
補中益氣湯加茯苓而痊　一小兒腿如霞片遊走
不定先以麻油塗患處砭出惡血其毒即散用九味
解毒散而安　一小兒臂患之砭出毒血而愈或於
前服護心散以杜後患服之吐瀉腹脹患處復赤
走效令余謂此脾胃虛弱前藥復傷用六君子湯
二劑頓愈又以異功散加升麻柴胡而痊　一小兒
腿上患之神思如故乳食如常余謂毒發於肌表令
急砭出毒血自愈不信外敷寒涼內服峻劑腹脹不
乳而死　一小兒患此二便不利陰囊肚腹俱腫余
用砭法隨以活命飲加漏盧木通大黃為末時用熱

水調服至兩許二便俱通諸證頓退却去三味仍前時服而愈　一小兒患此二便不利腹脹咳嗽用活命飲加滑石木通麻黄為末時時熱酒調服二便隨通遍身出汗諸證頓退身凸似絕無氣以動時或似躁此邪氣去而元氣虛也急用當歸補血湯而愈

砭法治丹毒赤色遊走不定令口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者以筋頭劈開夾之用線縛定兩指輕撮筋頭稍令磁芒對聚血處再用筋一根頻擊刺出毒血輕者止用口吮出毒用藥敷之如患在頭者不用砭法止宜用針卧倒挑患處以出毒血

遲則毒血入腹而難起矣　神功散治丹毒最効若砭後毒甚者宜用如毒輕者砭後不可用恐砭處皮膚既破草烏能作痛也方見前條

傷食發丹 傷食發丹者因脾胃之氣未充乳食過多不能運化蘊熱於內而達於肌表也若因乳食停滯者先用保和丸消之大便祕結量加大黄通之乳食既消而丹尚作者用清中解鬱湯治之丹邪既去而乳食不思者用五味異功散補之發熱作渴或飲食少思者用七味白术散補之大凡飲食厚味所致者赤暈或行而緩慢若飲燒酒或誤吞信石所致者遍身赤痛其行甚速又有疥瘡發癢而周圍有赤暈其熱消散或膿出自退凡此俱忌砭法皆宜安裏為上不可攻伐若自吐瀉亦不可止之吐瀉中有發散之意因飲燒酒者飲冷米醋一二杯解之此神妙之法也因母多食炙煿辛辣或飲燒酒或服辛熱燥藥或鬱怒傷肝脾致兒為患者當審所因而療母治之

驚丹 初嬰孩生後百日之內半歲以上忽兩眼胞紅暈微起面帶青黯色向夜煩啼或臉如胭脂此伏熱在內亦有臉不紅者始因居胎之時母受[illegible]驚邪傷胎遞相傳襲形發於外初發時散生滿面狀如水

豆脚微紅而不壯出沒休息無定次到頸項赤如朱砂名為驚丹用四聖散先洗其目次百解散加五苓湯同煎與解驚熱丹毒牛蒡湯當歸散三解散黄芩四物湯皆可為治　如驚丹發在胸乳間微有痰喘作搐急宜宣熱拔毒免致內流為害不淺五和湯加升麻生乾地黄木通燈心煎服則自消除仍用前敷藥調治不生他證或投前安飲

黄芩四物湯　治胎毒赤遊燥痒

黄芩壹兩　當歸酒洗　生乾地黄

赤芍藥　川芎四味各　何首烏去皮

草烏炮去皮 玄參各貳錢半 甘草壹錢
薄荷貳錢
右㕮咀每服水一盞煎七分無時溫服
四聖散初生目不開 百解散驚
五和湯發熱 牛蒡湯咽喉
當歸散 三解散俱發熱
五色丹 聖惠夫小兒五色丹者由丹發而改變無常或青黃白黑赤此是風毒之熱有盛有衰或冷或熱故發為五色丹也 孔氏家傳用小柴胡湯如法煎服以滓傅丹上良 川大黃川芒硝梔子仁黃芩等
葉商陸各等分為細末水調塗 棗樹根四兩丹
菊花壹兩半剉細每貳兩水五升煮叁升避風處溫浴兒 苧根葉壹斤細剉赤小豆叁合以水五升煮三升去滓避風處溫浴兒 青栗毬有刺者杵碎水煮浴兒 蒲席灰雞子白和塗 牛屎傅之乾即易 豬槽下爛泥傅之乾即易 縛母豬頭骨臥枕之
白丹 聖惠夫白丹者由挾風冷之氣故使色白也初發痒痛微虛腫如吹奶起不痛不赤而白色也 酸母草五葉草各五兩絞汁塗 川大黃杵為末以馬齒莧自然汁調塗 爛杵蓼葉塗 爛杵蘭香葉塗 醋和梁上塵塗 豬脂和鹿角灰塗 燒豬糞灰雞子白和塗
張渙香豉散 治白丹疽滿身癢如吹方
香豉炒微焦 伏龍肝各壹兩
右為末生油調塗之
聖惠又云夫白脉者由風氣折於肌中與風相搏遂為瘀也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減身暖亦差宜用此方
枳實剉
右用水煮取汁洗拭丹上
治小兒風熱毒腫白色或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走滿身中白脉搔不已五香連翹湯
青木香 藿香 雞舌香
沉香 麻黃 黃芩各壹分
大黃捌分 麝香半分 連翹
海藻 射干 升麻
枳實各貳分 竹瀝汁叁合
右水四升煮藥至一半內竹瀝煮取壹升貳合兒生百日至二百日一服貳合二百日至朞年一服

外臺備急治白丹
苧根（參兩） 小豆（肆升）
右以水一斗煮取浴 四五次
赤丹 聖惠大赤丹者由風毒之...故令赤也初發腫
起大如連錢小者如麻豆肉上生粟色如雞冠故亦
謂之茱萸丹也
治小兒赤丹毒腫升麻膏
川升麻 白蘞 漏蘆
川芒硝（各壹兩） 黃芩 枳殼
連翹 蛇銜草（各壹兩半） 梔子仁
蒴藋（各貳兩）
右剉細以豬脂一斤半慢火煎諸藥令赤色去滓
放冷甕盒收旋取塗之
治小兒面身卒得赤丹或痒或腫不速療之即殺人
宜用此方
羖羊角屑（燒灰）
右以水五升煎一升細濾入煉了豬脂伍兩和塗
張渙升麻膏治赤丹初發肉如火色如雞冠又名茱
萸丹
川升麻 白蘞 漏蘆
芒硝（各壹分） 連翹 梔子仁（各半兩）
右細剉以豬脂一斤慢火同煎諸藥令赤色去滓
放冷塗
千金云凡小兒丹初發從身起如細繩一宿成瘡
名茱萸丹赤小豆為末粉之如不成瘡以雞子白
調傅之
治小兒赤丹 醋和蕎麥麵令之 醋調胡粉從外
向內塗之 豬脂和鍛鐵屎傅之 雞白調黃米粉
塗 赤兒蜈蚣為末入硫黃研勻水調鵝翎掃頭焦即
止 天茄兒葉俗名老鴉眼睛取葉和醋擂傅 以
蓼鹽湯洗了挼蓼塗之
千金治小兒火丹色如朱皮中走 醋研豉成膏傅
鯉魚血頻頻塗 研粟米塗
黑丹 聖惠大黑丹者由風毒傷於肌肉故令黑色也
初發痒痛或燃腫起微黑色也 風化石灰貳兩屋
角上草灰（兩）燒灰為末雞子清調塗 茺蔚子 蛇銜
景天 護火草各二兩打爛雞白調塗 豬牛脂熟煎病
七日三五度用之 ... 豬糞下泥塗
又以猳豬糞杓子炙令...塗之

張渙秘毒丹　治丹毒發赤腫痛腫起

川升麻　漏蘆　芒硝各貳兩

黃芩　梔子仁各壹兩

右為麤末每以水[illegible]匙頭木微熱以帛搨丹上以消為度

天火丹　聖惠夫小兒丹發肉中有如丹赤色者大者如手劇者遍身亦痒故號天火丹也　木牢天火丹從背起赤點用桑白皮末羊脂調塗　麻油五合生鯽魚半斤同杵如泥塗丹上乾即易　虎脂貳兩黃丹壹兩研為膏塗　桑根白皮貳兩甘菊花壹兩半

升麻荊芥草各壹兩剉勻每用貳兩水煎升煮貳升去滓溫浴兒避風　以小兒埋胞衣瓶子中水一二合與兒服及塗身上有毒處　千金治天火丹病初從髀間起小兒未滿百日犯行路竈君若熱流陰頭赤腫血出方用伏龍肝為末雞清調塗

又方　鯽魚肉剉伍合小豆末參合杵成膏水和傅之良　又諸火丹天火能火者肉作瘡急以鹽湯噴次以山藥塗若如無生者以乾末水調　又方以羊脂調赤石脂末塗之

鬼火丹　小兒丹發兩臂赤起如李子名鬼火丹治之方　景天草伍兩蛇銜草參兩杵如泥以雞血調塗

戎鹽壹兩附子壹枚燒灰為末雞血調塗

張氏戎鹽散

戎鹽壹兩　附子壹枚　雄黃半兩水飛

右同研為末每用少許以雞血調塗

顱囟經治鬼火丹從面上起以雞清調竈下土塗立差

野火丹　聖惠小兒丹發赤斑斑如梅子遍背腹名野火丹　千金凡遍身皆赤者名野火丹　雄黃戎鹽

各半兩為末雞白調頻塗以差為度　竈中黃土壹兩青竹葉貳兩燒灰為末雞白調塗　白殭蠶二七兩護火草壹兩杵爛塗之　酒塗　油塗　雞清和赤豆末封之遍身者合塗之令遍

家火丹　聖惠小兒丹初發有兩頰兩腋上兩腋下名家火丹　杵木白皮參兩各參兩燒灰雞白調頻頻塗之以差為度

嬰孺方治家火丹攻喉入腹大不利方　用硝石凝水石銅器中熬乾研服方寸匕

又方烏頭[illegible]赤石脂[illegible]細研雞清調塗神良

殃火丹（聖惠）小兒丹初發兩脇及腋下腿上謂之殃火丹用川朴硝研爲末每服以竹瀝調下半錢更量兒大小加減　浮萍杵汁時時服之　千金用伏龍肝爲末生油調塗乾易之若入腹及陰絞護火草汁服之

張渙救毒散　川朴硝（一兩）梔子仁（一兩）爲末醋調塗

又方　山梔子仁（燒灰半兩）鯽魚（一枚）同杵如泥旋以醋化少許塗丹上（每日三五次）

神火丹（聖惠）小兒丹發兩脇不過一日便赤黑謂之神火丹　景天草花絞汁先撚指丹上後塗之以差爲度　鯽魚半斤杵如泥塗之頻塗爲良　醋調梔子仁末塗

熒火丹（聖惠）小兒丹發如灼在脇下正赤初從額起或從耳起而多痛名熒火丹　赤小豆（一合）硝石（半兩）寒水石（一分）爲末每以冷水調半錢日三服量兒加減（張氏調塗）　竈中黃土（一合）生油（一合）同研如泥時用塗之以差爲度若痛上陰不治仰殺人也　景天草杵爛以醋調塗

朱田火丹（聖惠）小兒丹先發於背遍身一日一夜而成者名朱田火丹　治法取棘根煮汁洗之若已成瘡用小豆末傅之未成者以雞子清調小豆末傅　藍靛塗　雞子清塗

天竈火丹（聖惠）小兒丹發兩髀裏尻間正赤流至陰頭赤腫血出者是也治之方

薺葉（一兩）　赤小豆（一合）　[illegible][illegible]門上灰（壹兩）

青羊脂（叁兩）　葱白（一握）

右相和杵如膏塗之燥即塗之

又方　細辛（三分）糯米（一合）景天草（二兩）杵如泥塗丹上差

又方　伏龍肝赤小豆等分爲末雞子白調塗　又桑根煮汁浴之　車前子爲末水調塗　蠶沙一升水煮去滓洗　鐵落末錫和如膏塗　杵生浮萍傅之　天小兒丹從髀起小兒未滿百日犯行路竈君若熱流下至陰赤腫血出以雞清調伏龍肝傅　又以鯽魚肉同赤小豆杵爛入少水和傅

發竈火丹（聖惠）小兒丹發從足趺起正赤者是也治之方

寒水石　硝石（各半兩）　芥草（壹兩）

右爲末每以新汲水調下半錢更量兒大小加減（張氏用入調塗）

又方

小兒方　　川角與之

右為末雞子清調塗

又方在加葉根（五兩燒灰）以鍜鐵槽中水調塗　棗樹根木煮汁浴（三五次）　桑根煮汁洗

尿竈火丹　聖惠小兒丹發膝上從兩股起及臍間走入陰頭者是也治之方桑根白皮（一斤）剉以水七升煮四升去滓看冷熱避風浴之　李樹根（一斤）燒灰為末取田中流水調塗　以屋四角茅（各一握）燒灰為末雞子白調塗　以桑白皮李根同剉煎湯洗之

赤流　聖惠大小兒身上或一片片赤色如臙脂及漸引此名丹毒俗謂之流若因熱而得者色赤或因風而得者色白皆腫而壯熱也可用一鈹刀散鎌去惡血未入腹者可療也

治心熱身上赤流色如臙脂皮膚壯熱升麻湯

川升麻　川大黃（濕紙炒）　川朴硝

玄參（各半兩）　犀角屑　黃芩

梔子仁　木通　甘草（各一分微炒）

右為末每服一錢水一小盞煎五分去滓溫服無時量兒加減

千金治赤流丹腫作赤……方……

合良方以傳之也　又服黃龍湯二合并傳患上（柴……）

（丹湯大柴胡　名黃龍湯）

乳香散定疼

天仙藤（一兩）　乳香（二分）

右每服一錢溫酒下

嬰元獻公明效方牛黃散　治小兒初生至二三歲一切風發赤白流走遍身服方

牛黃　朱砂　蝸牛肉

全蝎　白殭蠶　天麻

白附子　乳香　麝香（各一分）

生龍腦（一錢）　蟾蜍翅（血粉五月中採）

右十一味為細末每服一字薄荷水調下初生一兒洗了後用乳調少許塗口中胎疾永除

張渙方治小兒赤流熱如火宜用大黃散

川大黃（生）　鬱金　黃蘗

膩粉　豬牙皂角（各半兩去皮子）

右為末生油調塗

又方

護火草汁（一合）　赤地利末（一錢）　膩粉（一錢）

右相和量兒大小加減服之良久瀉下血片為效

其滓傅在赤處亦佳

治小兒赤流半身色紅漸漸展引不止方

牛膝(去苗 壹兩) 甘草(生 半兩)

右剉以水一大盞煎五分去滓調伏龍肝末塗效

又方 大黃(生 壹兩) 赤小豆(半合炒 紫色) 川朴硝(叁分) 爲末

雞子調傅勿令乾

又方 李子油(壹兩) 朱砂末(壹分) 調如膏塗之

千金治小兒赤遊丹一日一夜即成瘡先從背起漸至遍身如棗大正赤色者用煮棘根洗法(其方已見火丹門)

玄胡散 治小兒赤流

玄胡索(壹兩) 天南星(貳兩) 朴硝(半兩)

巴豆(貳柒個 去油)

右爲末芸薹汁調毛翎掃之

治赤流白流火瘢諸丹等方

好牛膝(壹錢 銼) 烏賊魚骨(壹錢) 大蜈蚣(壹條全者 炙)

麝香(叁拾文) 輕粉(貳拾文)

右一處乳鉢內研極細看丹多少用藥醋調令稀

毛翎掃丹上立止

治赤白流 雄黃(半兩) 白礬(壹分) 白土(壹分) 爲末水調掃

治小兒表裏受熱之甚忽發遍身赤腫狀似丹疹者於腹中周匝則不可救名曰赤油唯此藥如神

胡荽(不以多少)

右研取自然汁調水銀粉入[illegible]拌勻以翎毛掃上病處須臾赤色便變爲白色[illegible]不妨或自破亦無害乃是病去也調時[illegible]

聖惠方云取摩羅葉汁塗赤處隨手便效

幼幼書譚氏殊聖方歌云五遊忽發遍身形恐使令人損怖驚乍睡剎那生滿體莫寃神鬼錯看承甘泉消了容能骨感攝消磨去痛疼更取鐵槽連底水調和須掃便身輕宜消腫散

消泉硝石 白龍骨(各壹兩)

右研勻淨器收以鐵槽水調一錢掃塗立差

聖惠小兒因汗爲風邪熱毒所傷與血氣相搏熱氣蒸發於外其肉赤而壯熱也

又小兒身上有赤引於頰上或口旁眼下赤如燕脂向上皮即皺剝漸漸引多此是心熱血凝所爲其治法宜以小刀子鋒頭鎌破令血出後宜服丹參散

丹參 黃芩 枳殼(麸炒[illegible])

葛根 犀角(屑各[illegible]) 麻黃(去根節[illegible])

右爲末每一錢水一小盞入竹葉十片竹茹半錢
煎五分去滓放溫量兒加減無時服
治小兒身上有赤煩熱麥門冬散
麥門冬去心　蘆根剉　葛根剉
犀角屑　漏蘆　甘草炙微赤各半兩
右爲末每服一錢水一盞竹葉十片去滓放溫量
兒加減無時服
治小兒身上有赤或發腫或如火丹煩渴渾身赤壯
熱鉛霜散
鉛霜研　菉豆粉各半兩　用芸薹菜自然汁調塗

又方　伏龍肝壹兩為末　亂頭髮貳兩燒灰研　水調塗赤處
又方　桃仁去皮研爛以面脂和塗　水煮黃蒿稠
濃汁入鹽少許溫服　細研白礬末生油調塗　杵
芭蕉根汁塗　杵水中苔水調塗　水調芒硝末塗
炒米粉令焦黑爲末津唾調塗　生蛇銜草擣爛
塗
蚰蜒丹　治蚰蜒丹匝腰則死傳萵苣爛塗或研萵苣
子塗之　戴氏家傳用扁竹上草繩經子燒灰同生
油調塗　廣利方杵馬齒莧傅之
土鬼丹　靈苑方治土鬼丹此病初發如湯泡頃刻則
大連發不已或至數處便能致困宜速治之方
赤足蜈蚣壹條炙　雞腸草　金蕎麥各壹分
銅綠壹錢　麝香少許
右爲末如患者用針穿破瘡用針眼上度藥在丹
內上面用醋麵膏子掩之如人有患不覺數日後
喫食不得即丸服下項藥
大黃　甘草各壹分
右爲末每服水下半錢或一錢立差
治土鬼丹發熱汗入瘡大効
烏梅肉　糯米　杏仁去皮尖研

礬花各壹兩　鹽豉半壹兩　巴豆貳拾粒去心皮油膜研
右爲末糊丸先挑破瘡即以醋磨藥塗更以醋麵
蓋之服一二丸亦佳
王師禁土鬼丹及蚰蜒丹
齊衛小兒病
一氣念二十一遍吹在病處自立東南方上令病
人在西北以大指掐中指本節文以第二指掐大
指中節兩手皆然吹時即放手持呪四十九日於
五更初向北叉持可用
骨火丹　其瘡見骨者是踝者是也千金治大小蒜厚

封之 一嬰孺方刺臍上入二分以牛膽汁調大黄末
塗之
顱顖經二十二種丹證治
竈額丹 先從頭上起滿身亂見丹赤色 用豬槽下
土并桃柳根皮搗末生油調傅 竈尾丹 從腰起黑
色遍身疼痛 用堂屋四角草燒灰入白礬末雞子
白抑塗 竈火丹 先從臍起至心亂黄赤色 用屋
脊上草燒灰松花白雞子黄豬槽內水調塗 [illegible]
丹 從右手上起引似蛇行赤色 用竈下土油調塗
母竈丹 從左脚上起 用焊豬湯竈額上灰傅

陰竈丹 從陰上起紫赤色 用女兒小便生梅竈右
邊神縫上土和調塗 朱黄丹 從右脚起亂至遍身
用屋四角草鐵匠家磨刀水調傅 星子丹 從頭
起亂遍身如錢子大赤色 用桃樹向北枝燒灰油
調傅 蜂子丹 從頭向四向亂 用竈頭上土入膩
粉以雞子白調傅 亂神丹 大下惡證從肚內起出
口內紫黑色 用菩火草白礬末并蜜入洗銀水調
服之 佳火丹 從背上起黄赤色 用壁上土豬槽
下土白礬末生薑汁生油調塗 無子丹 從眼眶上
起 用白礬蛤粉柳根汁入和塗之 火焰丹 從

前心起頭如火燒 用菩火草豬槽下土雞子黄
調塗 朱砂丹 滿身病 用白礬皂莢燒灰豬槽下
泥和塗之 佛面丹 從耳起 用乳香菩火草死雷
內土油調傅之 河伯丹 從頭背起 用牸牛骨燒
灰羊脂調塗 雷火丹 從背甲起 用生麻油合豬
槽下泥塗之人氣氏云丹發於背脊及穀道者名標
火丹嬰孺方名火丹用景天草[illegible]真珠一分杵
為末丹上 鬼竈丹 從臍中起 用屋漏水調
竈中土塗 胡吹竈丹 從陰上起 用水茄窠下泥
和苦酒塗之 土竈丹 從踝起 用屋四角茅草竈

橫麻燒灰雞子白調塗 野竈丹 從背起 用柔香
頭蒴藋赤小豆末塗之立差 神竈丹 從肚起 用
土蜂窠杏仁膩粉牛油調塗
本事方十種丹瘤腫毒所起證治
一飛竈丹從頂頭起先腫用葱白研取自然汁塗
二古竈丹從頭上紅腫痛用赤小豆末雞子清調塗
湯氏方[illegible]何處皆治
三鬼火丹從面起赤腫用竈心土雞子清調塗 按不拘何
處皆治妙
四天火丹從背起赤點用桑白皮末羊脂調塗

五天竈丹從兩髀赤腫黃色柳葉燒灰水調塗作瘡
六水丹從兩脇虛腫用生鐵屑研末豬糞調塗
七胡火丹從臍上起黃腫用檳榔爲末米醋調塗
八野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗
九烟火丹從兩脚有赤白點用猪槽下土麻油調塗
十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗
右此十種丹毒變易非輕治之或緩則致不救故
予不惜是方能述一一仔細辨認依此方法治之萬
不失一如經三日不治攻入臟腑則終不救不可
緩也

赤白遊腫 聖惠云夫小兒有肌肉虛者爲風毒熱氣
所乘熱毒搏於血氣則皮膚赤而腫起其風隨氣行
遊不定故名也又云夫遊腫之狀者爲青黃赤白無
復定色遊走於皮膚之間肉上微光是也
治小兒赤遊皮膚作片片赤腫此是風熱所致宜服
犀角散
犀角屑 黃芩 黃芪
川升麻 梔子仁 漢防己
川朴硝各壹兩 牛黃半分研
右爲末煎竹葉湯調下一錢無時量兒加減

治小兒斑面身體赤遊腫起作片宜用升麻膏方
川升麻壹兩 犀角屑 射干
赤芍藥 玄參 黃芩
梔子仁 川大黃 大青
藍子 羚羊角屑各 生地黃貳兩
右剉以豬脂一斤半於鐺中慢火熬不住手攪藥
色變膏成去滓瓷合盛頻摩腫處
又方
黃蘗末 川大黃末 川朴硝各半兩
馬勃 水銀各壹分入少許唾於手心研令星盡

雞子壹箇去殼
右同研成膏先以鈹鍼鈹破然後以膏塗之
又方
雞冠花 商陸 紫鉚
川大黃各半兩
右爲末以雞清入生油等分調塗乾再塗
又方
附子去皮臍半兩 川椒去目 石鹽各參分
右爲末以煉了豬脂四兩相和以慢火熬成膏
盛候令頻頻塗以差爲度

治遊腫攻頭面燃腫赤熱疼痛宜用鬱金散
鬱金半兩　赤小豆壹合　甜葶藶半兩
伏龍肝貳兩　川芒硝半兩　川大黃生半兩
右為末以生雞子白并蜜少許調令稀稠得所塗
之乾再塗
治遊腫赤者　川大黃末貳兩　護火草[illegible]　右相合
杵塗之乾易
治赤白遊腫　芙蓉子半合　鹽壹錢　米醋壹盞　右杵
如泥看大小塗紙上貼之如走即隨處貼之不三
兩上効

治青白赤遊腫手近微痛
川大黃生　蒲黃　伏龍肝各貳兩
右為細末水和如薄泥塗之乾再用
又方
川大黃生壹兩　豉壹合　紫檀壹兩
右為末醋和塗乾再用
又方紫檀香二兩為末水調塗
治遊腫流遍身赤色入腹即死以生豬肉傅上數數
換之其肉蟲鳥不食臭惡故也
治遊腫以生布一片攝油以火燃之持[illegible]

日遊日遊不知著脂火燎作頭呪七遍即差也
治白遊腫杵生羊脾塗之
又方括蔞根為末壹兩　伏龍肝細研半兩　醋調塗乾再用
子母秘錄治小兒赤遊行於體上下至心即死以芒
硝納湯中取濃汁拭汁上　杵菘菜傅之　取白
豆末水和塗乾再用
千金中與治赤遊腫若遍身入心腹即殺人用竈下
黃土為末油調塗勿令乾若已入腹及陰者以護
火草取汁一盞服之乾者即末之水調服
治赤白遊腫　蔟上白臭炙蠶治白遊赤死者治赤
遊並搗塗之
治赤遊腫搗瓜蔞傅之
本草云赤遊白癧醋磨五毒草傅亦杵莖傅之恐毒
入腹亦煮服之五毒草一名五蕺又名地圍平地生花葉如蕎麥根似狗脊
入服杵馬齒莧汁飲之以滓傅之　又用生麻油
塗之　又濃煮大豆汁塗之
嬰孺方主丹入腹及下至卵者不治方
麻黃炒　升麻各叁分　硝石肆分
右為末以井花水服方寸匕日三服　一方加大
黃半分

劉氏家傳治丹從四肢走入心腹則不救方
生槐葉（壹握） 生瓜蔞（去皮同搗） 赤白豆末（各叁分）
右和塗患處其効如神
丹瘤 擣竹葉汁及一升作一服只一二服効
丹痒 擣韭菜入些些鹽與香油以手摩熱於丹上揩之立愈
傳丹雜方 治一切丹瘤以上硝爲末蘿蔔汁醋調塗日三四上（土蜂窠 蟬蛻各十枚燒灰） 蓖麻子五箇去殼細研入白麵一錢水調微微塗之甚妙 冷水杵芙蓉葉並雞翎掃腫便消 研護火草汁塗 研五葉草汁塗

水調大黃末塗 水研梔子仁塗 水調黃芩末塗 水研蒴藋汁塗 臘脂調屋塵塗 油調樺皮末塗 唾調粟米粉塗 水研糯米汁塗 水煮白礬末塗 醋調紅藍花塗 煮白芷根葉塗 杵鯉魚令爛塗 蜜和乾薑末塗 水調地龍糞塗 杵大麻子汁塗 燒粉家洗瓮水塗 水調韭畦中土塗 雞清調榆根白皮塗 不犯水羊脂炙塗以白粉傳之 研胡荽汁塗 醋磨訶子塗 杵鬼目汁塗 杵荏子汁塗 研醬取汁塗 研地黃汁塗 研豆葉汁塗 研海藻汁塗 油調豉末塗 水調青黛塗 水研地龍塗 水煮粟米塗 酒煮石楠塗 水調雞糞塗 杵梧桐皮塗 苦 汁塗（并服） 擣蒜塗（治五色丹尤妙）
千金方言凡方中用雞子者皆取先破者用之它皆無力 又言凡天下極冷無過藻菜但有患熱腫毒丹等取渠中藻菜細切熟擣傅丹上厚三分乾即易之予謂不可以此塗若毒在表猶可措手若抑之則外不得泄勢必入裡必先服托裹藥方可施此
辨小兒欲發丹毒候 初生小兒蓄伏胎熱欲發丹者必先見於外但人不之察耳小兒在襁褓中無故啼

生厚眵者此丹毒欲發之候也更微喘急者毒氣已甚而上乘於肺也纔覺有此證急以水調龍腦飲子或藍根犀角等藥潛消其毒如渾身已有赤處即更以芸薹等外挫其鋒消息而次第治之予家凡兩兒初生眼有厚眵後但發丹何宰宜人外孫女生七日眼生眵已而小腹下有赤丹一點如錢漸漸引開上至腹心而死不可不知也 初虞世謂百日內發必死不治然亦有可治者不可不治也
禁忌 大凡小兒病諸丹腫其勢雖盛切不可遽用大黃芒硝輩決轉大下之恐毒氣乘虛入裏以客爲主

即難施功也但用性寒解毒化裏藥常調停藏府微微通利而已此則護元氣而排外邪庶保十全也比舍陶氏子半歲病丹醫以青金丹下之大過毒入裏發喘生驚而死蓋嬰孺肌膚柔弱易虛易實而服藥復不能多治之固不可怠慢然亦不可躁急全在精專調護以保無虞世俗多不知此故廣記而備言之

小兒丹發若預度其勢必展引至咽頸腹心陰尻諸虛處可先塗藥以護之仍砭砂其引頭所向微出惡血以泄其毒或謂當以鍼子刮去惡血令盡直至清黃水出即止此必勢危氣壯而血熱者始宜之

大抵此疾人受之有輕重年長氣實乃能禁當若未滿月兒而感之又重恐不可槩用此法無爲王薄張康道子二歲得火燄丹會醫爲砂之出惡血盞餘兩日而殂不可不知也　本草云大人小兒丹毒宜食鯽魚鱠及蛇蛇即水母俗名海蜇者是也然不可以常食而恣食之反能爲害鯽魚亦魚類得無不宜

禁法　無爲南汰寺僧宋澄師傳西川文法禁火焰丹用松明五條細如筯以火點著一頭右手執之大指掐定第二指中節紋左手亦如此掐定面北立靜想北方壬癸水渺渺無際一口吸盡吹在火上再想海吹如是三次將火向自己口中試如不燒人即以火明火於小兒丹上周回焠一遭兼於丹上十字焠過即已如試得燒人疼更想吸水正且及端午日受持

疔瘡　薛諸瘡惟疔毒爲甚殺人亦速古云疔有十二種種各不同內三十六疔滿其數即不可救亦有不滿其數而死者乃毒氣走散故也若瘟毒染人發於頭面或遍身者又非此類在小兒多因乳母食有毒之物或兒卒中飲食之毒或感四時不正之氣皆能致之其瘡多生頭面四肢形色不一或如小瘡或如水泡或痛或癢或麻木不仁外證寒熱嘔吐惡心肢

體拘急大要當分邪之在表在裡急用隔蒜灸法并解毒之劑若不省人事牙關緊閉急以奪命丹爲末熱酒調灌如食生冷之物或用涼水淋洗則輕者難愈重者不治其生於兩足者多有紅絲至臍生於兩手者多有紅絲至心生於唇口之內者多有紅絲入喉急用針挑出惡血以泄其毒可保無虞其在偏僻之處藥難導達者惟灸法有回生之功若投峻厲之劑是促其危矣小兒肌肉柔脆且不能言痛否灸法須將蒜切薄片著肉一面略剜少空灼艾燃蒜先置大人臂上試其冷熱得宜然後移著瘡上又別灼艾

如前法試之以待相易勿令間歇

飛龍奪命丹　治瘡毒發背腦疽等證

眞蟾酥（乾者酒化）　輕粉　枯白礬

寒水石　銅綠　乳香

沒藥　麝香　朱砂（各陸錢）

蝸牛（肆拾箇另研無亦可）

右各爲末入蟾酥蝸牛或加酒少許糊丸菉豆大每服一二丸溫酒或葱湯下重者外用隔蒜灸法

時毒附　小兒時毒因感四時不正之氣致鼻面耳項或咽喉赤腫寒熱頭痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞狀如傷寒五七日間亦能殺人脉浮數者邪在表脉沉滌者邪在裏在表用葛根牛蒡子湯在裏用梔子仁湯表裏俱病者犀角升麻湯甚則宜砭及用通氣散宣泄其毒旬日自消若不消而欲作膿者用托裏消毒散欲收斂者用托裏散若咽腫不能言頭腫不能食者必死

通氣散　治時毒焮痛咽喉不利取嚔以泄其毒

玄胡索　猪牙皂炭　川芎（各壹錢）

藜蘆（伍分）　羊躑躅花（貳分）

右爲細末用紙撚蘸少許紙[illegible]內取嚏[illegible]

犀角升麻湯　治風熱[illegible]頰車連牙腫痛

犀角（鎊貳錢）　升麻　防風

羌活　川芎　白芷（各伍分）

黃芩　甘草[illegible]　白附子（肆分）

右每服三五錢水煎

梔子仁湯　治時毒腫痛大便秘結

鬱金　枳殼[illegible]　升麻

山梔仁　牛蒡子[illegible]　大黃（各等分）

右爲細末每服二三錢蜜水調服

葛根牛蒡子湯　治時毒腫痛消毒解熱

葛根　管仲　甘草

江西豆豉　牛蒡子（半生半炒研碎各等分）

右每服三五錢水煎

流注附　小兒流注乃氣流而滯血注而凝元氣不足之證也或因閃跌所傷或因肝火氣逆或因六淫內侵或因脾虛食積或因稟賦所致結於四肢節骱患於胸腹腰臀或結塊或漫腫或作痛悉用葱熨之法須問元氣爲主因跌者和血定痛丸肝火者九味蘆薈丸食積者[illegible]兒丸藥能對證未成自消已成自潰[illegible]先補而針之[illegible]毒

氣不致內攻氣血不致脫陷若膿出而反痛者氣血
虛也用八珍湯作嘔少食者胃氣虛也用四君子湯
欲嘔不食或腹作脹者脾氣虛也用六君子湯口噤
搐搦者氣血虛極而變症也十全大補湯內熱晡熱
陰血虛也四物參芪白朮表熱惡寒陽氣虛也十全
大補湯熱來復去或晝見夜伏晝伏夜發者虛熱也
當大補元氣若色赤腫起而膿稠者尚可治不赤硬
而膿清或脉洪大寒熱發渴及不受補者皆不可治

建理滲濕飲　治瘡瘍初起焮腫作痛或濕毒下注
或環跳穴痛

人參　白朮　蒼朮
防已酒拌　黃蘗炒　川芎
陳皮　當歸　茯苓各伍分
木瓜不犯鐵器　柴胡梢　甘草各叁分

右剉水煎服如三五劑不退加桂少許酒煎亦可
小便澀加牛膝身痛加羌活

和血定痛丸一名黑丸子　治流注膝風或閃跌瘀血肢
節腫痛服之自消若潰而發熱與補藥兼服自效

百草霜伍兩　赤小豆半斤　川烏炮壹兩伍錢
白歛捌兩　白及　南星炮各貳兩
沒藥　當歸　牛膝各伍兩
骨碎補肆兩

右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸白湯下

神效葱熨法　治流注結核骨痛鶴膝等證先用隔
蒜灸若餘腫尚存用此熨之以助氣行血散其壅
滯功效甚速又治跌撲損傷止痛散血消腫之良
法也其法用葱細切搗爛炒熱頻熨患處冷則易
之如鶴膝風兼服大防風湯而愈

隔蒜灸法　治流注及癰疽鶴膝風等證每日灸二三
十壯痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而
散蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之法有回生之
功其法用大蒜去皮切三文錢厚安患處用艾壯
於蒜上灸之三壯換蒜復灸未成即消已成者亦
殺其毒如瘡大用蒜杵爛攤患處將艾鋪上燒之
蒜敗再易如不痛或作膿或不起發及瘡屬陰證
者尤當多灸凡瘡不痛不作膿不起發者皆氣血
虛也多主不治惟患在頭面者不宜多灸論中嬰
兒灸法見疔瘡

如聖餅　治流注及一切瘡瘍不能消散或潰而不
歛

乳香　沒藥　木香
血竭　當歸各等分　麝香減半
右為末用酒糊和餅二箇乘熱熨之毒瘡加蟾酥
當歸補血湯　治流注及潰瘍肌熱面赤煩渴脉洪
大而虛重按全無此血虛證也誤服白虎湯必死
方見虛熱
益氣養榮湯　治流注氣血虛弱不能消散或四肢
頭項患腫不問堅軟赤白或痛或不痛日晡發熱
或潰而不斂　方見後
十全大補湯　治諸瘡血氣虛弱不能消散潰腐收
斂或寒熱汗出口眼歪斜肌瘦少食或日晡發熱
自汗盜汗或朝寒暮熱瘡口不斂等證　方見自汗
天蛇毒　餘手指頭生瘡俗名天蛇毒然五指各有經
絡拇指屬手太陰肺經食指屬手陽明大腸經中指
屬手厥陰心包絡經無名指屬手少陽三焦經小指
屬手少陰心經亦有患於足者足趺屬肝膽胃三經
大指屬肝脾二經次指屬膽經小指屬膀胱經各當
隨經而治其致患之由或因胃中積熱所發或因乳
母膏粱厚味所致或因濕熱下流或因風毒外中大
率多由所稟足三陰之經虛故邪得以入之也其初

患腫痛者先用仙方活命飲次用托裏消毒散元氣
下陷重墜作痛久而不潰者用補中益氣湯若服敗
毒散及敷寒涼之劑則瘡口變黑或努肉突出或指
皆黑大抵手足為氣血難到之處手屬於胃足屬於
脾不可損其真氣丹溪以為指僻尚有氣血罕到
況肢末乎故寒涼尅伐之不戒者也
天泡瘡　天泡瘡狀如水泡屬肺胃二經風熱若發
熱焮痛邪在表也用人參敗毒散發熱咳嗽邪在肺
也用加味瀉白散熱渴便秘邪在內也用加味清涼
飲此肌膚之證當去毒水以金黃散或黃蘗蚯蚓敷
之當歸膏亦善既安不必服藥若因攻伐過度元氣
虛而變生別證者當參各門治之
柴芍參苓散　治肝膽經分患天泡等瘡或熱毒瘰
癧之類
柴胡　芍藥　人參　白朮
茯苓　陳皮　當歸各伍分　牡丹皮
山梔炒　甘草各叁分
右每服二錢水煎服
加味解毒飲　治天泡瘡發熱作痛
玄參　連翹　升麻　芍藥

當歸　羌活　生地黄　牛蒡子炒各三錢
茯苓　甘草各錢　金銀花　漏蘆各五錢
右每服一二錢水煎服或爲末蜜丸亦可
金黄散　治天泡瘡消毒止痛
滑石　甘草
右各另爲末和勻俟患處如泡挑去水傅之加黄檗尤好
楊梅瘡　薛楊梅瘡乃天行時毒亦有傳染而患之或稟賦所得者受證在肝故多起於下部治失其宜多致蝕傷眼目腐敗腎莖拳攣肢節初起之時上體多者先用荊防敗毒散下體多者先用龍膽瀉肝湯大便祕者用大連翹飲後用換肌消毒散若蝕傷眼目兼用九味蘆薈丸六味地黄丸肢節拳攣兼用蠲痺解毒湯若因脾胃虧損而不能愈者先用異功散後用換肌消毒散若用輕粉之藥多致敗證也　按楊梅瘡起於近代多婬夫御不潔之婦傳染而致者其有小兒得之乳抱傳染者輕得之父母遺體者重治法與大人同更當求之專科薛氏治法未可盡遵用也
換肌消毒散一名萆薢散　治楊梅瘡不拘初患日久並效
土茯苓　當歸　白芷
甘草　皂角刺　薏苡仁
白蘚皮　木瓜各等分不犯鐵器
右水煎食前并空心服
又方　治大人之劑如用前方未應或兒長大宜用此方
土茯苓伍錢　當歸　白芷
皂角刺炒　薏苡仁各壹錢　白蘚皮
木瓜不犯鐵器　木通　金銀花各柒分
甘草　連翹　防風各伍分
茯苓　芍藥炒各壹錢　黄芪炒貳錢
川芎　生地黄各捌分
右作二三劑水煎出幼者作一劑煎分兩三次服
王爛瘡　聖惠云夫小兒腑臟有熱熱熏皮膚外爲濕氣所乘則變生瘡其熱偏盛者其瘡發勢亦盛初生如粟子須臾王大汁潰爛如湯火所傷灼故名王爛瘡也
治小兒王爛瘡一身盡如麻子有膿汁乍痛乍痒或時壯熱
赤芍藥　甘草　白斂各叁分

黃芩　黃連去鬚　黃檗半兩各等分
右爲末蜜水調塗日三兩上差
治小兒王爛瘡及惡瘡
秫米　竹篠
右燒灰細研以田中禾下水調傅之立効
治小兒王爛瘡初患一日肉色變二日皰漿出或四
畔時赤漸長若皰漿匝身即不可治其狀如湯火
燒宜速用黃連散
黃連末　胡粉各壹兩
右研勻以生油調塗之

治小兒王爛瘡初起皰漿似火燒瘡宜用此方　又
桃仁湯浸去皮研細以面脂和塗　又以艾燒灰傅
乾即用生油塗　又十字街上土研傅之
又燒牛糞灰傅　又酒煎吳茱萸汁塗　又酥和赤
地末傅
浸淫瘡治小兒身體發瘡初出甚小後有膿汁浸淫
不已漸大名浸淫瘡若先從四肢起漸向頭面者難
治也
鯽魚壹尾長三寸者　豆豉壹合
右杵如膏塗之又燒馬鞭敷瘡

又方白礬燒灰　蚯蚓燒灰　露蜂房燒灰各等分
末油調塗　又方伏龍肝各等分　亂髮燒灰各等分爲末豬脂
和塗　又方取雞冠血塗　雞冠血和黃連末塗
煎鯽魚骨塗　生切鯽魚片和鹽擣貼患處　燒胡燕
窠水和塗之
紅絲瘡有一種紅絲瘡發於手足與瘡同多生於
兩手中指節上男左女右則尤甚其狀但一水泡
清瑩光瑩如小雞頭大其底下濈濈然數十小針孔
不痒不痛都無妨礙泡邊當有一絲脉如紅絲隱隱
在皮裏其行甚速循臂而上過肘則危至心即死有

此證者急以針迎頭挑斷或剜耳塞或嚼白梅封之
絲即不行紹興庚午無爲軍方梓字楚材與先子爲
同年秩滿代歸三日而死詢其所以云無疾但左手
中指生一小水泡耳蓋不知其爲紅絲瘡也　又衛
枚轄宜人云比鄰有女子忽中指節生一水泡色極
在濈其底盡細細針孔歷歷可數傍有紅絲一縷纍
家猶笑忽有老嫗來見驚曰此紅絲瘡也當害汝命
急就其泡上灼艾數十壯仍於絲上數處挑斷遂免
瘰癧巢氏云小兒遇風熱毒氣與血氣相搏結
成顆核生於頸項遇風寒所折不消結成瘰癧久而

潰膿成瘡也湯氏用白服消毒飲子及升麻湯等千金連翹丸龍膽湯皆可服　曾深謂一證先賢名曰九漏究其所因似無稽考形狀非一不過隨象命名大槩初發於頸項肌肉之間未成膿者從本引末可使衰其針之炙之傳之從其所因而施療然小兒幼弱者不可針灸但以服餌塗點之劑爲治此症多生於耳後及頸項兩旁初發止是一枚久必連生大小十數纍纍繞項下累累如貫珠遂間先腫作膿穿破輕者可愈重者難除先宄漸膿長歲不乾謂之漏項原其得病之初自是三陽感受風熱與血氣相搏而成治

以百解散加當歸散木香葱燈心煎服次用玄參飲及牛蒡湯木通散內消丸與之宣熱化毒洗以櫟皮散塗用白及散二香散使氣血行膿乾汁盡則自愈矣仍忌腥毒野味其證不致再作

頸項瘰癧者乃屬肝膽二經鬱火氣滯所致蓋肝膽經行人身之側若因肝火動而受患故發於肝膽二經部分當審其因而藥之或因乳母恚怒或血虛內熱者當審其所因而調其母不可用峻厲之藥恐傷元氣也　一小兒落草頸間有瘰五枚審其母素多怒時常寒熱或乳間作痛或脇肋微腫悉屬肝膽

經之症先用小柴胡湯加山梔牡丹皮熱退又用加味逍遙散母服兩月餘其兒亦愈　一小兒因乳母肝經有熱耳前後患之用加味逍遙散治其母其兒自愈　一小兒頸間耳下各結核一歲又服消毒之劑患處益甚元氣益虛診乳母素懷鬱怒致肝脾血虛而有熱用加味歸脾湯爲主佐以加味逍遙散母熱漸退加與兒日各數匙兩月餘而愈　一小兒自落草時頸間患有四枚至五歲耳前後如貫珠元氣虛甚寒熱往來飲乳不徹此稟肝膽經氣滯之證用八珍逍遙二散與壯年婦人服之兒飲其乳半載少愈

兒體漸充其核漸消又服地黃丸逍遙散而全愈

一小兒生下頸間瘰癧三枚將期數欒延及耳謂此稟肝膽二經所致診其母肝膽脈尚洪數乃謂其母子一體治其母兒自愈不信另用必效散一服吐瀉止一夕而歿

頸側瘰癧乃手足少陽兒厥陰二經風熱之證或肝經血燥所致其證發於項腋或耳前後或如貫珠當分表裏虛實若焮赤腫痛者肝經熱毒也用人參敗毒散作痛寒熱者肝火內作也用加味小柴胡湯不痛而小便黃肝血虛也用六味地黃丸隱於肉裏而色

不變者肝疳内作也用九味蘆薈丸膿成而不潰或
潰而不斂者脾氣虛弱也用益氣養榮湯凡此腫核
疼痛寒熱作渴者屬病氣有餘形氣不足治宜清肝
火生肝血腫硬不潰潰而不斂者屬病氣形氣俱虛
治宜補腎水實脾土若因乳母恚怒肝火遺患者又
當隨所因而治之　一小兒腋下瘰癧其核未消發
熱憎寒此肝經氣血虛而有熱也用補陰八珍湯為
主間以清肝益榮湯而愈後復結核小便赤澀晡熱
作渴用參朮柴苓湯為主佐以六味地黃丸料加柴
胡山梔及四味肥兒丸而斂　一小兒十五歲患此
發熱作渴日晡頰赤脈數無力屬陰虛而有熱用補
陰八珍湯五十劑加參芪又二十劑而潰但膿水清
稀肌肉不生此脾氣虛弱也以參芪歸朮為主佐以
芎藭熟地黃麥門五味氣血乃復遂進必效散一服
毒下而痊　一小兒患此服尅治之藥致寒熱腹膨
此肝脾疳證先用五味異功散加柴胡升麻佐以九
味蘆薈丸漸退又用四味肥兒丸五味異功散而消
一小兒九歲患此面色常青腫硬不潰肉色不變
乃伐肝化痰余曰當調補肝脾不信果虛證蜂起復
請治仍欲伐肝余曰面帶青色肝虛而本色見也面

色痿白脾虛而本色見也痰涎上湧脾虛而不能攝
也兩目連劄肝血虛而生風也經云胃為五臟之本
當先救胃氣遂用五味異功散加升麻柴胡元氣稍
復乃朝用補中益氣湯夕用五味異功散佐以九味
蘆薈丸面色始黃而核漸消又以四味肥兒丸間服
地黃丸而愈

百解散 [illegible]

當歸散 [illegible]　牛蒡湯 [illegible]

大聖散　治瘰癧消風毒腫一切内熱多生瘾疹風
丹風痰食煎煿多致此疾

羌活　荊芥　升麻
薄荷　防風　甘草
大黃　黃芩　玄參各等分

或加赤芍藥連翹

右為末每二錢水一盞煎六分溫服又方用牡蠣
一兩火鍛為末玄參一兩甘草半兩為末每服二錢茶清
調下

玄參飲　治瘰癧及頭上生惡核腫痛

玄參　升麻各伍錢　川烏炮裂去皮臍
草烏炮裂去皮　當歸酒洗　川芎

赤芍　生乾地黄　赤芍藥各一錢
甘草參錢　大黄酒炒一錢
右剉每服二錢水一盞薑三片煎七分無時溫服

升麻湯

升麻　射干　連翹
犀角屑　大黄微炒　朴硝各半兩
右㕮咀水煎大小加減忌酒麪炙煿物

木通散

柴芍參苓散　治肝火血熱遍身搔痒或起赤暈或筋攣結核

柴胡　芍藥　人參　白朮
茯苓　陳皮　當歸各五分　牡丹皮
山梔炒　甘草炒各三分
右薑棗水煎服

清肝益榮湯　治肝膽經風熱血燥筋攣結核或作瘊子

柴胡　龍膽草酒拌炒各七分　當歸
川芎　芍藥各一錢　熟地黄自製　白朮炒
木瓜不犯鐵器　山梔炒　茯苓　薏苡仁各五分
甘草三分

右水煎服

加味小柴胡湯　治肝膽經風熱耳前後腫痛或結核焮痛或寒熱晡熱口苦耳聾等症

柴胡一錢　黄芩炒一錢　人參
半夏各七分　甘草炙五分　山梔
牡丹皮各五分
右薑水煎徐徐服　[illegible]牡丹皮

益氣養榮湯　治氣血虛弱四肢頸項等處患腫不問腫潰日久不斂俱宜服之

人參　茯苓　陳皮

貝母　香附炒　當歸酒洗
川芎　黄芪炒　熟地黄自製
芍藥炒各一錢　甘草炙　桔梗各五分
白朮炒　柴胡各六分
右每服三五錢薑水煎

瘰癧

必効散　治瘰癧元氣無虧者宜用此方若元氣怯弱者宜先補而後服之癧毒已下便與滋補庶無他患若孕婦及血勞氣鬱所致者尤不可服世以此方為良劑故併誌之

硼砂一錢五分　輕粉一錢　麝香五分

巴豆（去皮心膜）　白檳榔（各等分）　斑蝥（去頭足翅同糯米炒去米）
右為末取雞子一箇去黃用清調藥入殼內以濕紙數重糊口飯上蒸熟取出曬乾研細每服五分用炒生薑酒五更調服如毒出小便澀痛用益元散一服其毒出而不痛
治貼惡核方
赤小豆　猪牙皂莢　硝石
黃藥　木鼈子（各等分）
右末雞子清調塗患處

貼散瘰癧神効方
白膠香　降真香（用心無土氣者）　海螵蛸
右等分為末摻患處外以水紙掩之一夜而退
與化李八哥傳貼瘰癧以藥末破者即消已破者即出惡物收斂神驗良方
輕粉　麝香　珍珠
血竭　沒藥　乳香
黃蠟（貳拾兩）　銅青（各等分）　松香（捌錢）
杏仁（貳拾枚去皮尖）　蓖麻子（去殼拾伍枚）
以上十一味各研為末以磁杵缽搗成泥膏不犯鐵器不見火將膏搭在紙上以手撲開貼之
治瘰癧破潰不斂者方
用燒人場上紅黃土研細洗淨患處摻之神効
治驚風結核
驚風結核屬肝膽二經風木相火用事木旺生風熱同化其病抽搐搐動此乃風熱血燥而然耳蓋風動則肝火盛火盛則肝血內消而不能養筋故筋攣結核如貫珠然頸項兩側正屬肝膽經部分治宜滋腎水清肝火養陰血壯脾土蓋腎水旺則肝火自清肝火清則陰血自生陰血生則相火自寧火既寧則無熱傷元氣火乘土位之疾矣　一小兒甫周歲項間結核兩臂反張索敗毒之藥余意此屬肝經血燥詢之果前患驚風曾服朱砂等藥遂與六味地黃丸滋其肝血數服而愈　一小兒項側結核痰盛發搐服金石香燥之劑手足筋攣此肝血復傷即急驚也遂用加味小柴胡湯加鉤藤鉤山梔芎歸六味丸料加五味麥門而痊　一小兒每受驚項間結核發熱減食睡間四肢微搐此肝木侮脾土也用五味異功散加柴胡升麻鉤藤鉤隨愈畢姻後腿臂腕間結核誤服行氣破血藥腿臂筋攣肌肉消瘦如瘵證余考前劑乃用地黃丸生肝腎之血佐以補中益氣湯補

肝膽之氣而愈　一小兒耳前後結核遇發熱痰盛
咬牙抽搐搖頭後服香燥之藥以致慢驚而卒

皂角子丸　治肝膽經風熱項脇兩側結核

皂角子（用百粒）　連翹（六錢）　當歸
柴胡　羌活（炒）　山梔（炒）
川芎（各壹兩）　桔梗（炒）　龍膽草（酒拌炒黑）
甘草（炒各伍錢）

右為末米糊丸菉豆大每兒大小加減滾湯下

人參敗毒散　治小兒風熱瘰癧頸核毒瘡或解驗
表裳風邪所得惡風發熱胸膈生痰頭目不清（方見）
後

九味柴胡湯　治肝經熱毒下注患便毒腫痛或小
腹脇間結核凡肝膽經部分一切瘡瘍或風毒惡
核瘰癧

柴胡（炒）　黃芩（炒各伍分）　人參　山梔（炒）　半夏
龍膽草（炒）　當歸　芍藥（炒各八分）　甘草（貳分）

右水煎服若肺漏赤色元氣無虧者宜用消後腫
消痛止者不宜用大凡肺硬不消消後不愈者因
元氣虛也午前宜用四君歸芪升麻午後宜用四
君芎歸柴胡為主佐以九味蘆薈丸若飲食少思

者宜用五味異功散專補胃氣若膿水清稀而見
一切諸證皆因血氣內虧但當補脾胃飲食加進
血氣化生諸證自退設治瘡邪是虛其虛也禍不
旋踵矣

琥珀膏　治瘰癧不消或潰而不愈變成漏證

琥珀　木通　桂心　當歸
白芷　防風　松香　硃砂
丁香　木香　木鼈子（去殼各壹兩）

右先用琥珀丁香桂心硃砂木香為末其餘㕮咀
以麻油二斤六兩慢火煎至白芷焦黑濾去粗餘
下黃丹一斤以柳枝不住手攪令黑色滴水撚軟
硬得中却入琥珀等末攪勻於磁器盛之用時取
少許攤貼

益脾清肝散　治肝火傷脾飲食少思發熱或寒熱
往來瘰癧不能消散（方見後）

補陰八珍湯　治元氣虛弱不能潰斂或內熱晡熱
肌體消瘦用八珍湯加酒炒黑黃蘗知母

[illegible]湖小兒經絡積熱頭面及身帶生瘡四君子加
各渡根桔梗各半錢煎服　陽小兒惡瘡入氣溫和
頻頻與洗更衣名門外宜亦不宜服藥小兒不得即

而服藥此乃下治若將養合宜何疾可使更令乳哺
有節勿令過飽其身乃如藥樹此養生之理也
湯惡瘡方頻浴身安外宜無病
春用柳條荊芥　夏用棗葉槐枝　秋冬用苦
參　俱煎湯洗浴
加味羌活散　治小兒四□將肌膚發爲癮疹瘙
寒發熱身痒
羌活　前胡各壹錢　人參
桔梗　茯苓　甘草炙
川芎　枳殼麩炒　天麻各半兩

蟬蛻去鬚　薄荷各貳錢
右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至六分不
拘時服
當歸飲子　治小兒心血凝滯內蘊風熱發見皮膚
遍身瘡疥或腫或痒或膿水浸淫
當歸去蘆　赤芍藥　川芎
生地黃　蒺藜炒去刺　荊芥穗
防風去蘆各壹兩　何首烏　黃耆去蘆
甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞生薑三片煎至六分服無時

胎毒瘡疥因稟胎熱或娠婦飲食之毒七情之火初
如乾癬後則膿水淋漓或結靨成片如發于兩耳眉
或耳前後髮際之間屬手少陽經若發于四肢屬脾
胃經發於兩脇屬肝經發于額屬心經發于腦屬膀
胱經發于頦頰屬腎經當隨各經所主五臟勝負及
乳母食啖厚味鬱怒所傳致而調治之不可輒用化
毒犀角等丸設□□復□□剝變他證尤爲難療　一
小兒遍身患之服牛黃解毒丸皆愈惟頭結痂作痒
出水此稟腎經虛熱用地黃丸解毒散而愈　一小
兒患於髮際之間作痒詢其母有肝火用加味逍遙

散加漏蘆用牛黃解毒丸解毒散而愈名解毒散一名托毒散
一小兒患於左耳髮際漸延上頭作痒此稟肝膽二
經熱毒用柴胡梔子散母子並服而愈後不戒膏粱
復發膿水淋漓右腮亦患此胃經有熱先用清胃散
次以柴胡清肝散治肝火母子俱服又用立效散牛
黃解毒丸而愈　一小兒兩脇患之延及遍身四肢
爲患膿水淋漓寒熱往來屬肝脾積熱用清胃散小
柴胡湯立效散而愈後脇間復患兩目連劄小便白
濁用四味肥兒丸九味蘆薈丸而愈　一小兒因乳
母不戒七情厚味患此久不愈母服加味逍遙二散

子用牛黃解毒丸愈後兒食甘味耳內生瘡痒痛目
劄用四味肥兒丸爲主佐以加味逍遙散消胃散而
愈　一小兒遍身患之口渴飲冷其子用四味肥兒丸
立効散母用柴胡梔子散而愈

牛黃解毒丸　治胎毒瘡癤及一切瘡瘍

牛黃參錢　甘草　金銀花壹兩

草紫河車貳錢

右爲末煉蜜丸量兒服

立効散　治髮瘡耳瘡及一切瘡疥

定粉末　松香末　黃檗末

黃連末　枯礬末各壹兩

右各另爲末用清油燭油調搽

敷藥解毒散　治一切毒瘡風疹痒痛

大黃　黃檗　山梔

寒水石各等分

右爲末水調搽若破而膿水淋漓用當歸膏或清
燭油調尤善

柴胡梔子散方見發熱　四味肥兒丸方見
九味蘆薈丸方見　金黃散方見天疱瘡

熱毒瘡疥因乳母肝膽[illegible]積熱或恣食

膏粱厚味或七情內火所致當分臟腑所屬之因察
之虛實調其血氣平其所勝如肝經實熱用柴胡清
肝散虛熱用六味地黃丸心經實熱用導赤散虛熱
用補心湯脾經實熱用瀉黃散虛熱用補中湯肺經
實熱用瀉白散虛熱用五味異功散腎經熱用六味
地黃丸大凡手足冷者屬虛寒手足熱者屬實熱脈
沉數有力作渴飲冷大便乾實此邪在裏宜內疏若
脈浮數有力作渴飲冷此邪在表宜發散若脈浮大
按之無力或作渴飲湯乳食少思此真氣虛而發熱
也調理脾胃其病自愈切不可用寒涼之劑復損真

氣嬰兒宜調治乳母爲主　一小兒脇間患此寒熱
[illegible]便頻數此稟肝火所致先用柴胡清肝散又
[illegible]逍遙散而愈後因乳母肝火動而復發用加
味逍遙散及八珎湯加牡丹皮山梔母子服之並愈
一小兒腹間患此發熱便血面黃少食或作嘔或
作瀉手足時冷右關脈弦數此脾土虛弱肝火爲患
先用五味異功散加升麻柴胡山梔益肝氣清肝火
後用地黃丸滋腎水生肝血而愈　一小兒腿內股
患此色赤不愈發熱面色或赤或青此稟腎陰不足
而木火熾盛先用柴胡梔子散以清肝火後用地黃

九以瀉肝湯治之 一小兒肝熱患此作瀉伏冷右
寸關脉數而無力此胃經積熱傳於肺經也先用瀉
黃瀉白二散漸愈後用五味異功散四味肥兒丸而
愈 一小兒嗜甘飲汁米先患吐瀉後遍身淋漓
此伏食之熱而傷脾血也先用清胃瀉黃二散而愈
但形氣怯弱用五味異功散而元氣復
若瘡疹因脾胃虛損身生津液不足火妄動或乳母
六淫七情飲食起居失宜致兒為患當分其因審其
經而主之如[illegible]或白驚[illegible]肝經之證也面
赤[illegible]熱或作渴[illegible]心經之證也面黃體瘦或作瀉

泄瀉脾經之證也面白咳嗽或鼻[illegible]肺金之證
也面黧體瘦或喜臥濕地腎經之證也要兒宜調治
乳母若不審五臟勝負形病虛實妄行攻毒多致不
救

傅瘡藥方

剪刀草　黃連　苦參

右等分為末先洗淨次用麻油輕粉調傅

[田]瘡癬治法凌汗瘡宜用苦狐散[illegible]
蹄根絞自然汁調[illegible]

苦狐散 治小兒[illegible]

苦參　蛇蛻[illegible]　蜂房[illegible]　梁上塵[illegible]

右為細末生油調塗擦患上貼

青金散 治小兒濕癬皮淫瘡

白膠香[illegible]　輕粉[illegible]　青黛[illegible]錢

右研為細末乾摻於上

秘錄治小兒頭瘡白禿[illegible]乳酒調化塗蕪荑酒塗

[田]小兒頭面爛瘡木耳作細末調傅又於水調平胃
散傅俱效則易之

斑疹論 夫斑疹之病俱肺於外者屬少陽相火也
謂之斑小紅靨隱於皮膚中者屬少陰君火也謂之
疹斑疹並出則小兒難禁然首尾俱不可下大抵安
裏解表多發表藥少小便秘則微疏之身溫者順身涼
者逆大忌外敷寒涼內用疏導無此二者可保無虞

葛根橘皮湯 治發斑煩悶嘔吐清汁兼治麻痘等證

葛根　陳皮　杏仁去皮尖　麻黃去節

知母炒　甘草炙　黃芩各一兩

右每服二三錢水煎服

玄參升麻湯 治斑疹已發未發或身如錦紋甚則
煩躁譫語喉閉腫痛

玄參　升麻　甘草

右每服二三錢水煎服

化斑湯

人參 石膏 知母 甘草各貳錢

右每服二錢水一盞入糯米半合煎六分米熟爲度去滓溫服

荊防敗毒散 即人參敗毒散加荊芥防風

人參敗毒散 治瘡瘍邪氣在表應發者若增寒壯熱項強脊疼或噁心咳嗽亦宜用之

人參 茯苓 川芎 羌活
獨活 前胡 柴胡 枳殼麩炒去
桔梗 甘草炒等分

右每服二三錢水煎

東垣人參安胃散 治斑疹因服峻厲之劑脾胃虛熱泄瀉嘔吐飲食少思等證

人參壹錢 黃芪炒貳錢 生甘草 炙甘草各伍分
白芍酒炒柒分 白茯苓肆分 陳皮叁分 黃連炒貳分

右爲末每服二錢水煎服

犀角消毒散 治斑疹丹毒發熱痛痒及瘡疹等症

牛蒡子 甘草 荊芥 防風各伍分
犀角鎊末 金銀花叁分

右水煎熟入犀角汁服

地龍散 治小兒風熱癮疹狀如傷寒耳尖及手足冷

地龍洗去土半兩 穿山甲[illegible] 硃砂研細

右前二味爲細末後入硃砂一處研和勻每服壹錢用紫草煎湯調下不拘時量兒大小加減

消毒飲[illegible] 清涼飲子見熱

治大人小兒癮疹入腹即殺人方

附蕪菁子末酒調服三錢小兒加減 又酒服牛蒡末二錢小兒減之 又以鹽湯洗了接蔘子傅

治風腫及癮疹

巴豆五十箇去皮以水三升煮取一升以綿浸湯中適寒溫以拭病上隨手差

治風疹入腹身體強腫舌乾燥硬

蔓荊子三兩爲末每用溫酒調壹錢

治風疹痒不止

酪伍合 鹽壹兩 二味相和煎過摩病處立差

又方蛇蛻皮一條水一升煎半升雞翎掃搯上即差

又方白礬五兩爲末以酒三合小便一升煎如稀膏以綿蘸藥於病上揩下揩之令熱徹入皮膚須臾

消毒此方神奇能治百端不差者

黃水粘瘡 辟小兒黃水粘瘡屬肝脾二經風熱積熱所致邪在表而痛痒者輕則犀角消毒散重則連翹防風湯邪在內而大便秘者輕則九味解毒散重則大連翹飲若頭目不清憎寒壯熱作渴便秘者表裏俱有邪也加味清涼飲若誤服尅伐之藥而致發熱惡寒者肺氣傷也用四君桔梗柴胡發熱嘔吐胃氣傷也用異功散發熱作瀉脾氣虛也用六君子湯並加柴胡升麻餘當隨證裁之

大連翹飲 治風毒熱毒發熱作痛二便不利表裏俱實 方見

胡梔子散 治肝膽風熱生瘡作痛發熱或瘡破膿水淋漓或發寒熱晡熱 方見

犀角消毒散 治熱毒積毒發于肌表而頭面生瘡或痛或痒者 方見痲疹

荊防敗毒散 治風熱相搏邪氣在表患瘡瘍之類寒熱作痛者 方見前

補中益氣湯 治瘡瘍之類過服敗毒之藥致中氣虛弱發熱或寒者 方見虛熱

六君子湯 治瘡瘍脾胃虛弱不能飲食更或嘔吐而瘡不愈者 方見[illegible]

九味解毒散 治熱毒胎毒而發瘡瘍之類未潰作痛者

黃連炒 芍藥 防風 甘草各叁分

金銀花 連翹各壹分 當歸[illegible]分 山梔肆分

白芷陸分 右作一劑水煎母子並服

加味清涼飲 治熱毒積毒在內患瘡瘍大便不通而欲痛作渴者

當歸 赤芍藥 甘草炙 大黃炒各叁分

山梔炒叁分 牛蒡子炒杵肆分 右水煎服

人參消風散 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急肢體煩疼肌肉顫動耳若蟬鳴鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙癢疹目澀昏困

人參 白殭蠶 茯苓 防風

芎藭 藿香 蟬蛻 厚朴薑製

羌活各叁錢 荊芥穗 炙甘草 陳皮各五

右每服一二錢水煎

連翹防風湯 治小兒肝脾風熱時毒頭面生瘡

連翹研碎 防風 黃連 陳皮

芍藥 當歸 獨活 白蒺藜炒去刺

荆芥　茯苓　甘草　黃芩

牛蒡子（炒研各等分）

右每服二錢水煎服

和肝補脾湯　治風熱瘡疹脾土不及肝木大過

人參　陳皮　川芎（各五分）　山梔（炒肆分）

白朮　茯苓　芍藥（各七分）　柴胡

甘草（炙各三分）　右分二劑水煎服

益脾清肝湯　治肝脾風熱發寒熱體痛脾胃虛弱

人參　白朮　茯苓　甘草　川芎

當歸　黃芪（各參分）　柴胡　牡丹皮（各貳分）

右水煎服

□□散　治風熱瘡熱生瘡水泛淫膿流處便濕爛

松香　五倍子　黃連　黃丹

海螵蛸（各壹錢）　輕粉　雄黃（各少許）

右為末用榮肌散煎洗滲之乾者油敷

立効散

定粉　松香　黃蘗　黃連

枯礬（各壹錢）

右為末用清燭油調搽

頭面瘡　頭者諸陽之氣會於首而聚於面其有患

瘡瘍者因臟腑不和氣血凝滯於經絡之□或稟

腎陰虛肝火或受母胎毒或乳母六淫七情或食膏

粱醇酒或兒食甘肥厚味所致其因不同當各辨其

經絡審其所因而治之若發於目眥耳前上額抵

鼻至目內眥者皆屬小腸經發於顴及頭角下頰耳

後膽左右者皆屬膽經發於頰前鼻孔及人中左右

者皆屬大腸經發於鼻之挾孔下唇口反承漿耳後

頷中耳前髮際頭顱者皆屬胃經發於目內眥上額

巔頂後腦項背者皆屬膀胱經既察其經即當分治若

肝火者用六味地黃丸（脊）胎毒者犀角消毒丸（見

食積者四味肥兒丸（乳）乳母膏粱者東垣清胃散

（脊）至於諸臟受病必兼諸臟故患於額間屬心經發

熱飲冷者為實熱用導赤散（心）發熱飲湯者屬虛熱

用養心湯左腮屬肝經或頸項动強者為實熱用柴

胡清肝散（熱）或咬牙頰悶者虛熱用六味地黃丸右

腮屬肺經喘嗽飲冷者為實熱瀉白散（肺）發熱咳嗽

者為火刑金用人參平肺散（肺）鼻間屬胃經發熱飲

冷大便黃硬者為實熱用瀉黃散（脾）發熱飲湯大便

青白者為虛熱用異功散患於頦及耳輪者屬膀胱

經腎經作用地黃丸若瘡已潰久而不愈則當

審其臟腑之相勝氣血之傳受而以調補脾胃爲主
若因乳母遺熱爲患者當先治其母則兒病自愈也

養心湯　治心氣不足虛熱上攻而患瘡瘍者

黃芪炒　白茯苓　半夏麴
當歸　川芎　辣桂
栢子仁　酸棗仁炒　五味子杵
人參各三錢　甘草炒各二錢

右每服三錢薑棗水煎爲末服亦可

牛黃解毒散　治胎毒頭面生瘡或延及遍身痒痛不安浸淫不愈及眉煉瘡

生甘草壹兩　牛黃伍錢　金銀花壹兩

右各爲末每服二三分乳汁調服或用甘草煎膏爲丸芡實大每服一丸白湯化服外傅青金散亦可

拔毒散　治證同前及疥癩瘡癬

黃芩　黃連　白礬三味俱生用
雄黃各伍錢　銅綠末錢研細加之　松香

右各另爲末乾掺患處或用油調搽疥瘡宜加枯礬叄錢

頭瘡　小兒頭瘡是六陽受毒熱而攻頭成瘡也若頭上散成片常常燥癢毛髮稀少有類白屑此因積熱上攻名曰白禿瘡蝕生於頭世人只知以藥外治愈不逾旬月其瘡又發何爲而然蓋頭者諸陽所會之處洪範五行火曰炎上熱毒上攻兩陽相灼故瘡生於頭法當解陳莖蟲之積熱導心經之煩躁斯可矣

世治久癩頭用黃連細末傅之　治年久癩頭瘡黃參丸食後服之外用一方木香傅之二月愈

又方用防風通聖散酒製爲末每服二錢爲末再用酒拌曬乾爲末每一錢水煎服日四五服至三十貼見効

又方

川芎　片芩酒　芍藥酒　陳皮各半兩
白朮酒　當歸酒洗各壹兩　天麻　蒼耳各七錢半
黃蘗酒　粉草　防風各三錢

右㕮咀煎服四五次服之服過睡片時

小兒癩頭用燒紅炭焠長流水令熱洗之仍用芫荽子煎豬脂去滓用脂傅患處　又法用胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲末油調傅

頭瘡方

豬油　雄黃　水銀各貳錢半

右研和勻傅效

又方治小兒癩頭并身癬等證用松皮燒灰白膠香枯礬大黄黄檗油調傅患處　又方用臘月馬脂油搽患處極效

簡頭瘡大笋殼燒灰傅瘡大小川灰調生油傅又加膩粉佳

秘錄小兒頭身諸瘡燒雞卵殼和豬脂傅之

世治癩頭

松香　黑龍尾（即屋塵）

黄丹　白芷　松樹皮（燒灰存性）

水銀　雄黄　白礬（各貳錢）

右爲末以血餘入香油煎爛調傅患處

[illegible]攻頭瘡方

用敗龜板酥炙爲末以飛麪少許和油調塗頂上留孔出毒不可調太乘

世治小兒面瘡通面爛無全膚膿水流漓百藥不效者陳年臘豬油不入鹽者傅之神效

濟眉煉者謂小兒兩眉間生瘡如疥癬當求其因而藥之蓋眉屬膽經若原禀肝膽經熱或乳母肝膽經有熱者用柴胡梔子散或乳母食厚味醇酒者用加味清胃散或乳母有鬱怒者用加味逍遥散俱與乳母服子亦飲少許仍參前證主之

回眉煉治法用青金散傅之如不愈燒小麥存性研細好油調塗

青金散　治小兒疥癬眉煉遍身瘙痒或膿水淋漓經年不愈

松香（貳兩）　真蛤粉　青黛

右爲末用麻油調搽或乾摻之或加輕粉枯礬各三錢尤治前證及頭面疥癬尤效

世治小兒耳後月蝕瘡蚯蚓糞燒以豬油和傅

胡粉雞清和傅　黄連末傅　竹葉燒末豬脂和傅

水銀膏　治月蝕瘡多在兩耳上及竅傍隨月虛盈

水銀（貳錢半）　胡粉　松脂

黄連　豬脂

右先熬豬脂令沸下松脂諸藥末及水銀攪令勻磁盒盛先以鹽湯洗淨瘡塗數日三五度

胡粉散　治月蝕瘡

胡粉（炒微黄）　白礬（煅）　黄丹（煅）

黄連（淨）　輕粉（各貳錢）　臙脂（壹錢）

麝香

右末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥如瘡乾麻油調敷

湯氏云耳有五般常出黃膿者爲停耳出紅膿者爲膿耳出白膿者爲纏耳耳痛者爲□耳耳內虛鳴出青膿者爲震耳雖五般病源一也皆由風水入耳而因有積熱上壅而成若不早治久則成聾宜臙脂膏治之仍服化痰退熱等劑即愈也

蔓荊子湯 治內熱耳出膿汁

升麻　木通　麥門冬　赤芍藥

生地黃　前胡　甘菊　甘草

桑白皮　赤茯苓　蔓荊子各等分

右用薑棗水煎食後服

清上散 治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡癤亦治胎熱眼睛腫赤糞色稠黃肚熱啼哭及身上紅腫

川鬱金　甘草　北桔梗　天花粉

乾葛　薄荷葉各等分

右爲末入蜜拌勻白湯下三五七分或一錢仍用艾葉煎濃湯溫浸足底以引其熱下行

當歸龍薈丸 治肝膽風熱耳中鳴出青膿名曰震耳大便秘小便澀并服宜通血氣調順陰陽

當歸　龍膽草　柴胡各壹　青黛

膽星　大黃　蘆薈各五　麝香伍分

梔子　酒黃芩　酒黃連　黃蘗各壹兩

木香貳錢伍分

右爲末煉蜜丸小豆大每服二十丸薑湯送下

清黃散 治耳出黃膿名曰聤耳內有風熱外爲水濕所干醞久而成

防風　滑石飛五錢　甘草炙五分　梔子酒炒叁錢

藿香　酒黃連各貳錢

右爲末白湯調一錢食後服

清心丹 治耳出紅膿名曰膿耳及舌上生瘡如楊梅狀者

黃連酒炒叁錢　滑石飛壹錢　甘草

辰砂飛各壹錢　薄荷葉分　犀角鎊屑貳錢

右爲末每服一錢五分燈心薄荷湯下夜再服

清白散 治肺熱痰火上攻耳出白膿名曰纏耳兼治咳嗽

桑白皮蜜炒　地骨皮各壹錢　甘草壹錢

貝母貳錢　寒水石煅貳錢　天花粉

酒芩 天門冬各壹錢半
右爲末以蜜水調食後服或白通草煎湯下尤妙
交感丹 治耳中痛臭名曰伍耳或怒氣上逆上下
不得宣通遂成聤聵
香附子童便浸炒六錢 茯神
黃連各伍錢 桂心 甘菊花各壹錢
右爲末每服壹錢九分燈心湯下
禹餘糧丸 治聤耳出膿不
禹餘糧 海螵蛸 百草霜
伏龍肝伍分 大附子去皮臍生用壹枚

右末以綿裹如貝眼核大安耳內日再易之如不
效乃有蟲也
龍骨散 治諸膿耳
枯礬 龍骨 胭脂胚各壹錢 麝香少許
爲細末以綿裹杖子拭去耳中膿再吹一字入耳
中日再加海螵蛸一錢尤妙
羊角散 治耳內膿汁不乾
山羊角燒存性爲末每吹二三分入內一日二次
三日全瘳
滋陰地黃丸 治耳中膿汁不乾腎陰不足

熟地黃 白茯苓 山茱萸
甘菊肆錢 牡丹皮肆錢 何首烏黑豆蒸
黃檗肆錢
右爲末煉蜜丸梧子大每服三五十丸
白歛散 治小兒凍耳成瘡或癢或痛
黃檗 白歛各
右爲末先以湯洗瘡後用生油調塗
口瘡 附口瘡一證形與名不同故治法亦異有發於
未病之前有生於已病之後大抵此疾不拘涼有
血氣盛者又加將養過溫或心脾二經有熱或客熱

在胃中熏蒸上焦而成其瘡此爲實證宜宣熱拔毒使
無炎熾自然作效可用當歸散加升麻乾葛黃芩木
通燈心煎服及投牛蒡湯拔毒飲木通散點以消
黃散 若口內白爛於舌上口外糜潰於唇弦瘡少
而大不甚爲痛常流清水此因脾胃虛熱上蒸內已
先發而後形於外宜自解散或當歸散水煎熟
服和胃氣理虛熱次投牛蒡湯三解散塗以綠袍散
立効飲黃金散或投天竺黃散地黃膏 若瘡生於
口角是脾有積熱才開口則燥痛飲食多難甚至再
有外風吹着便覺拆裂微有清血謂之燕口瘡治法

同前藥餌輕者用貓糞燒灰流汁塗之亦驗　有口
唇下成小片赤爛此因飲食鹹汁淋瀝不潔以嬰
兒皮肉脆嫩浸漬成瘡及有風熱乘之名曰水漿瘡
又謂之疳蝕瘡其所因者一也治法同前澄內藥劑
有無故口臭糜潰而不成瘡或服涼劑或塗末藥
不能療者此名元焦故叔和脉訣曰陰數脾熱并口
臭是脾家有虛熱上攻於口宜服回陽散兒大者用
黑錫丹早食前新汲水入鹽少許調勻送下與正元
氣及參苓白术散調元散服之以立效飲黃金散乾
點潰爛處或用蒸蜜同熟水調點舌上令其自化爲

下無妨仍忌毒物

當歸散 解熱　牛蒡子湯 咽喉

拔毒飲　解風熱毒氣上攻頭項瘡腫作痛發驚又

治發癤

天花粉去粗皮壹兩　生地黃洗　白芷

當歸尾洗　桔梗去蘆　甘草半兩 五味各

右㕮每服二錢水一盞七分無時溫服

木通散 淋　消黃散 舌

百解散 驚　三解散 潮熱

保兒散 舌

立效飲　治口內牙根舌上發瘡作痛致語言飲食
不便

淨黃連去鬚　北細辛　玄明粉貳錢

右細剉或晒或焙為末仍同玄明粉乳鉢內杵勻
每用一字乾點患處或以一錢新汲井水調塗瘡
上兒小者畏苦不肯點只用蜜水調敷患處令其
自化咽痛茶清調下

黃金散　解口內舌上瘡毒及治痘瘡後目生翳膜

黃蘖　粉草壹兩 味各

右剉研爲細末治口瘡用藥末乾點患處或用麥
門冬熟水調點舌上令其自化若痘瘡後目生翳
膜湯泡蒼清無時頻洗仍投糖煎散佛煎散二藥

天竺黃散　主上焦風熱口舌生瘡兩目赤腫咽膈
不利涎痰壅滯氣不通暢驚搐煩悶神思昏迷

天竺黃　鬱金皂角水煮　茯神去皮根

甘草 四味各　鵬砂　牙硝

白芷　川芎　僵蠶去絲

枳殼麸炒去瓤 各貳錢半　硃砂水飛壹錢　麝香一字

蟬殼去足 拾伍枚

右除鵬砂牙硝硃砂麝香四味乳鉢細杵餘九味

焙乾爲末同入乳鉢内再研勻每服半錢或一錢溫薄荷湯無時調服或麥門冬湯

地黃膏　治口内舌上生瘡作痛飲食難進晝夜啼哭

山梔仁　菉豆粉各三錢　粉草各五錢

右或曬或焙爲末用生地黃爛杵取汁一兩半好蜜一兩半以薄瓦器盛在銅銚中水煮成膏稠糊相似候冷亭分入前藥末同在乳鉢内再杵勻丸芡實大每以一丸至二丸麥門冬熟水無時化服兒大者每用一丸納口内含化或以新汲水調點舌上

回陽散 方闕　黑錫丹 大科頭痛

參苓白朮散 不能食　調元散 解顱

辨諸瘡口瘡因乳哺失節或所食肥甘積熱或乳母七情鬱火所致其證口舌齒齦如生瘡狀若發熱作渴飲冷額間色赤左寸脈洪數者此屬心經先用導赤散清心火次用地黃丸滋腎水若寒熱作渴左頰青赤左關脈弦洪者屬肝經先用柴胡梔子散清肝火次用六味地黃丸生肝血若兩腮黃赤牙齦腐爛大便酸臭右關脈洪數按之則緩者屬脾經用四味肥兒丸治脾火以五味異功散補脾氣若發熱咳嗽右腮色赤右寸脈洪數按之濇者屬肺經先用清肺飲治肺火用五味異功散補脾胃若發熱作渴兩頰黧色左尺脈數者屬腎經不足先用六味地黃丸以生腎水次用補中益氣湯以生肺氣又有走馬疳者因病後脾胃氣血傷損虛火上炎或痘疹餘毒上攻其患甚速急用銅碌散大蕪荑湯輕則牙齦腐爛唇吻腮腫重則牙齦蝕露頰腮透爛若飲食不入喘促痰甚此脾胃虛而肺氣敗也頰腮赤腐不知痛者此胃氣虛甚而肉死也並不治

經云手少陰之經通于舌足太陰之經通于口因心脾二經有熱則口舌生瘡也當察面圖部位分經絡虛實而藥之若元氣無虧暴病口生白屑或重舌者用亂髮纏指蘸井花水揩之或刺出毒血敷以柳花散傅之上以腫脹或有泡者並令刺破敷前散或以青黛搽之刺後又生又刺若唇吻坼裂者用當歸膏調柳花散敷之若元氣虧損或服寒涼之藥或兼作嘔少食者此虛熱也用五味異功散加升麻柴胡若泄瀉作渴者脾胃虛弱也用七味白朮散若腹痛惡寒者脾胃虛寒也用六君薑桂若因母食酒麪煎爆者用清胃散若因母飲食勞役者用補中益氣湯肝

脾血虛者用加味逍遙散鬱怒內熱者用加味歸脾湯母子並服若泥用降火必變慢脾風矣仍參吐舌弄舌治之凡針重舌以線針直刺不可橫挑恐傷舌絡致言語不清也

東垣清胃散　治胃經有熱齒牙作痛或飲冷作渴口舌生瘡或唇口腫痛焮連頭面或重舌馬牙吐舌流涎若因服尅伐之劑脾胃虛熱口舌生瘡或弄舌流涎或嘔吐困睡大便不實者用五味異功散

升麻五分　生地黃肆分　黃連

牡丹皮各叁分　當歸稍肆分

右水煎服嬰兒母亦服

清熱消毒散　治實熱口舌生瘡及一切瘡瘍腫痛形病俱實者

黃連炒　山梔炒　連翹

當歸各伍分　川芎　芍藥炒

生地黃各叁分　金銀花各錢　甘草貳分

右水煎服嬰兒母同服

四君子湯　治脾氣虛熱口舌生瘡或但胃氣復傷飲食少思或食而難化若作嘔泄瀉尤宜用之如兼痰嗽氣逆肢體倦怠面目浮腫宜用六君子湯

六君子湯　治脾胃氣虛吐瀉不食肌肉消瘦或肺虛痰嗽喘促惡寒或驚搐目直口噤潮熱不能食（方見一）

五味異功散　治脾胃虛熱口舌生瘡或因誤服尅伐之劑脾胃復傷面目口舌生瘡或弄舌流涎吐瀉不止飲食少思或驚搐痰嗽睡而露睛手足並冷若母有病致兒患者子母並服（方見）

柳葉散　治熱毒口瘡

黃蘗炒　蒲黃　青黛各分煅　人中白煅各等分

右為末敷之

如聖散　治小兒口瘡不能吮乳者江子一粒或二粒研爛不去油入硃砂黃丹傅紙絹上少許剃開小兒顖門貼在顖上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥恐成瘡更用菖蒲水洗其效如神

心法　南星膏　治口瘡小兒不用藥以大天南星去皮取中心龍眼大為末和用醋調塗脚心甚妙

又治小兒口瘡飲乳不得以白礬如雞子大置醋中塗兒足底二七次即愈

無比狂蜅散　治小兒口瘡

牡蠣煅過……為末……甘草壹錢

右和勻時時挑少許摻口中或咽亦無害

一口瘡治法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯後用黃藥末研細摻之

湯治口瘡驗方

黃蘗

右二件為末頻摻口

一口瘡服涼藥不愈者……不足虛火泛上宜附子理中湯

一咽喉為肺胃道路明胃經其生癰者多因兒食甘甜厚味脾胃積熱所致亦有乳母鬱怒兒受其患者若

因熱積於內二便不通者用涼膈散風邪相搏二便如常者用漏蘆湯胃經風熱或兼咽喉腫痛用升麻防風湯若稟賦陰虛火動頰間或兩耳內生瘡或出膿不止者宜用地黃丸若因乳母肝火乘脾用加味逍遙散肝經鬱熱用加味歸脾湯胃經積熱用東垣清胃散脾胃風熱用消咽利膈湯仍參口瘡治之

升麻防風湯　治胃經實熱咽痛口燥腮癰等證

升麻　防風　黃蘗炒　茯苓

芍藥炒　陳皮各五分　連翹　當歸各三分

右每服二錢水煎仍量大小用之

清咽利膈湯　治心脾蘊熱或咽喉腮舌腫痛

玄參　升麻　桔梗炒　甘草炒

茯苓　黃連炒　黃芩炒　牛蒡子杵炒

防風　芍藥炒各等分

右每服一二錢水煎

本事方治小兒病氣攻腮赤腫可畏者

皂角貳兩　天南星　糯米壹合

右為細末薑汁調塗立効

一臂癰之證當分經絡所屬受證之因而治之上廉屬手陽明經下廉屬手太陽經外廉屬手少陽

經內廉屬手厥陰經內之上廉屬手太陰經內之下廉屬手少陰經或經絡熱鬱風邪外干氣血有乖節若腫痛者因心經有熱者導赤散加黃連心包絡有熱者柴胡梔子散肺經有熱者瀉白散大腸經有熱者大連翹飲漿肺作痛者氣血凝結也用仙方活命飲膿痛不潰者欲作膿也用托裏消毒散膿熟不出者氣血虛也用托裏消毒散膿出反痛者氣血虛甚也肌肉不生者脾胃氣虛也用五味異功散不可外傅生肌散恐反助其邪而肌肉難長也

白芷升麻湯　治手陽明經分臂上生癰

白芷　升麻　桔梗各壹錢　黃芪炒
黃芩酒炒各錢　生黃芩五分　紅花　甘草炙各伍分
右水酒半鍾煎食後服
大連翹飲[illegible]翹湯　治肺熱生瘡
連翹　瞿麥　荊芥　木通
赤芍藥　當歸　防風　柴胡
滑石　蟬殼　甘草　山梔子
黃芩各等分
右為末每服二錢加紫草水煎服　大便不通量
加大黃

腋癰　脇腋癰屬足少陽手少陰手厥陰三經小兒患之多稟賦肝火所致初起先用活命飲次用柴胡梔子散五七日間作膿焮腫作痛者亦用活命飲殺其大勢雖潰亦輕而易斂若膿已成用托裏消毒散已出用托裏散如有變證當隨證治之

脇癰　脇肋者足厥陰少陽之經相火之司也乃木之主肝膽之氣不平則風火內搏滎逆血鬱熱聚為膿而癰腫之所由生也亦有稟賦母氣肝膽之熱恚怒之火而致然初患焮腫作痛者宜用柴胡梔子散未消者用仙方活命飲其毒既殺而腫不消者則必成膿也乃用托裏消毒散其膿既成以代針膏決之仍用托裏散自愈若膿出而痛止腫消則不必用藥也

加味歸脾湯　治小兒因乳母憂思鬱怒胸脇作痛或肝脾經分患瘡瘍之證或寒熱驚悸無寐或便血盜汗瘡口不斂等證
人參　黃芪炒　茯神去木
甘草炒　白术炒各壹錢　木香伍分
遠志去心　酸棗仁　龍眼肉
當歸　牡丹皮　山梔炒各壹錢

右水煎乳母服兒亦服之
小柴胡湯　治肝膽經分一切瘡瘍發熱潮熱或飲食少思加山梔牡丹皮名加味小柴胡湯方見發熱
柴胡清肝散方見肝熱　治肝經風熱或乳母怒火患一切瘡
梔子清肝散一名梔子柴胡散　治三焦及足少陽經風熱生瘡或發熱耳內生瘡作痒或出水疼痛見腎熱

腹癰　腹癰者患於臍下或傍一寸許屬脾經近臍屬膽經蓋因脾經陰虛氣滯血凝或因脾虛飲食積熱所患若焮腫作痛者為黃散欲使腫痛者清胃散

腫痛便秘者清涼飲如此而仍痛者瘀血凝滯也活命飲既用此藥而不消則內欲作膿也用托裏消毒散若膿出而痛不減者毒未解也亦用前藥若膿出而反加痛及膿水清稀者氣血虛也用參芪托裏散若食少體倦者脾氣虛也用五味異功散加當歸柴胡升麻晡熱內熱者脾血虛也用四君當歸丹皮如有他證當隨證治之

臀癰　薛臀癰屬膀胱經濕熱或稟賦陰虛若腫硬作痛用內托羌活湯微腫微痛用托裏消毒散若初起大痛或五日之間似消不消似潰不潰者先用仙方活命飲後用托裏消毒散若已潰食少體倦瘡不生肌肉脾胃虛弱者用五味異功散加柴胡升麻稟賦陰虛小便數而不斂者加減八味丸氣虛久不生肌收口用豆豉餅及補中益氣湯培養元氣若用解熱攻毒及敷圍寒涼之劑則氣血受傷必成敗證矣

內托羌活湯　治尻臀生癰堅硬腫痛

羌活　黃檗酒製各壹錢　防風
藁本　當歸尾各伍分　肉桂
連翹　甘草炙　蒼朮
陳皮各叁分　黃芪捌分

右作二劑水一鍾入酒一杯煎空心服

腿癰　腿癰之證所主之經不同而所治之法亦異發於內側者屬肝脾二經發於外側者屬膽胃二經漫腫堅硬者元氣虛弱也用內補黃芪湯腫勢高焮者元氣未虛也用內托柴胡黃芪湯外並用隔蒜灸法若瘀血凝滯而不消或不作膿者用活命飲血氣虛弱而不能潰及不生肌肉者用托裏散此其梗槩云爾　一小兒腿內側前廉患毒潰後腫硬色黯膿清不斂而色青黃此脾虛肝旺兼寒邪襲於患處也當壯元氣爲主先用異功散加柴胡升麻及蔥熨法脾氣漸復患處漸愈佐以八珍湯豆豉餅而愈　一小兒腿外側痛腫肉色如故用托裏消毒散二劑而腫始赤又四劑而腫赤亦退又六劑潰而膿出清稀食少體倦用異功散加芎歸仍用托裏散補其元氣而愈　一小兒漫腫堅硬肉色不變此陽氣虛而不能成膿也用托裏散如聖餅觸起色赤用托裏消毒散而膿成針之用八珍湯加肉桂漸愈因傷食吐瀉患處夭白飲食少思先用六君乾薑次用八珍湯及蔥熨法而愈　一小兒患此久不愈膿水清稀面色萎黃腹大青筋此脾氣虛甚肝所侮也朝用補中益

氣湯久用五味異功散元氣稍復乃佐以四味肥兒丸及蔥熨之法兩月餘而愈 一小兒腿外臁腫一塊服消毒之藥其腫益甚肢體消瘦飲食少思更加作痛余曰先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也當滋接陽氣不信仍投敗泄之藥後果殁

機要云榮衛之氣充滿抑遏不能行故閉塞氣血腐而為癰者當泄之以奪盛熱之氣若人飲食疏精神衰氣血弱肌肉消薄故榮衛之氣短促而滿滯故寒邪搏腠理閉鬱而為癰者當補之以接虛怯之氣信矣

肺癰

齊氏云肺癰肺痿因脾肺氣虛腠理不密外邪所乘或母食辛辣厚味遺熱於兒或兒有病過於汗下內亡津液虛火爍肺或服尅伐之藥虧損脾胃不能生肺金其證惡風咳嗽鼻塞項強呼吸不利甚則四肢微腫咳唾膿血若吐臭穢胸中隱痛脉數而實者為肺癰咳唾涎沫脉數而虛者為肺痿惡寒喘嗽者寒邪內蘊也小青龍湯咳唾膿穢者肺癰內潰也桔梗湯竊謂前證若喘咳短氣者脾肺氣虛也五味異功散咳唾膿痰左尺脉數而無力者腎氣虛也六味地黃丸咳唾膿痰右關脉數而無力者脾氣虛也七味白术散若發熱喘嗽唾膿不食者脾肺虛甚也難治大要補脾肺滋腎水為善[illegible]

小青龍湯 治傷風冒寒咳嗽喘急肺脹胸滿鼻塞流涕或乾嘔熱咳或作渴或作噎或小便不利或小腹脹滿[illegible]

麻黃去節 赤芍藥 半夏各柒
細辛 乾薑炮 甘草炙
桂枝各二錢 五味子 附子貳錢炮汗不用

右每服一二錢水煎

桔梗湯 治咳嗽膿血腥穢已成癰證

桔梗炒 貝母去心 知母炒
桑白皮炒 枳殼各壹錢 地骨皮
瓜蔞仁 薏苡仁 杏仁各伍分杵
當歸 黃芪各壹錢炒 五味子杵炒
百合各壹錢五分炒 防已壹錢 甜葶藶炒五分

右每服二三錢水煎服

升麻湯 治肺癰膿血穢臭胸乳皆痛

升麻 桔梗炒 薏苡仁 地榆
條芩炒 牡丹皮 芍藥炒 甘草各等分

右每服二三錢水煎

排膿散 治肺癰此方排膿補肺

黃芪鹽水拌炒　白芷　人參　五味子炒各等分

右為末每服一二錢蜜湯調下

射干湯　治胃脘癰吐膿血

射干去毛　梔子仁　赤茯苓　升麻

赤芍藥壹兩半　白朮伍錢

右每服三五錢水煎入地黃汁少許再煎服

人參平肺散　治心火尅肺金傳為肺痿咳嗽喘嘔

痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

人參　陳皮　甘草　地骨皮

茯苓各壹錢　知母炒柒分　五味子炒　青皮

天門冬去心肆分　桑白皮炒壹錢

右每服二三錢

參芪補脾湯　治肺癰脾氣虧損咳吐膿涎或中滿

不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參　白朮各貳錢　黃芪炒貳錢伍分　茯苓

陳皮　當歸各壹錢　升麻叁分　麥門冬柒分

桔梗炒陸分　甘草炙伍分　五味子杵肆分

右作三服薑棗水煎

人參補肺湯　治肺證咳喘短氣或腎水不足虛火

上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱小便短澀

人參　黃芪炒　白朮　茯苓

陳皮　當歸各壹錢　山茱萸　乾山藥

五味子杵　麥門冬去心　甘草炙　熟地黃自製

牡丹皮各八分　右每服五錢水煎服

腸癰 張仲景云腸癰之證因飲食積熱或母食辛熱之物所致小腹按之則痛小便數似淋腹急惡寒身皮甲錯或自汗惡寒若脉遲緊未有膿者用仙方活命飲以解其毒脉洪數已有膿者服太乙膏以下其膿小腹疼痛小便不利者膿壅滯也牡丹皮散主之竊謂經云腸癰為病不可驚驚則腸斷而死故坐臥

轉側之間須令徐緩時少飲薄粥及用八珍湯固其元氣靜養調理庶可保也

大黃湯　治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如常或焮赤微腫小便頻數汗出憎寒脉緊膿未成也急服之

大黃炒　朴硝各壹錢　牡丹皮

瓜蔞仁　桃仁去皮尖各二錢　每服二三錢水煎

薏苡仁湯　治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食

小便澀滯

薏苡仁　牡丹皮　桃仁各叁兩

瓜蔞仁二錢　右每服四錢水煎

桃仁湯　治腸癰腹中痛煩躁不安壅痛大便閉澀亦有繞臍生瘡者但用此藥無妨

桃仁　大黃　牡丹皮　芒硝

犀角鎊　冬瓜仁　右水煎入犀角末服

牡丹皮散　治腸癰腹濡而痛時下膿汁或下血

牡丹皮　人參　天麻　白茯苓

黃芪炒　薏苡仁　桃仁　白芷炒

當歸　川芎　官桂　甘草各伍分

木香貳分　右每服三五錢水煎

便癰　便癰因肝火肝瘡或稟肝經熱毒若初起腫硬作痛者先用龍膽瀉肝湯一二劑腫痛不減用仙方活命飲二劑五七日不減腫尚硬亦用前二藥各一劑如不消或更痛欲成膿也用活命飲一劑却用托裏消毒散加柴胡山梔一二劑若膿已成而不潰氣虛也用托裏消毒散一二劑膿已潰而痛不止毒氣不解也用活命飲一劑若膿已出而反痛者氣虛也用內補黃芪湯膿已潰而發熱煩躁者氣虛血脫也用當歸補血湯膿已潰而惡寒發熱者血氣俱虛也用十全大補湯膿已潰而惡寒者元氣虛也用補中益氣湯膿已潰而不生肌者脾氣虛也用六君子湯若稟賦怯弱或因飲食勞倦而為患者但用補中益氣湯加射干白芷設使不分經絡不別虛實槩行攻伐虧損氣血則輕者難治重者必變瘵證甚至不起

龍膽瀉肝湯見囊癰　仙方活命飲見前瘡

托裏消毒散見前

內補黃芪湯　治潰瘍膿水出多或過服敗毒之劑致氣虛血弱發熱無寐或暴盜汗內熱或不生肌

黃芪錢炒　人參　白朮炒

茯苓　陳皮　當歸各壹錢半

酸棗仁炒壹錢　五味子杵　甘草炒各伍分

右水煎徐徐服

當歸補血湯虛熱　清心蓮子飲淋

補中益氣湯虛熱　十全大補湯用

囊癰　囊癰屬肝經濕熱或稟胎肝熱所致初起腫痛小便赤澀者濕熱壅滯也先用龍膽瀉肝湯如不消用仙方活命飲若腫痛數日不止欲作膿也用托裏消毒散若腫未潰而小便不利者毒氣壅滯也當分利之膿已成而小便不利毒氣未解也當針泄之

膿出而反痛者氣血虛也當補益之若元氣無虧雖陰囊忽潰睪丸懸露亦不爲害若乳母恚怒令兒患此者加味逍遙散肝經氣血虛者八珍散加味柴胡山梔俱加漏蘆子母並服

托裏清肝散

人參　黃芪炒　當歸　川芎

芍藥炒　白朮　茯苓　金銀花

白芷炒　甘草炒　連翹　柴胡各五分

山梔各五分

右每服二三錢水煎

錢氏蚯蚓散治腎子腫硬先用葱椒湯煎洗次以乾蚯蚓糞津唾調敷須避風冷濕地

世傳治小兒陰囊腫大用甘草煎濃汁調蚯蚓糞塗之立効

山藥膏治兩拗及小腹腫痛或痒用山藥研爛頻敷患處乾則易之

脚凍瘡　脚足指凍瘡因受稟虛怯故寒邪易乘氣血凝滯久而不愈則潰爛成瘡治法須壯脾胃溫氣血則死肉自潰良肉自生若骨脫筋連者宜急剪去否則毒延脚面而死葢肢末之處氣血難到又爲外邪遏絶則氣血不能運行若用湯燙火烘其肉即死而不仁至春必潰腐脫落元氣無虧雖患無害如外敷寒藥內服消毒之劑則元氣受傷必成敗證凡初凍時熱手頻熨之爲妙北方凍耳莫以手觸之其耳即落大寒能裂膚墮指信然

湯氏生附散治爛脚瘡用生附末麪水調敷之愈

白斂散

白斂炒　黃蘗炒各二錢　爲末乾摻患處

湯火瘡　湯火之證若發熱作渴小便赤濇者內熱也用四物加山梔連翹甘草若肉未死而作痛者熱

毒也用四君加芎歸山梔連翹若肉已死而不潰者氣血虛也用四君加當歸黃芪外傅當歸膏或梔葉末蠟油調搽至白色其肉自生若因烟薰將死者以生蘿蔔汁灌之即蘇若飲食後被湯火所傷發熱腹脹惡食發熱變證者當參食積熱瘍門治之

附方　當歸膏　治湯火等瘡不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈肉已死者用之自潰新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡生肌最速蓋當歸生地黃麻油二蠟皆主生肌止痛補血續筋與新肉相宜

當歸　生地黃各壹兩　麻油肆兩　黃蠟壹兩止用伍錢

右先將當歸地黃入油煎枯去滓將蠟溶化候冷一攪勻即成膏矣用塗患處將細紙蓋之發背癰疽杖瘡潰爛用之尤效凡死肉潰爛將脫止有些須相連者宜用利刀剪去蓋死肉有毒去遲則傷新肉死肉去盡尤宜速貼蓋新肉最畏風寒不可忽也

乳香定痛散　治傷損一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香　沒藥各五錢　滑石壹兩　冰片壹錢

右為細末搽患處痛即止

豬蹄湯　治一切癰疽杖瘡潰爛消腫毒去惡肉潤瘡口

白芷　黃芩　當歸　羌活　赤芍藥　生甘草各五錢　蜂房蜂兒多者為佳

右用豬蹄一隻水四五碗煮熟去油粗取清湯入前藥煎數沸去粗溫洗隨用膏藥貼之

治湯火所傷方

用黃蜀葵花浸油內以油敷患處或收黃蜀葵花曬乾碾末香油調敷亦可

又方

用定粉碾極細末臘月豬脂調敷患處

又方

右用萆麻子肉碾爛入蛤粉等分如乾再入香油些少調搽患處

翻花瘡　翻花之證由瘡瘍潰後風寒襲於患處或肝火血燥生風或乳母肝火生風必致瘡口胬肉突出如菌或如指大小長短不同如風邪乘襲者先用補中益氣湯加防風天麻風寒凝滯者先用十宣散加羌活天麻兒肝火生風者先用加味逍遙散加天麻羌活母肝火生風者先用加味小柴胡湯次用加

味逍遙散加漏蘆天麻其風邪所乘外用豆豉餅風寒所凝外用蔥熨法更用太乙膏護瘡口突肉不消更以黎蘆膏塗之如瘡口不斂而惡寒發熱者元氣虛也用補中益氣湯哺熱內熱者氣血俱虛也用八珍湯倍加參芪食少難化者脾氣虛也用五味異功散若飲食少思大便不調或肌肉消瘦小便澄白者此乘肝脾疳證也用九味蘆薈丸以清肝火用五味異功散以補脾氣外仍用熨治之法

黎蘆膏　治瘡口胬肉凸起或出二三寸肉者

黎蘆不以多少　為末以生豬脂擂和搽凸胬肉上

多骨疽證多骨疽由瘡瘍久潰脾胃虧損氣血不能營於患處邪氣陷襲久則筋爛骨腐故骨脫出非稟胎所有也當補脾胃壯元氣內用大補湯地黃丸外以附子餅葱熨法祛散寒邪補接元氣則骨自脫瘡自斂若用剋伐之劑復傷真氣鮮有不危嬰兒患之當調補乳母外用葱熨以歲月除之尤不可用追蝕之藥

漏瘡證漏瘡之證因稟氣血不足或久病血氣虛弱或兒肝脾食積內熱不能生肌或乳母七情不和脾氣不能收斂當審其所因調補元氣佐以如聖餅葱熨之類為善若用流氣破血追蝕等藥反為敗證矣餘當參各門主之

金壇王肯堂宇泰甫輯

痘瘡上

溯源

錢氏曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五臟食至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汞粉下其臍糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲作之時熱動五臟則五臟之證先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面腮頰赤燥咳嗽噴嚏此五臟證俱見也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面赤顋頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在臟下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一證肝水疱肺膿疱心為斑脾為疹腎雖無證其候惡者瘡變倒靨而黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內虛所致也　東垣曰癍疹始出之證必先見面燥顋赤目胞亦赤呵欠頓悶乍熱乍涼咳嗽噴嚏足稍冷多睡驚並瘡疹之

證或生膿泡大癍或生小疹或生癮疹此三者不同何故俱顯上證而後乃出蓋已上諸證太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上故顯是證蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸癍證皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脉已旺精不勝血則為女子乃二物相搏長先身生謂之[redacted]又謂之精其子在[redacted]十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神饑渴皆隨母血兒隨日長筋骨皮肉血脉形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻於一隅隱伏而不發直至兒因內傷乳食濕熱之氣下陷合於腎中二火交攻榮氣不從逆於肉理惡血乃發諸癍疹皆出於腎水其瘍後聚肉理歸於陽明故三番癍始顯之證皆足太陽壬膀胱尅丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱

化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也　曲氏曰痘疹之原有論癍毒者有論淫火者有論時行正病者靡有定論將謂癍毒淫火耶則一歲之中大而郡縣小而村落病者相似而死相繼未必人人若此之甚也將謂時行正病邪何以自少至老但作一度厥後再無傳染也蓋父母於子一體而分精血之毒已遺於陽施陰化之始固不待誕生之頃嚥其血而後有[redacted]也況男子惜其氣以養其精女子耗其氣以養其血[redacted]失所養即貽他日之患子之受於父母者雖殊其為毒則一也豈有男子淫火起於氣為陽毒而易治女子淫火起於血為陰毒而難治之理邪至於天行正病亦有其時但觀夫年之所加及有四時不正之氣即知有是正病也然則待時而發者胎毒也或速而危或徐而持或暴而死者氣之微甚所使也發則其毒洩矣所以終身但作一度後有其氣不復傳染焉　痘為胎毒昭昭矣其間或疎而輕或密而重或重變輕或輕變重變化叵測是又有說也疎而輕者始終如一密而重者變怪百出或因父母相傳而然或因疫癘相染而然或因鬼疰相着而然昏冥恍惚出於聞見思

處之所不及此與智者道之癡人前不必說夢也何
者蓋痘疹之毒父母胤自有之雖常作過一番而臟
腑經絡皮毛肌肉骨髓之間餘毒猶有存者一旦分
形化氣注之於子其毒亦隨之洩矣所以子之瘡瘢
多肖親也加之調攝失宜放恣無忌其毒益甚瘡痘
之候況困危篤者未必非父母之所致也凡子之侏
儒跛聾必肖於親況疹痘之毒乎且人受天地之氣
以生天地之氣變人之氣亦變或過遷正失守淫勝
鬱復之紀德令乖常毒蕾迭見自然厲氣傳染證候
相似所以輕則俱輕重則俱重若有主之者是則疫

癘之所爲也故人之癘疾而死者精靈不散游蒐往
來隨氣而行常以其氣疰於平人而爲之疾如瘵癩
之傳染然形質體厚福澤悠遠者不能相及苟體虛
福薄之人陰陽舛亂之歲則膏肓之豎臺駘之祟互
相染著又復變化術不能禁工不能治也此非鬼疰
之害乎夫治此二者當奈何曰必爲之豫解其毒乎
其氣逐其惡庶乎可免矣　按痘疹之發顯是天行
時氣廛市閭落互相傳染輕則俱輕重則俱重雖有
異於衆者十之一二而已豈可槩謂胎毒哉然疫癘
終身不染者比比皆是而痘疹無一人得免疫癘一
染之後不能保其不再染而痘瘡一發不再發則胎
毒之說又何可盡廢乎至謂淫火穢血古亦有之而
何獨無痘疹之患欲以破胎毒之說則又不然天下
之無而忽有者多矣且有名虞美人者虞美人項王
寵姬也爲項王死世哀之爲之歌對草倚聲怵慨而
草輒搖草無情識也方其未有楚則寵姬亦無況有
草耶一切衆生可妄顛倒而成三界女之又何疑乎
痘疹

預防

蓋痘瘡之病皆由父母胎毒蓄於命門之中命門者

右腎相火也寄以身生化之本故毒藏焉如遇冬令
溫和陽氣驟洩人則感之觸動相火至春夏生長之
時其毒趁發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹
者但覺冬溫即當預防宜服解毒之藥如辰砂散三
豆湯代天宣化丸皆可用也頻頻與之使瘡疹之毒
輕減自然易出易收無陷伏變遷留連之患　其辰
砂散三豆湯代天宣化丸以解時行疫癘之毒則可
或因父母精血不足者或其人素有他疾者或發熱
之時別臟形證發見者並宜兼而治之不可徒恃解
毒而竟忘其本也如脾胃素弱者宜以養脾爲重解

毒次之養脾丸服三之二解毒三之一如父母奉
養過厚積血為毒素多胎病者宜二毒併解以迴源
解毒湯代天宣化丸相間服之　丹溪云痘疹初出
時或未出時見時人有患者宜預服此藥多者令少
重者令輕以絲瓜近蒂叁寸連皮子燒灰存性為末
沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙

三豆湯

赤小豆　黑大豆　菉豆各壹升生

小甘草生剉叁兩

右以三豆淘淨同甘草用雪水八升如無用長流水代之煮

豆熟為度去甘草將豆曬乾又入汁再浸再曬汁
盡為度逐日取豆水煮任意食之

代天宣化丸

人中黃　黃芩乙庚年為君　黃柏丙辛年為君

梔子丁壬年為君　黃連戊癸年為君　苦參

荊芥穗　防風　連翹酒洗

山豆根　牛蒡子酒淘炒　紫蘇葉

先視其年所屬取其藥以為君其餘主歲者為臣
為君者倍之為臣者半之為佐者如臣四分之三
於冬至日修合為細末取雪水煮升麻和竹瀝調神
麵糊丸外用辰砂雄黃為衣每服竹葉湯下

製人中黃法取甘草大者不拘多少用新竹一節
納甘草於中仍緊塞無節空處放糞缸中浸七七
日取出曬乾聽用

迴源解毒湯

當歸身　川芎　生地黃

白芍藥　人參　連翹

黃連　生甘草　陳皮

木通各等分

右剉細加淡竹葉拾片水一盞煎半盞去查溫服

無時

養脾丸

人參　白朮　當歸

川芎各壹錢半　木香　青皮

黃連　陳皮各壹錢　砂仁

山查肉　神麯炒　麥芽炒各伍分

右為細末水調神麯糊丸如麻子大每服三五十
丸陳倉米飲下

消痘丹未曾出痘及臨出者宜擇痘病日預服

辰砂研為極細末水飛過週歲以下者伍釐分一歲以上者服壹錢

絲瓜（以近蒂者三寸燒存性為末以砂糖調服數）

右用蜜調下或將鴿子及鵝煮熟以辰砂拌上令
兒服之亦可屢試有驗

秘傳保嬰丹

真紫草（去蘆用茸勿犯鐵器）　綠豆粉（燒灰存性各肆兩　二味為君）　一兩

升麻（取新者鹽水炒引下不使上行）　川防風（去蘆及叉）　一

荊芥穗（去梗一二三）　牛蒡子（炒各貳兩　研末為臣）

真天竹黃　蟾酥（自取勿用赤眼者）　真牛黃（三味各貳分）

大朱砂（飛研取淨末叁錢）　麻黃　紫草茸枝殼（煮過就將其汁　四味為佐）

甘草稍（去皮貳兩和）　赤小豆　一　黑小豆　一

綠豆（各肆拾玖粒炒勿令焦　三味為使）

右各取細末和勻另用紫草叁兩入水叁碗煎去
查熬成膏半碗入生砂糖半碗和劑為丸如芡實
大另用飛過朱砂為衣未出痘之先濃煎甘草湯
每服小兒磨一丸大人二丸如已發熱之時生薑
湯磨服皆取汁多者可少少者可無大有神効

袁氏痘前治法凡欲治痘須在未發之先預識其證
而分別用藥重者可輕輕者必愈但未痘而愈則醫
者無功故多不肯盡心及其既發又無及矣仁者須
以救生保嬰為心寧我無功不可使嬰兒失命備陳

十八證治法於後

孩兒未痘之先感冒風邪身中火烙頭痛自汗咳嗽
不已傷寒未愈而痘隨出焉痘家謂之猿猴跳鎖傷
寒之後元氣當潤須滋陰補血解熱疎風有滋陰三
寶散可服

滋陰三寶散

當歸　黃耆　生地

白茯苓　芍藥　川芎

橘紅　甘草　防風

玄參　麥門冬（加二味）

右剉細薑棗煎

有飲食不能樽節暑濕不能護養肚腹傷壞瀉頻
仍飲食懶進肢體羸瘦愈未幾而痘隨出焉痘家謂
之概有拂摩此與先泄而出痘者不同平居無恙忽
泄而痘出此則痘隨泄減其痘夊矣今久泄初愈而
痘出則脾虛元氣弱如單服補藥恐來虛脹若冷藥
則毫釐不可用者只宜調脾如四製白朮之類可也

四製白朮散

白朮捌兩分作四分一分砂仁炒一分糯米炒一
分麩皮炒一分壁上炒揀淨為末量大小乳酒調

服

患瘧之後寒熱消爍肌肉漸瘦或有愈而疳出或帶瘧而患疳名爲馬馳劍道多有濕熱釀成此瘋草果常山斷不可用即柴胡亦是劫藥須參苓白朮微加消食袪熱之藥如八珍膏衛元湯可用也

八珍膏

人參壹兩　茯苓肆兩　乳汁
梨汁[illegible]

右加製過紫河車酒服兩匙

衛元湯

人參　白朮　全蠍
山查　半夏　當歸
橘紅　枳殼　烏梅

右䕶棗煎加乳服

小兒纔五六歲元體薄劣身發火熱乾渴患嗽疹出未幾而疳隨出焉此太陰脾經症也疳家謂之一葦航海此與尋常先疹後疳者不同凡先疳後疹者謂之逆先疹後疳者謂之順此則身弱發熱原患嗽渴又病疹初愈而疳隨後出其勢頗危須補陰清肺培脾黃耆毫釐難犯內托至奇湯可用也

內托至奇湯

天門冬　麥門冬　人參
白朮　當歸　茯苓
薏苡仁　川芎　陳皮
甘草　桔梗　銀杏去皮

右加糯米煎頻頻服

小兒平時患疳積肚大有青筋四肢瘦瘦變爲丁奚倏然疳發此謂之三仙入洞治之凡莫消疳積厚朴檳榔柴連冷藥及抱龍丸之類皆不可用宜服益黃散滴滴金可也

滴滴金

蝦蟆肚內有黃金取出金來和酒服

小兒風寒腠理時發火熱白頭遍身遍啓丹瘤愈未幾而疳隨形焉疳家謂之倒挂銀瓶多發肝心二經症忌用三黃宜犀角地黃湯紫草散可也

犀角地黃湯

犀角用乳汁磨壹錢　北丹皮　芍藥
生地黃

右加燈草水煎服

小兒未疳之前火烙臉赤眼睛直竪手足撒搐口燥

譫語驚厥屢次不數日而痘隨形焉痘家謂之痘驚
印迹此與尋常驚後出痘者不同凡先驚後痘痘出
驚止決係心經之痘多是吉徵此則驚出體虛或見
痘而驚不止硃砂金石毫不可用宜茯神湯可也

茯神湯

生地　當歸　甘草
白芍藥　茯神　遠志
桔梗

右加燈草薑煎服

小兒未痘之前身熱自汗口中咯血或鼻衄或溺血
不數日而痘隨形焉謂之痲池蹈水心肓失守致血
妄行宜清心拔火不可妄用寒凉之劑野仙獨聖散
可用也

野仙獨聖散

扁栢　玄參　地榆
血見愁　生地黄　木通
芍藥　當歸身　甘草
乾薑

小兒未痘之先身發火熱伏臥懶食肚腹膨脹服胞
浮腫睡臥不安不數日而痘隨形焉謂之石鼓無鳴
宜理脾補氣參苓白朮散加減用之可也

參苓白朮散加減

人參　茯苓　山藥
白扁豆　白朮　陳皮
蓮肉　薏苡仁　當歸
防風　枳實

右剉為散隨宜加減

小兒身發火熱自汗不止眼睛昏花呵欠啼叫未愈
而痘隨兒焉謂之赤澤栽蓮宜斂汗補肝宜黄耆慈
人乳頻頻服之并固眞湯可用也

固眞湯

綿黄耆貳兩蜜炒　酸棗仁肆兩　人參
白芍藥　當歸　生地黄
茯苓　甘草　陳皮

右㕮咀生薑煎服

小兒不時父母不能護從恣其出入跌蹯傷損頭面
肢體未愈而痘隨出焉謂之破甕潑漿宜補血扶脾
籠金湯可用也

籠金湯

木香　生地黄　芍藥

紅花　當歸　甘草
白芷　土木鱉　橘紅
木通　桔梗　白朮

右加薑棗煎服

兒輩胸膈飽脹飲食脹惡身發火熱嘔吐頻頻未愈而痘隨發焉醫家謂之逐鹿亡羊此與尋常先吐後出痘者不同大凡因發痘而吐毒隨吐滅出痘必輕个則先因胃氣有傷腹脹惡食吐又頻頻不止則危迫之象矣須要調理脾胃如紫霞黃露飲可用也

紫霞黃露飲

乾薑　半夏　藿香
砂仁　枳殼　陳皮
豆蔻　白朮炒　青皮

右㕮咀水煎服

小兒面色萎黃時作潮熱眼胞浮腫肚腹絞痛此爲小痢未愈而痘隨出焉醫家謂之推車陷雪此因脾胃有傷漸成疳積祛蟲逐積之藥俱不可用惟調理脾胃爲上策龍旋散最妙

龍旋散

青皮　乾薑　官桂
玄胡索炒　丁香　[illegible]
砂仁　枳殼　檳榔
厚朴　香附　山查
艾葉

小兒遍身生瘡頭頸腰窠旋繞手足關軸如蛇皮纏裹寒熱不時噴嚏不止未愈而痘隨出焉醫家謂之霜逐梧桐法宜涼血衛脾貞元散可用也

貞元散

甘草　桔梗　人參
白芍藥　黃芩　茯苓

木通　紅花　白朮
生地黃　白芷　升麻
陳皮　天花粉

右川燈草煎服

孩兒心中刺痛未愈而痘隨出焉醫家謂之犯奪天粉此非氣逆即爲蟲積龍蟠飲可用也

龍蟠飲

人參　當歸　枳殼
白豆蔻　丁香　木香
官桂　青皮　半夏

山查　三稜　二蓬砂
厚朴
右用生薑酒煎服
小兒兩眼風熱紅腫羞明刺痛雖恐未愈而症隨出
焉醫家謂之彈打天烏法宜清肝徒火滋玄竅提陰
氣穀精龍膽散可用也
穀精龍膽散
生地黃　紅花　荊芥
龍膽草　木通　甘草
赤芍藥　穀精草　白茯苓

鼠粘子
右加燈心煎服
小兒飲食過度傷損脾胃或飽悶或吞酸或吐瀉未
愈而症隨出焉醫家謂之風燕失巢症全賓脾胃急
宜消食理脾消導飲磨積散相兼而用可也
消導飲
厚朴　枳實　砂仁
山查肉　半夏　神麴
檳榔　三稜　蓬朮
丁香

右加乾薑煎服
磨積散
乾葛　陳皮　麥芽
二蓬砂
右加生薑煎服
兒輩小腹硬脹刺痛小便亦澀難通欲尿則啼不尿
則痛未愈而症隨發焉醫家謂之斷橋失渡此係心
經移火積於小腸淺牛膏是對證之藥
淺牛膏
六田螺用葱鹽加少麝搗爛爲膏熱烘細絹□貼
水腹用手摩之

運氣
痲症內發於藏府外應乎運氣天動人隨毫髮不爽
是故治痘者以明運氣爲急也歷稽往者大率三五
一發雖各年參出間一有之而其大發之期則三年
爲準也所謂三年者多係子午卯酉之年子午少陰
君火司天而陽明燥金在泉卯酉陽明燥金司天而
少陰君火在泉諸瘡非火不發非金不收痘以少陰
陽明二經爲正者爲是故也然玄化密移……
五運有不氣太過不及之殊六氣有……

相勝之異幾微不同則全體盡別爲有當盛行而不盛行有不當盛行而傳染周徧者是不可執一論也

【萬】瘡疹之候或間數年而發或發則連年不已何也經曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣蓋司天者主行天之令上之位也歲運者主天地之間人物化生之氣中之位也在泉者主地之化行乎地中下之位也一歲之中有此上中下三氣各行化令氣偶符會而同者則通其化其中於人則病矣所以瘡疹必待其年而發也六十年中天符十二年戊子戊午己丑己未戊寅戊申乙卯乙酉丙辰丙戌丁巳丁亥其中又四年爲太乙天符戊午己丑己未乙酉謂之天符者司天與運同也太乙天符者司天與運及辰之同也歲會八年丙子己丑丁卯甲辰甲戌戊午己未乙酉謂之歲會者運與支同也同天符六年甲辰壬戌庚子庚午壬寅壬申同歲會六年癸卯癸酉癸巳癸亥辛丑辛未謂之同者謂歲運與在泉合其氣化陽年曰同天符陰年曰歲會也此五者雜而言之共三十六年合而言之止有二十六年經曰天符爲執法歲位爲行令太乙天符爲貴人邪之中人則執法者其病速而危行令者其病徐而待貴人者其病暴而死也又子午之歲少陰君火主之寅申之歲少陽相火主之經曰少陰

所至爲瘍疹少陽所至爲嚏嘔瘡瘍惡病暴死凡此數年剛柔失守升降窒抑待者不退新者不遷則連年發而不已也　按運氣之說內經幾居其半而世罕行用益泥其常不通其變則以爲無驗余友繆仲淳高明善醫至排斥五運六氣之謬不容口余以王炎沈括之說折之亦不服蓋未嘗虛心而細求之也假令厥陰用事其氣多風民病濕泄豈普天之下皆多風普天之民皆病濕泄耶至於一邑之間而雨暘有不同者此氣運安在欲其無謬不可得也大凡物理有常有變運氣所主者常也異夫所主者變也常如本氣變則無所不至而各有所占故其候有從逆淫鬱勝復太過不足之變其發皆不同若厥陰用事多風而草木榮茂是之謂從天氣明潔燥而無風此之謂逆太虛埃昏流水不冰此之謂淫大風折木雲物濁擾此之謂鬱山澤焦枯草木凋落此之謂勝大暑燔燎螟蝗爲災此之謂復山崩地震埃昏時作此之謂太過陰森無時重雲晝昏此之謂不足隨其所變疾癘應之皆視當時當處之候雖數里之間但氣候不同而所應全異豈可膠於一定熙寧中京師久旱祈禱備至連日重陰人謂必雨一日驟晴炎日

赫然沈時因事入對上問雨期沈對曰雨候已見期在明日衆以謂頻日晦濟尚且不雨如此暘燥豈復有望次日果大雨是時濕土用事連日陰者從氣已効但為厥陰所勝未能成雨後日驟晴者燥金入候厥陰當折則太陰得伸明日運氣皆順以是知其必雨嗚呼今安得如存中者而與之言運氣哉

疫癘

【萬】痧疹雖胎毒必待時令不正之氣相傳染而發春春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此四時正氣之序若春應煖而反寒夏應熱而反凊秋應涼而反熱冬應寒而反溫此非其時而有其氣乃不正之令也夫人感之或為寒熱或為瘧痢或為喉痺或為腫或為疵疹謂之天行正病又云疫癘是以一歲之中彼此傳染大小相似又若冬溫陽氣暴泄至於來歲必發痘疹何也蓋小雪以後為終之氣太陽寒水主之水德不彰使厥陰少陰木火之氣反來乘之陽氣早發奉生者少故來春民多病也況痘疹之毒藏於至陰之下發於太陽之經當其時而動其氣毒乃發矣此冬溫之後必發痘疹也凡此不正之氣發之泄之解之平之勿犯歲氣是謂良工故治疫癘者以解毒為急

辨疑似

【錢】傷寒男體重面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠頓悶項急　瘡疹則腮赤燥多噴嚏悸動昏倦四肢冷　傷寒當發散之瘡疹當溫平之有大熱者宜解毒　昏睡善嚏悸者將發瘡疹

【匯】辨痘證　呵欠　噴嚏　睡中急驚　耳尖冷　眼澀　辨傷寒　口熱　口中醋氣　奶瓣不消　腹中疼痛　【劉】或傳染或傷風或傷食或痘疹其證不一頭與肢節疼痛無時者為時疫傳染熱也面赤汗出而鼻流清涕者為傷風熱也午後發熱頭與肚熱右額有紋者為傷食熱也乍寒乍熱呵欠頓悶驚悸咳嗽噴嚏兩腮赤紅觀涼耳涼者為痘疹熱也渾身壯熱妄言鬼神口鼻衄血驚搐不止幾死而復生為痘疹實熱在內也

【錢】瘡疹候面燥腮赤目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽噴嚏手足梢冷夜臥驚悸多睡此瘡疹症天行之病也　瘡疹始出之時五藏證見惟腎無候但見平證爾尻涼耳涼是也尻耳俱屬於腎其居北方主冷也

痘疹之始發有因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有跌撲驚恐蓄血而得者或爲竄眼驚搐如風之證或口舌咽喉腹肚疼痛或煩躁狂悶昏睡或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨須以耳冷尻冷足冷鼻尖冷驗之並視其耳後有紅筋赤縷者爲真又脈洪大而弦數診脈之際身略戰動是其證也

歌曰五指稍頭冷驚癇不可安若還中指熱必定是傷寒中指獨自冷麻痘正相干男左女右別分明仔細看

秘法凡入門看痘未知是否但見心窩皮膚内有紅色兩耳尖冷耳筋紅見此痘徵也　看耳筋法未出之先紫筋者不治須以凉血解毒之劑治之亦有愈者若二便秘結宜先通利大紅者可治而愈不紅者不藥而愈桃紅者分經而治之　分男左女右看

驗痘時候 錢 始發潮熱三日已上熱運入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留皮膚之間潮熱隨藏出如早食潮熱不已爲水泡之類也 張 痘瘡皆因發熱而出即其熱之有時可知其自何藏發出寅卯辰時潮熱者屬肝當出水泡巳午未時潮熱者屬心當出斑疹申酉戌時潮熱者屬肺當爲膿泡亥子丑時潮熱者屬腎當出疹子

辨痘疹是否 上驗痘[illegible]法若三日未覺形迹當以生酒塗身上時時看之状如蚤咬者是也或曰傷寒傷食潮熱與痘疹不[illegible]外者宜以辛凉之劑調之五日已裏發出即汗五日已外無者非痘也各隨應見而治之

疑似痘證 治小兒壯熱或昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯其驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜以藥下之　海藏云宜以藥下之者當察其所傷何物生硬寒熱不等不可遽以巴豆之類大毒之藥下之升麻葛根湯太陰陽明和惺惺散治風熱咽不利脾不和少陽渴小便不利也小柴胡湯治往來寒熱胸脇微痛少陽也然欲知其經當以脉別之　小兒耳冷尻冷手足乍煖乍凉面赤時嗽時嚏驚悸此瘡疹欲發候也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡荽酒黃柏膏若煩躁食後與白虎湯上[illegible]解散熱甚與紫草[illegible]咽喉或生瘡與甘桔湯甘露飲餘依前說大人小

同治法惟大小不同耳　海藏云消毒散太陽藥也
白虎湯治身熱目疼鼻乾不得卧陽明藥也甘露散
肺腎藥也甘桔湯少陽藥也紫草天冬麥冬黃芩生
地爲血劑玉露散肺腎藥也有膏寒水石爲氣劑已
上五方皆爲時者之藥

五藏見證

錢五藏各有一證　肝藏水疱　肺藏膿疱　心藏
癍　脾藏疹　歸腎變黑　海肝藏水疱色或青肺
藏膿疱色或白脾藏疹或如麩糠色心藏癍其色赤
變歸腎則色黑矣此五色凡痘疹一色者善或二色
三色相合而作者凶　第一大小不等　小兒在胎

十月食五藏穢血生下則其毒當出故瘡疹之狀皆
五藏之液肝主淚肺主涕心主血脾爲裹血其瘡出
有五名肝爲水疱以淚出如水其色青而小肺爲膿
疱以涕稠濁如膿其色白而大心爲癍主血其色赤
而小次於水疱脾爲疹其色赤黃而小涕淚出多故
膿疱水疱皆大血榮於內所出不多故癍疹皆小又
病水疱膿疱者涕淚俱少以液從瘡出故也譬如泡
中容水水去則泡瘦矣　翌有水疱者俗謂之水痘
也膿疱者俗謂之痘子也癍者俗謂之瘄子也疹者

俗謂之麻子也痘之形狀最大水痘次之癍瘄又次
之麻子最小隱隱如麻子也　張四藏之瘡名狀不
同肝爲水疱肝之液爲淚淚出如水其色微青而小
肺爲膿疱肺之液爲涕涕如膿色微白而大心主血
其瘡爲癍色赤而小脾主裹血其瘡爲疹色赤黃而
淺此言其初發之狀不同如此及五七日後不問其
初出何藏悉成血疱血疱成膿疱膿疱之後結痂
痂而愈矣或謂肺爲膿疱而血疱之後又成膿疱何
耶蓋肺爲膿疱者言其初出淡淡如膿其色白而非
黃者血疱後所結膿疱乃其瘡已熟包裹黃膿其色
黃而非白所言膿疱雖同而所以爲膿疱則不同也

又如脾爲疹亦自其初出色黃微赤有小癍瘡而言
之耳其成膿結痂收靨而愈與所謂膚疹者名同而
實則大不同也心爲癍與所謂溫毒冬溫發癍者亦
大不同　閩凡瘡疹五藏見證要察何藏之證爲甚
即于其藏之毒多如肝證毒多者必發水疱生瘙癢
成目疾宜預解肝之毒滋清湯加青皮柴胡　肺證
毒多者必增喘嗽煩渴不止下拔眉目鼻面宜預解
肺之毒瀉白散合甘桔湯加牛蒡子天花粉　心證
毒多者必伏不起譫妄飲水煩哭咬牙宜預解心之

毒導赤散加黃連辰砂　脾經毒多者必成灰白色癢塌吐利宜預保養脾胃以解其毒四君子湯調元湯加白芍藥防風連翹　腎不見平證耳骫俱熱者死候也

羌活湯發熱　　瀉白散肺
甘桔湯咽喉　　導赤散心
四君子湯吐瀉　　調元湯即保元湯

部位

圖諸瘡皆屬心火心之華在面瘡痘之候但以面之部位占之思過半矣凡痘疹陽毒諸陽皆聚於面吉凶善惡尤易見也額屬心火如印堂以上髮際以下橫兩日月角位先見紅點先作漿先結靨者此惡候也蓋心爲君主毒發於心故先見於其位君危則十二官皆危其死速矣左臉屬肝木右臉屬肺金如兩臉先見紅點磊落者吉如相聚作塊其肉硬腫者死蓋肝藏魂肺藏魄生意既絶魂魄將離故不治也頦屬腎水漿橫抵兩頤先見紅點先發先靨者吉此位雖屬腎然三陰三陽之脈皆聚於此陰陽和故可治也鼻屬脾土若準頭先出先靨者凶蓋脾屬土四藏稟命於脾毒發於脾十收則四藏相隨而敗故綿延

日久後斃也腎之竅在耳又一云心開竅於耳心腎皆少陰君火也又少陽相火之脈行耳之前後凡在耳輪先見紅點者凶蓋君相二火用事燔灼之勢難可撲滅也惟口唇四圍先出先起先靨者大吉蓋陽明之脈俠口環唇胃與大腸主之無物不受故也

痘家有八門五樞二關兩煞九軸之分　心爲赤帝門心經絡　兩顴爲心樞　肝爲青陽門肝經　兩眼眶爲肝樞　脾爲黃央門脾經　兩頤頰爲脾樞　肺爲肅殺門　喉突爲肺樞　腎爲玄武門　兩耳垂爲腎樞　胸堂乳旁心之關　臍封脾之關　陽毬腎之關　白帝煞門座於氣窩右太陽　青帝煞門座於眼眶左太陽　顴阜胸乳心之軸　左太陽左脇兩脅肝之軸　右太陽右脇項頸氣突肺之軸　腮頰中庭口角肚腹下足脾之軸　地閣後頸耳竅背俞腰脊陽毬腎之軸　袁氏閱痘重門欄楯軸四字門犯則驗欄欄犯則驗楯楯犯則驗軸至軸而變態盡矣門凡八欄楯各十有八軸凡一百五十四各分經絡而驗之　天庭穹窿之地名赤帝門　胸堂名炎東門　兩手掌心名正離門不屬心而屬陽明透徹則…鼻先形而掌心次之陽明透徹則掌心先…　君心一

帶統上下司地號五將門　咽下系行淚堂名青陽
門　氣窩大突穴名肅殺門　兩耳竅闕爲玄武門
臍封之處神經所注名黃帝門　八門與前稍異
至欄輔軸抑又異矣闕訣繁俚無關治療故今不取

脉候

痲疹之疾有形之診無所用診又歲氣上之似不必診經曰微妙在脉不可不察察之有紀從陰陽始是則不可不診也先哲有言曰痘疹脉靜身涼者生脉躁身熱者死可見痲疹亦用診矣大抵小兒之脉多帶緊數痲毒之脉又多浮大而數傷寒論云浮爲風虛大爲氣強風氣相搏必成癮疹又曰數脉不時則生惡瘡也七歲以上五至爲平七歲以下六至爲平過則爲太數邪氣實也不及爲遲正氣虛也浮而數表熱也浮而遲陽氣衰也沉而緊裏熱也沉而細元氣脫也痲疹爲陽病其脉浮沉俱宜帶洪實者弱而無力爲陽病見陰脉㓙凡診得浮而無根瞥瞥如羹上肥數而急疾迸來如雀之啄細而欲散縈縈如蛛之絲迸而欲絕滴滴如屋之漏沉而時見如魚之躍皆死脉也　凡痘子勢重者以脉候之脉洪實者吉浮數虛小者㓙　丹溪治一男子年十六歲發熱而昏目無見耳無聞謂乎脉皆浮大而略數知其爲勞傷矣府中多發痘者納不知人與藥則飲與粥則啜遂教以參耆當歸芍藥木香陳皮大料濃煎與之飲至二十餘貼痘始出又二十餘貼則成膿疱身無全膚或曰病勞可畏何不用陳氏全方治之予曰此但虛耳無寒也只守前方又數十貼而安後詢其病因爲先四五日恐有出痘之患遂極力採樵連日出汗甚多此以脉之浮大而知其虛乃痘疹因脉施治之一例也

氣血

夫人之一身本乎榮衛衛者陽氣所以開闔宣畜運動樞機者也榮者陰血所以充滿臟腑灌溉肢體者也故氣虛則神機息血虛則化源絶二者不可偏勝也痘疹之毒本於五臟之液各隨經絡部位直犯榮衛而出氣血從之觀其表來尖窠叢充長者氣之足也根窠紅活形色潤澤者血之足也氣血既足則痘易發易靨不須施治以增實實之戒如平陷嫩薄者氣之病也乾枯紫黑者血之病也責而治之不可因循以貽後悔然脾胃者氣血之父也心腎者氣血之母也肝肺者氣血之舍也脾納水穀其悍氣注於脉而爲氣精氣合於肺而爲衛以溫分肉充皮毛肥腠

理可開闔也衛氣虛則瘡不起發其毒更
入於肺肺受之則為潛伏而歸於腎矣脾納水穀其
精氣注於心而為血心舍於用而為榮以走九竅注
六經朝白脉也榮血虛則瘡不光澤其毒乘血之虛
而入於肝肝受之則為癢瘍而歸於心矣凡治此者
氣病治氣血病治血寒則溫之熱則清之虛則補之
實則瀉之仍以脾胃為主不可犯之也

虛實

〔圈〕不知虛實者不可以為工經曰無虛虛無實實虛實之分不可不知也經曰必先度其形之肥瘠以調

其氣之虛實此以形體別虛實也又曰穀盛氣盛穀虛氣虛此以飲食別虛實也又曰脉實血實脉虛血虛此以脉別虛實也又曰邪氣盛則實精氣奪則虛此以邪正別虛實也大抵實者邪氣實也虛者正氣虛也經曰邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實是也又云五實死者謂邪氣之實也五虛死者謂正氣之虛也然凡人瘡疹之證其人形體肥健飲食能多六脉洪實素無疾病大便如常瘡色紅潤者此表裏正氣俱實也不須服藥若形體瘦怯素多疾病飲食減少六脉微弱吐利頻煩瘡色淡嫩者此表裏正氣俱虛也陳氏溫補之法可用如瘡勢太盛煩躁痛脹大熱不退煩渴昏睡大小便秘此表裏邪氣俱實也錢氏涼瀉之法可用如瘡本稠密焮發紅活吐利不食者此表實裏虛也於補湯中加解毒藥如瘡色淡白發不透滿大小便秘浩飲大嚼者此裏實表虛也於解利中加發藥又如瘡瘍者邪氣實也當活血以開其鬱若痛如刀割悶亂大叫者勿治瘡癢者正氣虛也當補氣以燥其濕如爬搔不定破爛皮脫者勿治灰白者氣虛也參耆之功為大乾燥者血虛也歸芍之力宜多虛則補之實則瀉之中病即已無過其

制此治之權衡也若本實而反補之則毒氣獨盛或為潰爛或為癰腫或為目病或為咽瘡或為失血皆補之過也如本虛而反瀉之則正氣益虛或為吐為利為厥逆皆瀉之過也經云毋伐邪毋失正絕人長命其此之謂歟

〔翁〕夫氣有生血之功血無益氣之理故氣不可虧虧則陽會不及而痘之圓暈之形不成血不可盈盈則陰乘陽位而痘之倒靨之禍立至是痘有氣血虛實之殊也大抵寒為虛熱為實氣虛則宜溫補氣實熱則宜清涼血虛則宜補血血熱則宜解毒必取其氣

血中和無過不及可也何謂氣血虛實且如氣過則
泡血過則癡氣不及與陷不起血不及漿毒不附凡
痘色淡白頂不堅實何指不起脹皆屬氣虛大宜
保元倍加酒炒黃耆肉桂川芎丁香人乳好酒同服
根窠不紅或紅而散亂以手摸過即轉白者上如寒
毛豎起枯澀不活者皆血虛也宜保元加川芎當歸
酒洗紅花及下山查以消參耆之滯再下木香數分
以行滯氣而血自活也凡用黃耆當在痘盡出之後
熱藥當在毒盡解之時又察氣血虛實而治之
無不効矣凡補血首尾用地黃防滯血必用酒

用芍藥恐酸寒伐胃氣必用酒炒

痘證調元要論 痘證以元氣為主元氣充實則毒易出
易化也故治痘者惟保元氣於虛弱之前使不致於
耗散然豈易耳然其治法惟何一曰實腠理而固肌表
二曰節飲食而保脾土肌表固則外陷之患不足慮
脾土實則下陷之患不足憂更加以參耆補益之功
則元氣自然充實而痘之出也自然易以成漿變證
不生而結靨順候矣是以禁用寒涼蕩滌之劑如大
黃滑石車前生地鼠粘紫草枳殼之類恐其蕩滌腸
下遂傷脾胃脾胃傷則元氣由此而下陷氣脫內攻

而死勢所必至也又不可發散之過也宜用溫潤發散之劑
如鼠粘人牙蟬退麻黃乾葛升麻紫草桔梗羌活防
風荊芥之類恐其發散太過遂致表虛表一虛則元
氣由此而外耗塌癢外剝命由此喪邪之過歟

虛證補氣不補血 虛弱痘證精神倦怠面青㿠白益
氣不充則精神倦怠血不榮則面青㿠白今治虛證
補氣不補血者何也氣有神而無形補之則易充血
有形而無神補血之藥難收速効況氣陽而血陰陰
從陽血從氣者理也故補氣不補血使氣盛而充則
血自隨而亦盛矣況補血之劑如當歸生地皆能潤

滑腸下多用恐致溏泄故耳然虛證痘疹亦有白陷
不榮不得已而用當歸芍藥補血之劑亦有虛火外
浮痘點紫紅而類於血熱之證不得已而用紫草紅
花生地活血涼血之藥並用酒炒以折其潤下之性
借酒力而行之達表則補血活血之中而行升發達
表之妙庶無潤腸溏泄之患矣

虛證壞勢必至辨 氣虛痘證初發身熱悠悠乍熱乍
涼肌慢神倦面青㿠白飲食減少手足時冷時熱嘔
吐便溏痘點方見隱隱不振淡紅皮薄三四日陸續
不齊不易長大五六日不易成漿少食氣餒好食易

泄七八日塌陷灰白不起自汗微渴或腹脹喘渴泄
瀉塌癢悶亂咬牙寒戰頭温足冷勞所必至故治虛
痘初發之際不宜投參耆飲人參敗毒散黄連解毒
湯升麻葛根湯紫草三豆飲當用參耆飲氣麤皮燥
無潤色亦忌之只以四君子減人參少加桔梗川芎
腹皮補益之中略佐以升提之法爲妙然于川芎蓮
用參耆及至八九日間無他症添用法如常若或頂
陷灰白不起漿清自汗微渴大補湯加桂塌陷灰白
腹脹泄瀉木香散塌癢悶亂腹脹渴瀉喘嗽頭温足
冷寒戰咬牙者急進異攻散救之

虛證變實 氣虛痘證父母能守禁忌及用藥不誤調
變順候則元氣充實腠理堅固脾胃強健飲食如常
二便清調矣若補益太過漿足之後重用參耆者亦
有腹脹喘急之患用枳殼湯倶用五苓木通多則有
大便秘塞之患用寬中散使實而渴麥門冬湯過用
丁桂辛熱之劑則亦有咽喉腫痛煩躁閉渴之變茲
陰潤燥湯益喘急腹脹大便秘堅煩渴咽痛皆類實
證也然而氣虛變實者非真實也是病淺而用藥過
深之失也只宜斟酌不宜疎通重治疎利之過則方
生之氣復虛而脫證將至矣

實證似虛 痘本亦實證或爲飲食生冷、調理失宜故傷
脾胃遂成泄瀉津液下陷虛火上炎必發而爲渴元
氣下陷則虛陽上擁下氣不續必發而爲喘夫渴與
喘實證也起於泄瀉之後則爲津液暴亡而渴氣虛
而喘豈有實熱而渴氣壅而喘生於泄瀉之後哉故
治渴則用參苓白朮木香散渴瀉不止異攻散喘則
用人參定喘湯獨參香仁湯喘渴而泄木香異攻散
悶亂腹脹毒成内攻眼合自語已名失志譫語爲實
將何愳哉

[illegible] 身發壯熱毛直皮燥睡卧不寧腮紅臉赤
氣麤煩渴腹脹便秘喘急皆實證也此熱盛毒重壅
遏之故而又見嘔吐之證嘔吐似虛也然未知熱毒
在内不得伸越則上逆攻衝而吐經云諸逆攻衝皆
屬於火者是也或爲寒冷所搏或因乳食不節致傷
風冷則使内熱不得發越冷熱相拒而吐毒不得伸
越者從升陽發散爲最相拒而吐者引之使下如豬
苓澤瀉橘皮之類又有泄瀉之證兼見者泄瀉似虛
也然因熱毒鬱蒸煩炙脾胃不得外進則毒從下陷
尋竅而泄所謂熱毒下注者是也古云未出而瀉者
生既出而瀉若死深可見矣治法以升提發散引毒

逹表尚得外解則以泄自止兼傷食而瀉者輕則用消化之劑重則從之又有不思飲食書云不思飲食皆屬內虛者是矣然不知鬱熱之證蓋因毒氣在內不得伸越逹於肌表二便秘結腠理阻塞熱毒壅盛腹脹滿悶不思飲食者必然之勢也治法以升提發散引毒逹表則熱氣有所伸越而臟腑和平飲食自進矣若悮用丁桂半夏等熱藥於嘔吐泄瀉不食之證是以熱攻熱而轉增煩亂用人參黃耆茯苓白朮等補劑於腹脹不思飲食之證則邪得補而愈盛藥一入口立見殺人醫之過也可不慎歟他如龍骨荳蔻雖能止泄神麴麥芽硼砂雖能助脾化食皆不當用於壅熱不食之證總于業者察之

熱證變虛 血熱痘證只宜清凉發散不宜峻用苦寒若過投寒劑如升麻芩連及消泄之藥必致內傷脾胃外冰肌肉脾胃傷輕則飲食減而溏泄重則洞泄無度而遂致虛寒肌肉冰則熱毒之氣不行腠理閉澁痘不肥大不起發不行漿而遂成伏陷此熱證變虛之驗虛證既明便從虛治參芪丁桂亦所不忌五六日後見之則木香異攻在所宜施惟在審證而斟酌之也

表熱變虛 毒盛非過用升提發散為主而佐以清凉解毒為當又宜得中乃止若發散太過必致肌表空虛元氣耗散內則清漿或虛擡空殼或癢塌外剝或潰爛不收百變皆至見此數端皆成表虛表既虛則元氣從此耗泄而內氣亦不能以自守略傷飲食或生冷則成泄瀉泄瀉不止遂成虛寒而氣脫煩渴悶亂寒戰咬牙無所不至矣既知虛證治從虛例參耆白朮丁桂薑附亦所不忌六七日後見之雖木香異攻亦宜急進在察證而酌量之也

實熱用異攻辨 實熱壅遏之證多用寒凉致冰伏泄瀉或藥太過或成表虛既成冰便藥宜溫和薑桂之熱亦所不忌泄瀉之後熱氣自散真氣自虛既成氣虛藥宜補益氣虛必寒虛寒既明藥宜溫補是以始出之時雖為血熱壅遏至於三四日後身反不熱肌膚冰冷痘瘡不長焉得不進以溫和之劑如官桂乾薑川芎之類使內氣一煖則外氣自和泄瀉之後其內必虛雖有腹脹煩渴喘急皆得從為實熱不過內虛伏陷毒成內攻而然故實熱之證七八九日曾經泄瀉皆從虛治有木香異攻之證使進木香異攻為貴如無冰便之證切勿悮投溫劑無泄瀉之證勿徑

檳榔木香異功等倒靨乾枯而無水硬泄瀉之患者多因熱毒內攻而然故宜百祥豬尾等方以治之可也

陰陽

痘出有三陽三陰之異常宜辨之勿令誤也　太陽病寒身熱小便赤澀出不快宜荊芥甘草防風湯　陽明病午寒午熱出不快宜連翹防風湯　陽明病目赤大便閉實瘡痛肌肉出不快宜升麻葛根湯加紫草　太陰病自利四肢逆冷宜附子理中湯木香散　少陰病黑陷口舌乾燥宜四物湯加紫草紅花　厥陰病卵縮舌卷時發厥逆宜大異功散加防風青皮　三陰病法當救裏故宜以溫劑助之

辨三陽證治

足脛熱　兩腮紅　大便秘　小便澀　渴不止
上氣急　脈洪數　已上七證不宜服熱藥

瘡疹一發有密如蠶種者或如糠粃者合清表宜連翹升麻湯　或未出而先發搐是兼外感風寒之邪宜茶湯下解毒丸及犀角地黃湯失血　瘡出不快清便自調知其在表當微發散升麻葛根湯　若瘡已乾黑陷身不大熱大小便澀滯是熱蓄於內宜煎大黃湯下宣風散　若表大熱者不可下　黑陷甚者百祥丸　若瘡已發稠密微喘渴欲飲水宜微下之當歸丸及龐氏地黃膏外以黃檗膏塗面　但瘡發身熱正熾適瘡大發煩渴大便實者宜玉露散　及甘露飲子　或昏冒不知人時作搐搦瘡倒靨黑陷者宜豬心龍腦膏

三陰證治

足脛冷　腹虛脹　糞青色　面㿠白　嘔乳食
目睛青　脈沉微　已上七證不宜服寒藥

痘瘡盛出四肢逆冷或自利係在太陰脾經宜急溫之用異功散附子理中湯調中丸　痘瘡平塌灰白色不澤此是正氣不足宜十補托裏散倍黃耆加熱附子　或四肢厥冷時作搐搦係在厥陰宜溫之異功散加防風青皮或白朮散去乾葛藿香加附子肉桂

痘瘡證有陽盛陰虛有陰盛陽虛陽盛者飲冰雪不知寒陰盛者飲沸湯不知熱凡發熱作渴手足逆冷大便自利者此熱湯皆陰盛陽虛也錢氏用大異功

散快[?]八味丸治之若發熱作渴而大便秘結手足
並熱喜飲冷水皆腸胃陰虛也薛氏用四順飲熱地
黃丸[?]治之若煩熱作渴面赤睛白此爲腎經虛熱
亦宜地黃丸之類陳文中治陰盛陽虛用大異功散
加木香當歸以補陽是究治陽虛陰虛用木香散加
丁香官桂以補陰不爲以火濟火乎此陳氏方所以
爲一偏之術而見譏於前哲也學者不察而誤用之
夭枉可勝道哉

形氣

凡瘄疹已出後有聲音者乃形病而氣不病也身溫
者宜解毒防風湯大便閉者宜當歸丸便秘 瘄疹
不出先聲音不出者乃形不病而氣病也宜補肺散
加生黃者 若瘄疹出而聲音不出者是形氣俱
病也小兒稟賦素弱者宜預服十奇散即十宜散倍
歸芎少木香煎服或云宜十奇散或云大異功散或云形氣俱病者宜清其肺宜入風湯
并涼膈散去硝黃主之

辨形氣不足法

肺主氣氣不足則致後三證
自汗聲不出　瘄頂陷塌　不綻肥
並宜十奇散

心主血血不足則致後二證
灰白色　根窠不紅　不光澤
一並宜芎歸湯加芍藥紫草紅花良驗

輕重

經凡瘄疹若出辨形輕重若一發便出盡者必重也
瘄夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外
黑裏白者微重也外白裏黑者大重也瘄端裏黑如
鍼孔者勢劇也青乾黑陷昏睡汗出不止煩躁熱渴
又腹脹啼喘大小便不通者困也凡瘄疹當乳母愼口
不令饑及受風寒必歸腎變黑難治　海或熱極
反作水化者亦能變黑當以涼藥主之不可不察以
於別之可也或有出色正者內表有熱頭反陷色或
灰青似黑中有鍼眼下陷當急以消涼藥疎之便結
者大黃牽牛之類便軟者令化丸之類主之
陳輕者作三次出　大小不一等　頭面稀少一眼
中無　根窠紅　肥滿光澤
重者一齊並出　密如蠶種　身熱腹脹　瘄灰白
色　稠密無縫　瀉渴不止　頭溫足冷
輕變重　犯房室　不忌口　先曾瀉　飲冷水

重變輕　避風寒　常和煖　大便稠　不燥渴
忌生冷　忌外人
右飲冷水餌涼藥若內有實熱者不須忌之
二日三日痘瘡始見[illegible]如粟米大或如黍米
大或如菉豆大似水珠光澤明淨者佳不須服藥
四日五日痘瘡大小不等根窠紅活光澤明淨者輕
如稠密陷頂灰白色瀉渴者重
六日七日痘瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促口乾腹
脹足指冷者重
八日九日痘瘡長足肥滿蒼蠟色者輕如寒戰咬牙

腹脹煩渴氣急咬牙者至重也
十日十一日痘瘡當靨瘡痂欲落而愈如身熱[illegible]
腹脹泄瀉寒戰咬牙者重
輕痘歌　熱緩神清痘小稀　根窠紅活出參差　四
肢溫煖無寒熱　乳食如常渴瀉除　太陽向類俱光潤
手足驟稀圓似珠　更兼腰項當心少　但宜調護不須
醫
重痘歌　初熱一日即便出　稠密鮮紅滅飲食　泄瀉
煩渴頭面多　紅斑夾疹二便澀　平凹灰白欠光明　疔
毒臟瘡水流黑　若此重證急須防　莫待臨期有缺失

圖古人云[illegible]指出稀者裏外肥紅
者人見其輕遂生怠忽之心不避風寒不節飲食不
慎禁戒不擇醫巫以致感風寒則生外熱傷飲食則
生內熱熱蒸[illegible]或翻出瘡疔[illegible]稠密者或痘後目盲
發癰者或腹脹或煩躁或吐利犯禁戒則為痘瘡為
潰爛醫之誤則補所不當補瀉所不當瀉此之謂則
咒水灑之以傷其表參之飲水以傷其裏往往變為
重疾歸之氣數抑何愚哉重者指出密者外黑裏赤
者外白裏黑者能存憂懼之心適寒溫慎飲食禁戒
必守醫巫必擇自然易發易靨能變為輕非人能勝
天乎

辨不藥而愈
痘腳稀疎　根窠紅綻　不瀉不渴
乳食不減　四肢溫和　身無大熱
已上六證並不須服藥惟宜常加調護須使房室
溫煖屏諸穢氣忌見外人毋犯房色及往來婦人
月水并腋臭者皆不可近惟宜燒人黃着术以辟
惡氣勿宜燒沉檀降真乳香腦麝床帳之內宜懸
胡荽或以胡荽酒噴床帳併燒木香為佳夫痘
瘡之病最怕穢惡之氣觸犯切不可信僧道看經

解穢況無穢氣之人而返恐被其穢惡之氣觸犯
亦不可恃其能解而不預防戒之戒之

辨五不治證

癢塌寒戰咬牙渴不止　痘紫黑色喘渴不寧
灰白色陷頂腹脹　頭溫足冷悶亂飲水
氣促泄瀉渴

順逆

大抵瘡疹屬陽出則爲順故春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑陷秋癍子冬疹子亦不順也　凡瘡疹只出一般者善　先發膿疱後發疹子者順　先發水疱後發疹子者逆　先發膿疱後水疱多者順少者逆　先發水疱後發癍子多者逆少者順　先發疹子後發癍子者順　先發膿疱後發癍子者逆（此痘一證向云足以知雜出者諸蒸皆合而不能此然亦向前鑑云五色各從五臟亦有二色相合或有三色卻無定也此與前後膿疱瘡疹人小不同先後逆順大略之說者）

瘡疹既出而有逆順者三有時之順逆有虛實之順逆有出入之順逆蓋春夏陽氣發生瘡疹爲順秋冬陽氣伏藏瘡疹爲逆此時之順逆也大小便閉而能食者爲實爲順大小便利而不能食者爲虛爲逆此虛實之順逆也瘡疹出者爲順倒靨伏者爲逆此出入之順逆也

春夏爲順秋冬爲逆此亦論其生長收藏之理爾豈有春夏皆順而吉秋冬皆逆而凶者乎如春失本生夏失本長則春夏亦逆秋能發收冬能伏藏則秋冬亦順也惟痘出一般與時得所不悖其則時之順也若出夾雜帶癍帶疹錯雜無統常失其則時之逆也然春夏爲順秋冬爲逆古人之言豈真拘拘於時令之說耶蓋春夏發生之令也秋冬殺伐之令也痘瘡之出起發者得春夏之令所以爲順陷伏者得秋冬之令所以爲逆其斯之謂歟或云春膿疱（金克木）夏黑陷（水克火）秋癍（火克金）冬疹（土克水）爲之逆者此不經之談黑陷一證四時不治何但在夏邪故非其時而有是證者氣血和平臟腑充實其不皆順如其時而有是證者氣衰血弱臟腑虛怯者其不皆逆　古人著書有泛論其常者有直道其實者以意逆志不以詞害意可也錢氏小方脈之祖醫中之聖無出其右者宜若所著之論宜無可議矣然亦有未可盡信者或泛論其常或後人補之者也如云先發膿疱後發疹子者順肝肺相生也先疹子後癍子者順心肝相生也先發水疱後發疹子者逆肝剋脾也先發膿疱後發

痲子者逆心尅肺也先發膿疱後發水疱多者順少者逆肝多肺少木乘金衰也先水疱後痲子多者逆少者順子衰母旺則順火衰木衰則逆也此皆泛語其槩耳其曰凡瘡疹只出一般者善此則而道其實者也夫四毒之發各有其時膿疱最酷疹次之水疱又次之痲爲輕分作四番其出則微併夾出其毒則甚矣如云春夏爲順秋冬爲逆春膿疱金尅木也夏黑陷水尅火也秋痲子火尅金也冬疹子土尅水也此亦泛論其槩耳其曰黑者無問何時十難救其一二此則而道其實者也蓋四者之毒常乘天地不

正之令而發乃疫癘之氣傳染相似時亦不得主之也又云冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑此則後人因秋冬爲逆而杜撰以補之者也錢氏謂春夏爲順秋冬爲逆者蓋以瘡疹屬陽春夏爲陽秋冬爲陰從其氣則順逆其氣則逆不過欲人常和煖而從春夏之化未嘗拘定其證必其時爲順也假如冬月變黑之説則凡冬月出瘡疹者不分輕重皆變黑而死夭地之氣必不如是之酷錢氏之意亦不如是之拘也但日冬盛寒腠理閉塞氣血凝滯非和煖瘡難成就可也何必以逆黑爲言猶拘於冬乎彼夏盛熱腠理開張氣血流滯亦有變黑歸腎而死者今云夏月腠理閉乎故云夏火旺腎不主事則夏黑陷爲逆之言又何自而取乎況黑陷爲逆四時皆然亦不獨在於夏也

動靜

凡物得其平則靜失其平則動經曰陽氣者靜則養神柔則養筋又曰陰氣者靜則神藏躁則消亡夫患痘者陰陽俱病息欲其少靜欲其少寒欲其定靜欲其寧饑則索食渴則求飲觸其瘡則吟拂其欲則鳴此乎人之候神清氣定謂之靜而吉也如呻者身有

苦也自語者神不清也喘急者內熱也腸鳴者泄也坐臥不定者心煩也啼叫不止者痛也搖頭者風也指欲搔者痒也啣物難者咽痛也咬牙者心肝熱也者悶亂躁擾譫妄昏眠如見鬼狀搖頭扭項手舞足擲目睛上翻寒戰咬牙語音不出則皆死候矣如痲向靜忽作擾動者異也以法求之如痘色變無他候者此疾氣所觸也如痘色不變又無他證此必有因但候自定其有目瞑息微四肢僵直口噤瘡壞昏睡不醒者此真氣將脫魂魄欲離之兆又不可作靜診也

形色

或云痘瘡之候無以脉診言形色可辨也謂之形者痘之形也故尖圓堅厚始出之形發榮滋長欲壯之形飽滿充足成漿之形斂束完固收靨之形與大豆䝁豆菉豆相似者皆正形也或平或陷形之變也如初出時空若蠶種之蛻隱如蚊蚤之迹薄如麩片密如鍼頭若熱之痱甚之粟者不一起發而死粘聚模糊肌肉虛浮溶軟嫩薄皮膚潰爛者不能收靨而死謂之色者痘之色也喜鮮明而惡昏暗喜潤澤而惡乾枯喜蒼蠟而惡嬌嫩紅不欲豔豔則易破白不欲

灰灰則難靨由紅而白白而黃黃而黑者此出形起發成漿結痂之正色也出形而帶紫起發而灰白此色之變能辨痘之形色可知死生之期

先賢看痘有四曰根曰窠曰脚曰地用是以驗吉凶斷死生不易之法也何謂窠中透而起頂者是也何謂根外圈而紅者是也即圈之紅否而其中之虛實與痘毒之淺深可見矣即窠之起否而根之淺深氣血之盈虧可定矣所謂脚地則本乎根窠之圓混痘子之稀密也紅暈之處謂之脚彼此顆粒界限分明不散不雜者此痘脚則淨也空隙之處便謂之地彼此顆粒不相連綴者此地面明淨也根欲其活窠欲其起脚欲其固地欲其寬四者俱順痘雖密無慮矣

圓者氣之形也氣盛則痘窠必圓滿周淨暈者血之形也血盛則痘窠必光明紅活氣虛則頂陷氣散則塌匾或有氣虛極而不塌陷者乃火載之雖見圓滿實空殼如泡然也血虛則淡血憊則暈枯根必散或有血虛極而猶紅色者乃火上浮雖見圈暈實乾枯而不潤澤也　痘色之明暗係於血氣之虛實也之紅者痘初出也白者毒未解也黃者毒將解黃者毒盡解也灰白者氣衰而血不附也紫者

血而血滯也黑者熱極而兼水化也焦褐者氣血枯也紅變白白變黃者順而生紅變紫紫變黑者逆而死

初驗之時以紅紙蘸清油燃火照之驗其生意有無又以手指摩面頰如紅色隨手轉白隨白轉紅謂之血活生意在矣如指之不白舉之不紅是為血枯縱疎不治又看目睛神光瞭然口唇尖上紅活如常無燥白之色乃為吉兆苟無變也

疎密

痘欲其疎疎則毒少不欲其密密則毒甚此古今確

論也疎密之分各有喜忌如頭面欲疎元首不可犯也頸項欲疎管籥不可塞也胸背欲疎臓腑俞募之所附也若夫手足不忌其密矣謂之疎者非但稀少也鋪排磊落大小勻淨亦可以言疎謂之密者非必多也攢聚粘連片段一片雖只數處亦可以言密其痘出而者亦有數等如初出時纔見紅點三兩處其熱便退可以語其疎也若大熱不解唇口燥裂大小便秘煩躁不寧或身無熱但增煩渴者此由毒甚遏於中不能遽出曰復漸出漸加稠密一也又如初出一兩點頂尖焦黑或三四粒作一堆者僅見數處

他無所出喜睡不食煩渴大小便澀此由毒伏於中加驚妄者不待起發而死若能起發後必發癰毒也二也亦有出現實疎遂生玩忽之心禁忌不守風寒不避飲食所傷湯丸之試變生不測三也設有密而吉者治之早衛之嚴果無病而痘悉成也

老嫩

嘗觀朝華之草夕而零落松栢之堅凌冬不衰夫以草木堅脆不同堅者難壞脆者易傷況於人質有厚薄氣有強弱邪彼痘疹之毒喜老而惡嫩蒼蠟嬌紅色之老嫩也緊實浮虛形之老嫩也濃濁清淡漿之老嫩也堅厚軟薄肉之老嫩也老嫩之故衛氣主之經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也是故衛氣強則分肉堅皮膚厚腠理密而開闔得也所以收斂禁束制其毒而使不得以放肆故色蒼而蠟形緊而實漿濃而濁肉厚而堅自然易壯易靨雖有邪風穢毒不能害也如衛氣弱則分肉脆皮膚薄腠理疎而開闔失也所以不勝其毒而毒得以恣其猖狂之性故色嬌而紅形虛而浮漿清而淡肉軟而薄易破難靨不待邪風穢氣而先敗壞矣觀夫痘之老嫩則氣不可不養也

乾濕

丹溪云痘乾者宜退火濕者宜瀉濕 退火止用輕劑荊芥升麻葛根連翹之類 瀉濕乃肌表間濕宜用風藥防風白芷之類 痘初起時自汗不妨蓋濕熱熏蒸而起故也

榮枯

夫物濕則潤澤燥則乾枯榮枯之分血實主之故血者所以營陰陽濡皮毛流關節也痘本疎者血不在多而易充足痘本稠者貴乎血之有餘矣苟血有餘則經脉流行徧於肌肉浹於皮毛灌溉滋潤肥澤長

表自然形色俱世根窠紅活也如血不足則經脈壅過窠囊空虛黑燥而不光明也枯萎而不肥澤也皮膚皴揭而啓裂也經曰諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥又曰燥勝則乾由其人血常不足加之以毒火薰灼反兼燥金之化精血並竭是以有此證也法宜活血養液散熱解毒清金潤燥則乾涸可回觀夫痘之榮枯而得養血之理其或濕氣太過痘本浸淫犯之則破潰糜爛難靨者此又火極而兼水化也脾強則生脾弱則死

標本

痘有標本治有先後有從標者有從本者有先標後本者有先本後標者有標本兼治者視其急緩不可膠柱而鼓瑟也痘疹之候自人身而言氣血爲本痘疹爲標自痘疹而言痘疹爲本別證爲標如痘子稠密在標之病也由其氣之不匀血之不周以匀氣活血兼行解毒此則標本兼治也痘若起發或虛者補其氣血或虛者補其血此緩則治其本也氣血充實痘或雍遏者單行托裏解毒之劑此急則治其標也痘勢太甚咽喉腫痛者以治咽喉爲主此急則治其標也痘勢太甚自利不止者以自利爲主此急則治其標也利久不止漸成壞證救裏發表兼而行之此亦標本兼治也先攻其裏後攻其表此則先標後本也大小便秘煩躁喘呼者急利之此急則治其標也痘勢太甚煩渴不止以解毒爲主兼治其渴此先本而後標也凡此之類擴而充之以盡其餘則治不紊矣

始終

治痘之法貴乎謹之於始而慮其所終庶無後日之悔經曰上工治未病中工治將病下工治已病未病施治十全八九治將病者十全四五治已病者功莫

能施發熱之初大熱渴煩大便秘腹痛腰痛鼻乾脣焦燥譫妄此毒氣鬱遏於內即當防其伏而不出也吐瀉不止即防其中氣虛弱不能助痘成就或變倒陷也故熱則解之便秘則利之逆則平之吐利則止之且如初出一點血此春之氣發生之令也至於起發此夏之氣長養之令也木化爲漿此秋之氣成實之令也靨乾結痂此冬之氣閉藏之令也初出而便有水將發而便成漿靨未成而便收靨此未至而至謂之太過必有陷伏發未托裏解毒切不可緩應出不出應起不起應收不收此至而不至謂之不及

必責以氣聚血發此氣活血解毒之法不可不急
施也又如初出色艷者皮嫩皮嫩則易破當防其癢
塌也相聚成塊者不可制之毋此有伏也殼空無水
者後必發癰頭面預腫者防其易消而倒陷咽痛者
急解之防其失聲嗆喉也中多水泡者後必自利目
澀淚出者防其有膚翳也頻更衣者防其倒陷癢破
不結痂此倒靨也竟夫云與其病後纔服藥孰若病
前能自防其此之謂歟

指南云氣色白也血色紅也痘毒初出之際血氣未
定吉凶未兆而紅白之形色未分見於腮耳口鼻年

壽之間一點淡紅而已既而其中稍有微白而外則
淡紅如故也至此而吉凶已判矣既而根窠圓混而
其中之白漸大而外之淡紅漸細至此吉凶悔吝之
機著矣既而其痘形色尖圓光澤中之白色遂充而
外之紅暈漸細痘至於此始有成漿之意其中白色
略帶微黃而又紅活也進而五六日之中內之白色
雖將變黃猶未離於紅白之間也外之紅圈雖將漸
細而尚未至於微也進而六日七日則中之白色變
而純黃猶未至於老也外附紅暈微有一線紅潤光
潔之色而已既而八日九日之中則痘成漿圓潔飽

滿者黃色而[illegible]紅暈至此氣血順序治定功成矣至
十一十二日漸見乾[illegible]或如青痘色氣血平復之時
也雖然猶有倒靨之[illegible]不可忽也至十二十三日乾
黃皮皺而成老靨自頭面而及手足者順也自手足
而及頭面者逆也至十三四日則痂老而[illegible]矣然
猶有[illegible]眼紅
而[illegible]心煩口渴者有矣[illegible]心者有矣[illegible]
而後發[illegible]者有矣身熱不退口生瘡舌生
白胎者有矣或四肢發[illegible]或發疔腫者有矣眼生白
障或眼露白睛者有矣痘雖平復靨[illegible]自由焉得以

靨老而不知防乎靨老脫卸光潔治痘若愈矣然猶
未也靨落而[illegible]有矣有經月之餘而猶發寒熱
者有矣或生流注瘡癰或身生疥癩或發渴狂煩或喘
渴不寧痂雖脫落餘毒相仍死生未可保也治痘者
又可以痂落為平安哉

日數

[illegible]不可拘以日數有熱二日
而成[illegible]八七日[illegible]者有十日餘日[illegible]
者[illegible]之後長成[illegible]
[illegible]中尚有紅[illegible]點[illegible]

則又不可拘以日數待其成作血泡為痲血泡七日結膿窠此乃榮衛調和內外無諸感冒方能如期且如血泡正作之際遇天冷寒着燥濕風不節氣候與宜因而遲速失序亦不可拘以日數但以紅點皆為血泡日為痘若用血泡七日病人氣虛尚有紅點未能皆成血泡者為毒氣猶盛而不斂急用豬尾膏則隨時結痂兆矣 論世俗謂幾日發熱幾日出形幾日起發幾日作漿幾日收靨此大略之言耳痘有疏密毒有微甚人有虛實豈可一切拘以日數如痘本疏者其毒微其人中氣實又能食自然易出易靨固

不待於旬日者如痘本密者其毒甚其人中氣實又能食榮衛調和內外無諸傷犯至十二三日可以刻期收靨也若其人中氣虛食少或內外曾有傷犯或遇氣候乖變因而難靨豈可必拘以日數哉

禁忌

聞人氏云稟氣實者夏酷暑而不甚畏熱冬嚴寒而不甚畏冷稟氣怯者易寒易熱天寒陰雨則感寒濕而濡瀉天氣稍炎則伏熱而中暍是故先知節候者能辨陰陽寒暑之盛衰經云陽盛人耐冬不耐夏陰盛人耐夏不耐冬此亦知人稟受之不同且自立夏氣後純陽盛物盛大治藥者用熱遠熱如桂枝麻黃之輩必加知母升麻石膏等服之立冬氣合純陰治藥者用寒遠寒如用諸涼藥中病即止不必盡劑又如冬溫煖則虛者安而實者病夏寒涼則實者安而虛者病冬溫煖夏寒涼非節之氣來驟而去速在人將攝之如何爾 如天大寒益覆常宜溫煖勿使受寒恐毒氣為寒所觸而不得出也如天大熱不可蓋覆卻宜清涼勿使客熱與毒相併致增煩躁使瘡潰爛也如時有迅雷烈風暴雨之變宜謹幃帳添蓋覆多燒辟穢香以辟一時不正之氣 臥處常要無風

又要通明切忌幽暗夜靜不斷燈火不離親人看守恐要飲食一時得具或有瘙痒與之撫摩恐他人未必盡心如法也

聞人氏云木得桂則枯雌黃遇胡粉則黑柑得脯則壞物之相畏有如此者痘瘡之畏穢惡雜氣其理亦如是也 房中淫泆氣 婦人經候氣 狐臭漏腋氣 醉酒葷穢氣 硫黃蚊藥氣 黴爛蒸濕氣 誤燒油髮氣 溝糞淋灰氣 熬油煎卵氣 一切腥臊氣 五辛之氣 遠行勞帶之氣 以上最宜避忌仍令人謹伺門戶勿令生人輒入勿掃房室勿

動渦歌勿啓濕加勿燒腦點酷烈諸香　仲景云痘
痘欲出之間宜燒蒼术豬甲二物床帳左右前後宜
掛胡荽以酒噴之或燒乳香尤妙蒼朮得香則運
行甚速可使痘毒易出消防中一不如法則淵患踵
至欲出者使之不出已出者倒靨成片甚者痘黑陷
伏加以爛臭痛如刀剜[illegible]其中縱得安者亦
令瘢痕經年黑色或久成疥癩不可不戒　凡痘瘡
初出即當禁戒房事帳中常燒辟穢香令煙不絕更
多燒硬石以水潑之若有觸犯瘡或色變或作癢者
以茵陳熏法解之

辟穢香 灌漿

茵陳熏法 起發

治痘觸變焦紫方
痘觸變焦紫條時喘急起急危絲瓜皮取末蜜調
處甘草地黃湯一服病更起若加煩躁時犀角磨
湯水此是四五朝治觸當如此則若至七八空殼
觸必死禁牢犯觸諸般穢臭糊指絲瓜皮須要霜後牛筋時取來採乾臨用只取皮帶蒂為末

治觸變灰白痘方
痘觸變灰白臭發愈不得附子緊真者合多功愈
特助漿已備前何須良分急迸信[illegible]

痘觸敵扶月[illegible]得全好者無用此方根據不必驗治

治痘被月經觸變方
痘正凶凶幾合漿適為月水正當場不知淨潔相
防護致使花欄條變常月月紅花一樣藥不分枝
葉取煎湯嫩秋煎湯投酒服根枝濃沸活花即來
消時刻還歸正任汝經紅觸滿床

治痘被麝觸癢方
麝香一觸癢難放點點花心盡帶黑椒急把升麻蒼
耳草濃煎慢浴轉明饒內托還須求衛氣參耆歸
芍橘甘遭生地防風蟬脫倍紅花赤豆共成藥辨
赤豆非家種者小豆是生於山谷粒細而扁其色鮮而鎮嵌首飾色極紅美若無以家赤大豆代之

治痘被屍厭觸變方
死屍觸變日香斜痘必沉潛吐沫加速把元荽併
棗艾為筒燒噴正堂家外取辰砂煮蒼醋時時引
呷振欄花雖然屍厭未成病主此依然麗美葩治愚
此症宜元荽和辰砂蒼醋服外燒其方藥而辰砂性沉滯蒼朮燒痘不宜多服者也

治痘被客忤觸變方
客忤相侵似者驚啼號不欲面青絲爪細結合
花者露摘蒸來焙粉成見滑蜜調多少服隨兒大
小要詳明此時莫說絲瓜蒂一寸絲瓜一寸金

治痘被獸驚觸方
痘五六朝正要灌漿食服時候偶爲猫犬諸獸驚嚇而痘隨縮陷或色變爲斜或形沉於底蓋心失其生而血不能以歸輔氣亦協以充托也急服烏能散

烏能散方
烏能散治痘中驚觸係猪猫犬馬形只求遠志菖蒲淨蟬脫須將水洗淨再加醴酒頻頻煮去却菖蒲遠志留爾蟬脫研爲末砂糖調服酒合喻
遠志淨壹兩　菖蒲淨細實者壹兩　和酒煮熟去二味　蟬退焙爲末將藥酒進服再投雞鳴散無不全美者矣

錢氏云凡瘡疹當乳母慎口不可令饑及受風冷　聞人氏云凡人一日不食則饑觸風冷則病況小兒當瘡痘之際正欲賴穀氣以助其內避風寒以護其外苟穀氣虧少風寒侵襲則爲患可勝言哉乳下嬰兒宜常令其母飲食充足居處避風能食童子專令老成耐事人時時管顧雖然事亦貴得其平或者以失饑冒風寒爲戒遂致過飽極煖非徒無益而又害之瘡痘之家宜備知之　陳氏云痘瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水喫亦不宜與蜜紅柿西瓜橘瓜等冷物食之[illegible]　痘瘡欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜等冷物食之或頭溫足指冷或瀉渴氣促亦不可與之　十二日十三日瘡痂已落其瘢猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴亦不宜食炙煿物酸辣五辛有毒之物恐熱毒熏觸眼目多生翳障　海藏云世人徒知憐惜過愛信其俗而不藥病已成而方憂摩無從容無所不從豈知愛之適足以害之惜之適足以棄之始不早治治不全終卒之殞斃勞而無功至是咎醫嗚呼其討亦繆矣

汗下
錢氏云瘡疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發　活人書云小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈數疑似之間只與升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可疎轉此爲大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表尤不可轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤矣[illegible]論雖當在經則可[illegible]腹熱足冷宜以[illegible]之類主之熱當末青[illegible]許氏云上熱下冷傷食也[illegible]惟傷寒一身上熱下冷[illegible]若傷冷不宜

[illegible]感甚乃治之 痘瘡已出不可疎轉出得已定膿血太盛却用疎利亦非也[illegible] 大抵瘡疹首尾皆不可下[illegible] 小兒身熱耳冷咳嗽輒用利藥即害人[illegible] 凡治瘡疹[illegible]令內消決不可輕易轉下[illegible]惟大小便多日不利宜微微利之及痂已落尚有餘熱停留或作驚或作搐搦或成癰宜四順飲下之不特消餘毒亦免生他證累試累驗 每見疹痘者服發表麻黃藥出汗陽氣盡出肌表遂至癍爛厥虛虛則腹痛自利或作寒戰或作陰癇死者多矣 凡瘡疹發見及癍點既生若無內外寒熱虛實者但安養之任其自然則非惟不生他證亦易於調理今人則纔見癍點不顧所蘊輕重惟恐不出用藥表之服以紫草蟬退甚以人齒猴梨併與酒麴凡發無所不試曾不知毒氣過發則一倍變為十倍十瘡合為一瘡名為癍爛九內七竅手足皆有則重者不救輕者為聲啞為目疾為痈爛為閉[illegible]之患又有過用表藥裏無陽氣以應之為虛脫者多矣此妄表之過也大抵瘡疹已出正賴胃氣逆其毒氣而攻其熱者熱

甚則利小便若小便利則心火有所導引雖不用冷藥熱亦自減矣熱輕則解其熱益小熱不解大熱必生小熱而利其小便則慮損氣故但當解熱也利小便之藥導赤散為上解毒之藥如犀角地黃湯獨勝散安癍散如聖散紫草湯犀角飲皆可選用昧者但言瘡疹是熱時進涼劑致胃氣轉虛令兒胸滿腹脹又且下之內虛毒入則殺人甚速此不善下之過也若小兒身寒唇焦內伏熱也脈細而色痿黃或青色皮膚[illegible]口吐青涎者此誤下之證也或裏無蘊熱亦何可下要之治熱以溫涼而行之未至於冷治寒以溫未至熱當從其漸而已 潔古云大凡癍疹首尾皆不可下恐動則生變此謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之解毒須安九藏防風湯是也如大便不秘者須微發之藥宜錢氏方中選而用之如大便過秘宜微利之當歸丸棗變百祥丸是也初知癍疹若使之併出小兒難禁是以別生他證也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若既吐利安可下便宜安裏若不吐瀉者先與安裏藥三五服如能食而大便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用安裏藥一二服末後一服調以微發之藥要之安裏裏之藥

多發表之藥少役則微疎之令邪氣勿壅併而能作
番次出使兒易禁也身溫者順身涼者逆二者宜多
服防風湯和之防風湯方見人出　海藏云假令五日已裏
諸病與瘡疹不能別辨者不可疑作瘡疹必須發之
但各從其所傷應見治之皆不妨瘡出若強發之其
變不可勝數矣前人言首尾俱不可下者爲瘡未顯
於表下則邪氣不得伸越此脈證有表而無裏故禁
首不可下也尾不可下者爲瘡毒已顯於外內無根
蒂大便不實無一切裏證下之則瘡氣逆陷故禁尾
不可下也又言溫煖蓋覆不令通風以瘡未出或身

涼而惡寒或天令寒而惡冷溫煖蓋覆不令通風
瘡若已出身熱天暄何必用蓋覆而不使之通風
乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令通風不
知天令之所加人身之所感致使悞人多矣大抵前
人之言隨時應變後之人不知其變故常執而不移
也噫首尾俱不可下者以其始終臟腑元無凝滯也
若有一切裏證及大便結者安得不下溫煖不使之
通風以其發在冬時故如此也若發在夏時瘡雖未
出亦不用此也瘡之用藥大率以脈爲主浮中沉之
診下與發之候察其虛實定其中外則可以萬全矣

爲人之治瘡者曰首尾不可汗下聽者和之曰瘡
宜溫補汗下不可也此亦喜補惡攻之遺弊殊不知
治瘡之法莫要於解毒或攻或補務使毒氣得解而
已如其氣血和暢榮衛流通表裏無邪其出則盡其
發則透其收則時非但不可汗下雖溫補亦不可用
也設使外感風寒約束皮膚閉密腠理瘡出不快此
當汗之令陰陽和榮衛通而瘡易出毒得解散可也
苟不汗之則毒無從得出留伏於內未免閉門留寇
之禍矣如大熱不退煩渴轉增譫妄昏沉便溺阻塞
此毒畜於腸胃之間與穀氣併宜急下之使臟腑疎

通陳莝滌去可也苟不下之則臟渣畜毒煎熬於中
寧無養虎遺患之悔乎故大要曰謹守病機各司其
屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五
勝疎其血氣令其條達而致和平此之謂也

證治大法

錢氏法瘡疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發
受風冷海藏云溫平藥者非謂荊芥薄荷防風牛蒡子甘草之類治人求於千湯與潔古解毒防風湯相兼選用是也丹溪云鼠粘子連翹山查甘草此四味瘡疹始終必用之藥　診睚親
宮中十大王瘡疹云瘡疹始終出未有他證不可下
但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如瘡疹三

日不出或出不快則微發之（[illegible]）如瘡發後不多
出即加藥（如一日一服即加至二服）加藥不出則大發之（升麻葛根湯防風
羌活獨活荊芥黃桂枝之類）如發後不多及脈平無他證即瘡本稀不
可更發也有大熱者當利小便小熱者當解毒（[illegible]）
（[illegible]）若不快勿發勿下攻止用抱龍丸治之瘡疹若
起能食者大黃丸下一二行即止有大熱者當利小
便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不
黑者慎勿下身熱煩躁腹滿而喘大小便澀面赤悶
亂大吐此當利小便不瘥者宣風散下之也若五七
日[illegible]不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痂也

宣風散導之用生犀角磨汁解之使熱不生必著
痂矣

錢氏法 潔古論曰斑疹之病其為證各異瘡發焮
腫於外屬少陽三焦相火也謂之斑小紅靨行皮膚
中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯斑疹若自吐
瀉者不可妄治而多吉謂邪氣上下皆出也大凡斑
疹首尾皆不可下（[illegible]）

安裏解毒防風湯

防風（去蘆） 地骨皮 黃耆

芍藥 荊芥 枳殼

鼠粘子

右為末水煎四五錢服若能食而大便實宜當歸
丸微利之

當歸丸（[illegible]）

消毒救苦湯 治斑證悉具消化便令不出若已
出稀者再不生斑十一月立此方隨四時加減惟
通造化明藥性者能之

麻黃根 羌活 防風

升麻 黃蘗（酒炒各五分） 柴胡

川芎 細辛 藁本

葛根 黃芩（酒炒） 蒼朮（各二分）

黃連 歸身（各[illegible]） 蘇木

白朮 甘草（[illegible]） 橘皮（各一分）

吳茱萸（半分） 紅花（[illegible]） 連翹（[illegible]）

生地黃（[illegible]）

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱
服斑疹者因內傷必出斑乃榮氣逆故也大禁牽
牛巴豆峻藥宜半夏枳實大黃益智仁之類去漏
止吐若耳尖冷呵欠睡驚嚏噴眼澀知必出斑也
宜

升麻　葛根　白芍藥
甘草　歸身　連翹各等分
右㕮咀水煎服此一定法也後隨證加減
如肺出膿痂先顯喘嗽或氣喘而喘促少加人參
黃芩以瀉伏火而補元氣　如心出小紅斑必先
見噓乾驚悸身熱肌肉腫脉弦洪少加黃連　如
命門出癮疹必先骨痛身熱其疼痛不敢動搖少
加生地黃藥　諸斑疹皆為陰證瘡皆因內傷乳
食脾胃不足榮氣逆行雖火勢內熾陰覆其外故
錢氏製四物升麻湯發之如有傳變證依加減法
服之

世如疹痘則發於脾宜陳氏人參清膈散疹者皮膚隱隱如麻名曰麻子　水疱者多因傷寒熱毒而發宜升麻散及羌
活散
丹溪分氣血虛實　丹小兒痘疹分氣血虛實以四君
四物酒炒芩連等服之　氣虛者參朮加解毒藥　血
虛四物加解毒藥　暖加解毒藥者酒炒芩連是也
海藏云解毒者三黃湯金花丸之類
痘疹分人之清濁就形氣上取勇怯　痘瘡紫屬血
熱凉血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白色
起遲者則補氣中略帶凉血藥
凡痘瘡主治解表和中解毒三法也解表兼發散之
義使邪氣盡出於外不使留伏於中如防風白芷荊
芥穗升麻葛根柴胡桂枝之屬和中專主脾胃兼助
血氣使裏氣常實血氣不弱也養痘瘡而待其成不
致癢塌倒陷如黃耆人參川芎紫草當歸木香陳皮之
屬解毒只瀉火凉血清氣使毒邪有制不為正害如
山豆根大力子紫草連翹芩連梔子之屬
翁仲仁分氣虛血熱熱壅三證　凡氣虛之
證初發身熱手足厥冷乍凉乍熱精神倦怠肌肉㿠
白飲食減少四肢倦而睡臥安靜便清自調虛證無
疑未見點前用參耆飲加輕劑發散如紫蘇防風白
芷見點之後用參耆飲加輕劑如川芎桔梗見點四
日之後重用參耆飲隨病加減應治七八日漿足之
後保嬰百補湯調養氣血而已此證未稍塌陷黑靨
者多用木香異攻散收功　凡血熱之證初發身熱
壯盛腮紅臉赤毛焦色枯煩躁渴欲飲水日夜啼哭
睡臥不寧好睡冷處小便赤澀熱證無疑未出之前
升麻葛根湯或升麻流氣飲雖皆可服總不若十神
解毒湯為穩未出至見點三四日後熱證悉平斲將

行漿從太乙保和湯加減八九日漿足之後則有保嬰百補湯調養之此證七八日間有紫黑乾枯及青灰乾黑陷者則有奪命大造談笑博金一字金或百祥牛李豬尾獨神等方皆可斟用惟經泄瀉之後有黑陷乾紅者則從木香異攻散治之此胤宗世業不傳之秘萬試萬中者也　凡熱毒壅遏之證初發身熱壯盛腮紅臉赤毛焦皮燥氣粗喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡臥不寧大便秘結小便赤澁面浮眼脹多啼多怒的係熱毒壅遏未見點時先須升麻葛根湯一服隨服羌活散鬱湯至見點三日之內諸證悉平

勢將行漿則服益元透肌散加減漿足之後服嬰童百補湯調養而已六七日外有紫黑乾枯及青灰乾白陷者則有奪命大造談笑博金一字金百祥牛李豬尾獨神等方皆可斟用惟曾經泄瀉有木香異攻淤則從木香異攻散治之　治虛弱痘證有二法的係氣虛則宜補氣氣虛易寒又宜溫之溫補一法之中酌量輕重處治方為妙用　治血熱壅遏有五法表熱盛則痘必乾枯表太涼則冰伏內熱盛則秘結內太涼則泄瀉氣粗盛則腹脹喘滿熱毒為所抑而不得伸越則腹脹狂亂毒氣彌盛則表裏受重而嬰童難任是故治痘之法在安表和中匀氣透肌解毒五者而已安其表使無乾枯冰伏之患和其中使無便結泄瀉之變匀其氣使無壅盛喘滿之過透其肌使熱毒得以伸越而達表解其毒使內外有所分消五者不失則血熱壅遏之證勢雖猖獗亦不足憂矣

參耆飲 即保元湯　專治元氣虛弱精神倦怠肌肉柔慢面青㿠白飲食少進睡臥寧靜而不振者不分已出未出皆治

人參 壹錢　黃耆 貳錢　甘草 伍分初熱生用出定炙用

湯仁齋謂其能補益元氣更名保元湯蓋為元氣虛弱者立也後世治痘者多主之不分元氣虛實之異槩用於血熱毒壅之證是為以實攻實豈不悞哉右用水一鍾薑一片煎四五分不拘時服

參耆飲加減禁忌法

如前虛證辨認不差以此方為主前後始終皆不可易中間雜證兼見卿或不同要皆氣虛所致則以本方而斟酌加減之毋得過投發散苦寒之劑初熱未出之際只可少濟以開提匀氣之功如桔梗川芎之類漿足之後助以收斂如白术芍藥茯

芩烏梅
出不快加川芎官桂禁用蟬退鼠粘子人牙紫草
小便赤加大腹皮茯苓禁用車前滑石瞿麥山
梔 大便溏加白术茯苓肉果禁用豬苓訶子龍
骨礬石 小便短澀加大腹皮木通禁用滑石瞿
麥 大便實秘加酒炒當歸禁用大黃枳殼生地
泄瀉加白术肉果木香禁用龍骨石脂枯礬
嘔吐加乾薑丁香橘皮禁用半夏 煩渴加麥門
冬葉五味子禁用天花粉葛根烏梅半夏 減
食加白术人參神麴禁用山查砂仁 傷食加神

麴麥芽山查禁用枳實蓬术三稜巴豆大黃 喘
急在三四日前者加桔梗蟬退杏仁 風則微散
之加紫蘇防風枳實 痰則從痰治加杏仁貝母
有虛證見者決非實喘不過是毒不得外達上
乘於肺耳禁用麻黃萊菔蘇子枳殼下氣等藥
六七日後或先曾泄瀉而後氣喘者虛之極也加
人參則喘自止 腹脹加大腹皮厚朴兼發散開
提禁用枳殼萊菔寬中下氣等藥仍觀小便秘與
傷食否亦有傷於生冷或寒氣鬱遏而然從內傷
外感而治 內傷用丁香官桂神麴木香 外感

用防風等藥發散治之 寒戰不熱四五日間手
足厥冷氷硬不起加丁香官桂炙黃耆川芎夏月
減丁香 四肢不起加防風減川芎 漿不足加
白术當歸川芎 灌水泡加白术防風白芷芍藥
灌清漿加白术茯苓 喘嗽加五味子杏仁麥
門冬禁用天花粉桑白皮 發癢加川芎當歸芍
藥白术茯苓禁用殭蠶蒺藜 癢甚外用茵蔯燒
烟熏之禁用沐浴發散之藥恐成氣脫
十神解毒湯 專治身發壯熱腮紅臉赤毛焦色枯
已出未出三日已前痘點煩紅燥渴欲飲睡臥不

寧小便赤澀者此熱盛也並皆治之

當歸尾 生地黃 紅花
牡丹皮 赤芍藥 桔梗
木通 大腹皮 連翹
川芎

此方治血熱痘疹以涼血行血爲主佐以桔梗川
芎有開提發散之功引以大腹皮木通有疏利熱
毒之效臣以連翹牡丹皮有解毒之良用此以治
血熱痘疹則能內外分消熱毒雖盛庶幾解散表
裏[illegible]然和平矣古人用黃連解毒湯恐驟用寒涼

不惟冰伏熱毒反出不快抑且熱毒為其所抑則
鬱於臟腑或肚痛腹脹內潰而死者有之豈若此
方用之為穩當若不得已而用黃連芩檗亦須酒
炒一以製其寒涼之性一以助其上行之勢借連
檗以解毒耳

十神解毒湯加減法

身熱壯盛加葛根前胡　毒盛綿密加荊芥鼠粘
子　渴加天花粉竹葉滑石　小便尿血加犀角
山梔　大便黑加犀角黃連或桃仁　吐血乾嘔
加黃連犀角　發紅斑加犀角黃芩黃檗山梔玄
參　小便赤加山梔　小便短澀加豬苓澤瀉

小便秘加滑石瞿麥　大便秘加枳殼前胡　大
便秘喘加枳殼前胡大黃　煩躁加麥門冬天花
粉　煩渴狂亂譫語加知母麥門冬石膏　嘔吐
加豬苓澤瀉黃連　咽喉痛加甘草鼠粘子荊芥
泄瀉加豬苓澤瀉防風　嘔加橘皮
已上藥用燈心十四根水煎服

血熱痘證熱毒熾盛毒氣無所分消只宜重用
升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄使
熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血涼血

之劑則內外分消毒得以易聚而易化也所
謂解其表而清其內此方參得攻表和中解毒三
法痘瘡誠痘科之神方也用於發熱才清之實者
平之其此方之制敵是故發熱令見點之後三日
以前毒氣未盡達表內外熾盛血熱之證悉具辨
認不差非此以本方處治之切不得下參耆白朮
茯苓補氣之藥於熱證未彰之前如悞而用之是
謂以實攻實腹脹氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌
生瘡變證百出所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉
慎不得用半夏丁桂乾薑木香藿香訶子肉果如

悞而用之則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥證
必至咽疼狂亂失血便秘無所不至矣至於龍骨
枯礬澀滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而閉
之門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒之
及至血疱已成氣血定位頭頂白光勢將行漿又
宜易方另行別議

羌活散鬱湯　專治實熱毒盛鬱遏不得達表氣麤
喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡則不寧大小便秘毛
豎面浮眼張若怒並有呻吟之狀為風寒外搏出不
快者可治

防風　　羌活　　白芷
荊芥　　桔梗　　地骨皮
川芎　　通草　　甘草
紫草　　大腹皮　　鼠粘子

右爲麤散水一鍾燈心十四根煎六分溫服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外爲風寒所抑或肌肉麤厚腠理緊閉肌竅不通經絡阻塞使毒氣不得引達表而發而出則熱毒壅遏於內爲腹脹爲喘急爲秘結爲狂煩爲驚搐爲失血皮燥毛直面慘眼脹睡臥不寧驚啼多哭此熱毒壅遏

之證辨認不差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱毒不壅而其出自易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長桔梗有開提肺氣之能荊芥連翹鼠粘善解鬱熱地骨皮消壅熱於筋骨之間且能清臟腑紫草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所分消用此以治熱壅之證効大而功用極妙若驟用寒涼如芩連升麻之類則熱爲寒氣所抑不得伸越逗遛經絡爲疔爲癰者有之冰伏硬閉者有之至於人參黃耆白朮茯苓溫補之劑誤用則且壅滯禍不旋踵他如丁桂木香荳附之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之初至見點之後並宜以本方處治依後法而加減之

羌活散鬱湯加減法

初發身熱壯盛腮紅面赤毛焦皮燥咳嗽喘急者加升麻　煩渴加天花粉乾葛　腹脹喘急鼻塞面赤若怒毛直及枯加麻黃　便秘加當歸枳殼甚則加大黃　嘔吐加豬苓澤瀉橘皮禁用生薑丁香木香半夏　洞泄加升麻禁用白朮茯苓荳蔻龍骨等劑　喘嗽惡風加桑皮紫蘇　失血加

犀角地黃黃連　發癍加黃連黃芩山梔　小便赤澀加滑石山梔地黃芍藥　鼻衄加黃芩犀角　驚悸加木通山梔　搐加青皮　不思飲食加山查　傷食加山查神麯麥芽　見點二三日間出不快利加鼠粘子山查蟬退名透肌散　煩紅赤色加生地黃紅花牡丹皮去白芷防風　皮急肉緊身熱壯甚加葛根前胡

見點三日之內並依本方加減及三日之後痘瘡出齊血疱已成而前證悉平不得復用此方恐發散太過難於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並

從血熱治法治成之故此方不立禁忌辨

太乙保和湯（透肌名保和湯）專治血熱痘瘡服神解湯後熱證悉去內外和平見點一日之後不易長大龜涸者用之則能保和元氣活血解毒助痘成漿易靨易落也

桔梗　紫草　川芎
山查　木通　人參
紅花　生地黃　甘草
糯米（[illegible]）

右用燈心七根薑一片水一鍾煎六分溫服

便澀腹脹加大腹皮　繁紅不潤加當歸蟬退　出不快加鼠粘子　陷塌加黃耆　痛加白芷　不勻加防風　水泡加白朮芍藥　嗽加五味子麥門冬　渴加麥門冬　瘙加白朮芍藥　七八日後漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急前胡枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散　專治血熱痘瘡服神解湯後熱證悉開氣血和平見點三四日後不肥大者不成漿者用之則能勻氣解毒透肌達表領出元陽助痘成漿而易結靨收斂也加減與保和湯同論漿足之後另有保嬰百補湯在後

即太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠粘子陳皮

右水一鍾加燈心十四根棗二枚煎六分溫服一

保嬰百補湯　專治痘瘡八九日漿足之後別無他證並以此方調理氣血資養脾胃不拘實熱二痘皆可服之惟氣虛證八九日後本方加黃耆貳錢官桂少許若有別證在審虛實隨證加減而已

當歸　芍藥　地黃
白朮　人參　茯苓
山藥　甘草

右水一鍾棗二枚煎六分溫服

陳氏催生溫補　陳氏痘瘡未出已出之間或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛速與十一味木香散治之　如已出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛速與十二味異功散治之　如已出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或瀉渴或腹脹或氣促是表裏俱虛也速與十二味異功散送下七味肉豆蔻丸治之（丹溪云木香異功散二藥治寒的當若虛而不寒者誤不旋踵）　如瘡始出一日至十日渾身壯熱大便黃是表裏俱實也其瘡必光

澤必起發必飽滿必易靨而不致損傷若無他疾不宜服藥　表裏俱實者易出易靨表裏俱虛者易出難靨表虛難出裏虛難靨隨證治之　張翼之治痘要法吐瀉少食爲裏虛陷伏倒靨灰白爲表虛二者俱見爲表裏俱虛全用異功散救之甚至薑附靈砂亦可用若止裏虛減官桂若止表虛減肉荳蔻不減官桂丁香若能食便秘而陷伏倒靨者爲裏實當用錢氏及丹溪下法若不吐瀉能食爲裏實裏實而補則結癰毒紅活綻凸爲表實表實而用表藥則潰爛不結痂凡痘但見癍點便忌葛根湯恐發得表裏俱虛也

一讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意求適於用不可得也痘疹之論錢氏爲詳歷舉源流經絡分明表裏虛實開陳施治之法而又證以論辨之言深得著書垂教之體學者讀而用之如求方圓於規矩較平直於準繩引而伸之觸類而長之可爲無窮之應用也今人不知致病之因不求立方之意倉卒之際據證檢方漫爾一試設有不應并其書而廢之不思之甚也近因局方之教久行素問之學不講抱疾談醫者類皆喜溫而惡寒喜補而惡解利忽得陳氏方論皆用燥熱佐例其辭確且文簡欲然用之翕然信之遂以爲錢氏不及陳氏遠矣或曰子以陳氏方爲不足歟曰陳氏方誠一偏之論雖然亦可謂諳求病情者其意大率歸重於太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾土惡濕而無物不受觀其用丁香官桂所以治肺之寒也用附木半夏所以治脾之濕也使脾與肺果有寒與濕而兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今也不然但見出遲者身熱者泄瀉者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛實率投木香散異功散間有偶中隨手獲效設或誤投禍不旋

踵者古人用藥製方有向導有監制有反佐有因用者錢氏方固未嘗廢細辛丁香白朮參芪等有監制輔佐之藥不專務於溫補耳然其用寒涼者多而於補助一法略示端緒未曾深及疑人之前不可說夢錢氏之慮至矣亦將以候達者擴充推廣用之耳雖然渴者用溫藥痒塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用桂附丁香等芳燥熱恐未爲適中也何者桂附丁香等當有寒而虛者固是的當虛而未必寒者其爲患當何如耶陳氏立方之時必有挾寒

而用一偏之方寧不過於熱乎予嘗會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方至正甲申陽氣早動正月間邑間痘瘡不越一家卒投陳氏方童幼死者百餘人雖由天數吾恐人事亦或未之盡也

王汝言曰若痘瘡虛怯淡白色癢塌此屬虛寒宜用陳文中方若發熱壯盛齊涌紅紫色燥癢此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救是以世人治法只解毒然亦因虛則送毒氣不出及不能成就故陳文中之法為千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊

凡治痘子要識證候如痘脚稀疎根窠紅潤不瀉不渴乳食不減四肢溫和身無大熱如此候者不須服藥惟善調護以待成就而已若癢塌寒戰咬牙渴不止痘紫黑色喘渴不寧灰白色頂陷腹脹頭溫足冷悶亂飲水氣促泄瀉渴如此候者不必服藥雖強治之亦無功也

凡治痘瘡當攻不如當守未襲熱邪不須妄治有等貪利之人不分虛實妄投湯丸間有偶治此病治其病貪天力以為己有以致虛虛實實致生變異誤人性命此醫之罪也

用藥訣 凡痘子用藥須分氣血虛實毒氣微甚而治故灰白者不起發者癢塌者吐利者寒戰咬牙者手足冷者皆氣虛也宜用補氣之劑瘡乾者不紅活者膿水少者皆血虛也宜用補血之劑稠密者焮腫者紅紫者皆毒甚也宜用解毒之劑陷伏者兼氣血解毒治之 凡用補氣宜四君子湯如瘡帶濕或有自利用之可也若瘡乾者白朮燥津液茯苓滲津液或便秘實者不可用也 凡用補血宜四物湯如瘡乾或色大紅用之可也若不能食者生地黃泥膈白芍藥收斂腸胃不可用也 凡解毒不過黃連黃芩黃檗梔子連翹牛蒡子升麻之屬俱用酒制恐寒涼反損脾胃也若欲行表須少加桂枝他如紫草山豆根葛根之類則不必用酒制矣 凡用解毒藥要別臟腑分陰陽而治之如黃連解心火黃芩解肺火梔子解肝火黃檗解腎與三焦火石膏解脾胃火木通解小腸火黃芩又解大腸火連翹牛蒡子解瘡毒火山豆根紫草解痘毒火升麻解疫毒火各有主治不同也又歲半已上屬陽心肺主事宜芩連多用之歲半已下屬陰脾肝主事宜黃檗梔子多用之

秘傳八味二花散

桃花蕊伍錢　梅花蕊一味不拘多少陰乾共壹兩[illegible]分　朱砂壹兩水飛過

穿山甲[illegible]　天靈蓋[illegible]

紫河車[illegible]　鹿茸去毛酥炙[illegible]共壹錢

[illegible]

人參[illegible]

右各爲末痘疹未出之先以朱砂壹兩爲君梅花貳錢桃花叄錢共一處和勻每服伍分或叄分或貳分半用雄雞與酒貳杯灌之與食倒懸刺血入杯中以熱酒調前藥同服　初發不起以梅花壹兩爲君加桃花壹錢天靈蓋伍分　氣血虛灰白色用紫河車壹兩爲君加天靈蓋壹錢鹿茸壹錢伍分梅花壹錢桃花壹錢貳捌分　黑陷不起以穿山甲壹兩爲君加桃花壹錢梅花捌分天靈蓋柒分麝香伍分　氣血虛不能灌漿以鹿茸壹兩爲君加紫河車貳錢桃花壹錢梅花捌分天靈蓋柒分麝香伍分人參壹錢　氣血虛不能收靨以鹿茸壹兩爲君天靈蓋伍分桃花柒分梅花玖分落靨之後瘢色白氣血虛以人參壹兩爲君加紫河車貳錢鹿茸壹錢梅花壹錢伍分　以上或

倣前修服法

保生散

紫河車前製如一　龜板壹分酥炙　鹿茸壹兩酥炙各

右爲末量兒大小用血虛川歸茯苓紫草湯下氣虛人參黃耆甘草湯下

初熱證治

【湖】小兒瘢疹初發未能辨認而但求所出之由因與因外及不因外內隨其所傷如法服餌以防其變故瘢其盛氣比之從諸丸不可緩或發或瀉或解其肌或化其毒求其所起之由涼血清肺調其臟腑平其飲食謹其禁忌嚴其養攝適其寒温將理有法俾盡其道使出無不快之經成無不痂之潰既愈之後不致遊毒流汗虛羸目疾腹脹瘡癤瘢瘤喉閉嗌腫潮熱汗泄此治瘢之大略也（湯氏風所謂痘證即痘也非於痘爲瘡之瘢）又云外者外治內者內治中外皆和其瘢自出至於惡寒者

發之表大熱者奪之渴者清之大便秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以執一爲哉大抵傷寒同治隨經用藥最爲高論假令五日已裏諸病與瘢疹不能辨別者不可疑作痘疹必須發之但各從其所傷應見治之皆不妨瘢出若強發之其變不可勝數矣　如外傷升麻湯主之　內傷枳實丸主之　大便硬者枳朮丸主之　若傷冷者温之神應丸　惡寒者發之宜防風蒼朮湯　表大熱者奪之此表者通言三陽也夫陽盛者氣必上行言奪者治之不令上行也是知無三陽表證有三陽裏證深於有形也此言表總三陽之名也　渴者清之大渴者白虎湯（暑月用之）　小渴者涼膈散（加減涼膈散去硝黃加桔梗）　大便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲子選用察其在氣在血必內實能食而秘者可用但當微微潤之　小便不通者利之導赤散八正散之類當求上下二焦何經而用之　驚者安之涼驚丸重者瀉之瀉青丸　泄者分之寒則異功散四君子湯熱則渾瀉茯苓湯　【呂】凡瘡欲出而未出因發搐者是外感風寒之邪而內發心熱也宜王氏惺惺散或人參羌活湯木香參蘇飲　凡瘡欲出未出而吐

利者是中焦停寒或夾宿食也宜四君子湯加砂仁陳皮或和中散如夾宿食者用紫霜丸　【張】治痘全在發熱之初看其熱勢微甚微者固不必治甚者當解則解當汗則汗當下則下使毒氣得以發洩則後去不能爲害痘亦稀少平順矣此不治則熱毒漸盛難以解救大抵此際熱甚非汗則表不解非下則裏不解然藥味之輕重當隨病勢之微甚而用之　【薛】痘證少具痘未發與升麻湯參伍錢帶熱服之待其身表溫和痘證已顯止藥如其身涼痘證未出只時時與甘桔湯寬胸膈利咽喉　大便酸臭不消化畏

食或叫乃內傷飲食宜枳朮丸傷冷食飲神朮丸
如見傷食又見痘瘡先與不犯大黃巴豆藥症化過
再與升麻湯如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴
豆藥過之此是各分證之法[illegible]
寔之脈氣化藥又非大黃[illegible]之平　凡初發疑似
但肌表熱而無內傷證者宜用辛涼之劑調之以四
物解肌湯主之　或云凡發熱疑似之間宜用人參
敗毒散一劑以發之足與不是一發便明大抵瘡疹
只要發盡不使留伏於中也　凡發表宜保嬰丹加
葛葱煎湯化下一也或升麻葛根湯去升麻加蘇葉

葛葱二一也或羌活散加製砂葛葱三也此可行之於
已發熱之時未發熱之前不可行也既見紅點之後
亦不可行恐表虛故也如或行之只宜參蘇飲調保
嬰丹厚蓋取汗　凡初發表要看天時如時大寒則
腠理閉密氣血凝澀防其發泄得遲有毒氣壅遏之
變以辛熱之藥發之宜桂枝葛根湯五積散去乾薑
上之如時大熱則腠理開張氣血淖溢防其發洩太
急有潰爛之變以辛涼之藥解之宜升麻葛根湯雙
解散主之如不寒不熱天氣溫和只人參敗毒散其
作　翁小兒出痘凡家有人滲溺利小便使心火有

所引導雖不用涼藥且火熱自去矣導赤散主之若裏
有小熱不宜利小便當解毒若小熱利小便反泄腎
氣宜犀角地黃湯消毒飲　翁或曰痘瘡發熱何以
能預識其輕重而解之耶曰凡發熱乍進乍退氣色
明瑩精神如常大小便調能食不渴目清唇潤此毒
輕也痘必稀疏縱出多亦自易發易靨如壯熱不減
氣色慘暗精神昏悶大便或秘或瀉不能食目赤唇
焦此毒甚也痘必稠密宜預解之其出疏者防其有
伏未可便許為疏但看熱減渴止精神爽快清便自
調能食更無他苦是真疏且輕也　或曰既識其候

知痘稠密何以解之曰諸瘡皆屬於心心之華在面
如初發熱青筋現露口中涎出此毒發於肝肝木生
心火從後來者為實邪肝為木泡風火相扇必作癢
癢宜先解肝之毒面赤如錦額上紅筋露現譫妄多
驚此毒發於心心火自旺為正邪君主不明必有陷
伏不治口乾唇焦面黃而燥此毒發於脾心火生脾
土從前來者為虛邪脾為癍心為疹必有夾癍夾疹
又脾主肌肉為火所灼必作潰爛宜先解心脾之毒
面色皖白鼻中乾燥或流清涕或衄出此毒發於肺
心火刑肺金乘其所勝為微邪宜略解肺之毒面色

黑氣如煙浮目中見鬼頭熱足冷此毒發於腎腎主
兒心火為賊邪必成黑陷不治
瘡疹發熱熱氣微者其毒必少痘出自疎易發易靨
不須服藥熱氣甚者其毒必多痘出自密難發難靨
且多他變宜預解之宜連翹升麻湯或如聖湯並合
代天宣化丸主之　或有熱微痘出反密者其人必
口燥渴脣焦烈小便赤少大便秘身雖不大熱却蒸
蒸然此毒深熱亦深故表不大熱而裏熱也宜急解
之　若煩渴引飲大熱如炙頭痛如破或自汗或無
汗宜白虎湯主之甚者石膏用至半觔解暑之時有
此症尤宜用之　或有熱甚痘出反疎者其人必不
渴脣潤目中無赤脉大小便調身雖大熱但熇熇然
此毒淺熱亦淺故表熱裏氣和也只以升麻葛根湯
　乍凉乍熱發疹常候若遍身如火晝夜不休此心
火亢甚脾土益燥為火其常宜消詳表裏證候以施
治也如口燥渴目赤脣焦大小便不利此表裏俱熱
也雙解散或連翹升麻湯或黃連解毒湯 煩躁 送下
七物升麻丸 四方俱本條 如咽喉痛甘桔湯加牛蒡子或
射干鼠粘子湯 俱見咽喉 加桔梗使咽喉爽快胸膈開豁
失今不治他日咽喉閉塞水入則嗆穀入則嘔爆啞

失音悔之無及
如初發熱時時惡寒身振振搖動如瘧之狀其人衛
氣素虛榮血亦弱不能逼毒快出使毒邪留連於經
絡之中欲出不出與正相爭故振振者火之象也以
柴葛桂枝湯加黃耆主之瘡出即愈不可錯認作寒
戰妄投陳氏辛熱之劑以誤人也
古人養生或治病者常順四時之氣謂之勿伐天和
如春夏養陽秋冬養陰飲食起居各有攸宜凡瘡疹
發熱之時其初發表解肌四時各有主方春用羌活
散 治發熱症 夏用五苓散 驚 秋用參蘇飲冬用五積散四
時　人參敗毒散又如春肝旺風木主事調養之
法宜四物湯 失血 加防風黃芩木香青皮羌活以折
風木之勝又以四君子湯 不能食 加白芍藥桂心以補
脾之受制相間服之夏心肚熱火主事宜黃連解毒
湯 煩躁 加麥門冬五味子以補肺之不足秋肺旺燥
金主事宜瀉白散 內合甘桔湯 咽喉 加牛蒡子馬兜
苓以散肺中之邪又以四物湯去川芎加天麥門冬
天花粉以潤其燥冬腎旺寒水主事宜五積散以散
表之寒理中湯 泄利 加黃耆炙木香丁香以勝裏之
寒此四時之治法也如天有暴風連日不止恐有風

邪桂枝葛根湯夏月感暑或非時之熱人參白虎湯
渴冬月嚴寒或非時之寒宜桂枝湯加桂枝生薑又
雨濕盛五苓散加蒼朮此四候者必痘變色有異證
可依其法治之苟無他候不可妄治也惟謹避穢遠
風寒毋令大熱毋令大寒但常和暖更常服辟退瘡
蠱此香能禦風邪辟惡氣透肌腠瘡疹也房室之中
常燒辟穢香禁忌勿得斷闕
凡初發熱一二三日間有驚搐者以導赤散調羌活湯
痘發熱辰砂散本方主之大便秘者三黃丸發熱微利
之小便澀少者導赤散渴甚者葛根解毒湯痘瀉腹

中痛者桂枝大黃湯痘腹腰痛者人參敗毒散本條
自利者黃芩湯泄瀉吐利者黃芩加半夏湯痘吐利如
脾胃素弱自利清白者理中湯丸痘泄或四君子湯
不能食肉豆蔻丸合而服之餘詳各門
發表升麻湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛足冷脉
數發熱肢體煩疼及瘡疹疑似之間並宜服之或
未經解利而瘡疹已發又云發候未全或未明者
但可與解散之也又云患瘡疹大便自如常者亦
可服升麻湯蓋用升麻其性苦寒無毒主解百毒
殺鬼邪辟瘟瘴蠱毒中惡腹痛咽喉口瘡皆毒也

瘡痘亦毒故也其次用葛根性平治消渴大熱解
肌發表出汗開腠理治頭痛升麻葛根二藥皆治
伏熱毒動心恍惚驚悸煩躁大抵瘡疹是蘊熱毒
葛根解熱升麻去毒也芍藥熱而藥性微寒冷熱相
攻則芍藥治時行寒熱又治血痺使瘡痘易出也
又利小便瘡疹有大熱者則利小便也次有甘草
調和之況新書云瘡疹渴燥甚者亦用炙草散主
之四者解毒治熱調榮衛爲治瘡疹之要藥也爲
其疑貳之間非瘡疹伏熱而發熱者有傷寒傷風
傷食驚證兼患瘡疹而卒氣怯者皆發虛熱而非

實熱若服之是瘡疹者則毒減而愈他證者反以
爲害不能盡述其由但有壯熱而面青目白睛不
黃赤大便不秘小便清者皆不可服裹無蘊熱故
也此藥治未發瘡疹之前瘡疹已愈之後服之消
毒故也非正出時服

升麻 葛根 芍藥

甘草 各等分

右爲麤末每服二錢水一盞同煎至半盞去滓溫
服不拘時候亦可爲細末湯調服身心煩熱即溫
服寒多即熱服

海藏云升麻葛根湯太陽陽明之藥　陳文中云身熱腹痛者身熱泄瀉者身熱驚悸者身熱汗出者身熱足冷者俱不宜服升麻葛根湯　張氏之云凡痘見瘢點忌葛根湯恐發得表虛也　萬氏曰古人謂但見紅點便不可服升麻葛根湯恐發得表虛也此蓋爲痘疎毒少者言後人不達立言之旨遽謂凡出痘子纔見紅點眞不可服殊不知升麻葛根湯四味乃發表解毒疎通血氣升降陰陽之劑痘出太密正宜常服以解之令陷者升之燥者潤之鬱者疎之過者平之陰精不衰而陽毒不亢也苟謂痘疎毒少者雖他藥不可服況葛根湯乎

古人治痘以葛根湯爲主後世好奇多立方法法愈多而治愈難矣苟能變通自發熱以至收靨葛根湯皆可增損用之不特發表解肌而已今以葛根湯爲主治隨證立增損法於後

初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風　口乾渴內熱也加葛粉天花粉麥門冬　自利加條實黃芩生用　嘔吐加半夏及生薑　腹中痛加木香青皮枳殼山査肉　腰疼加獨活北細辛　頭疼加羌活蒿本葶藶子　驚搐加木通生地黃燈心　小便少加木通車前子瞿麥　大便秘加大黃　衄血加山梔仁玄參生地黃

發熱三四日熱不減加解毒藥大力子連翹紫草桔梗　痘不出加防風蟬蛻荆芥穗紅花子　眼痛加密蒙花柴胡龍膽草

痘出太稠密加人參當歸木香紫草大力子防風桔梗　咽痛加桔梗連翹　痘乾或帶紫或色太赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡丹皮　痘灰白色平陷者氣虛也加人參黃耆防風木香官桂　手足痘不起脾胃不足也加防風官桂人參黃耆

痘將起發不透又渴者此津液不足加人參麥門冬天花粉　泄瀉者裏虛也加人參白朮訶子白茯苓　痘不著痂者濕熱也加黃耆防風官桂白朮令氏加紫草一分木通八分山査牛蒡子各八分錢久不靨加柴胡升麻黃芩各一錢

惺惺散　治數證皆爲純陽人所用古人處爲小兒藥非乃裏寒者可服且以藥對其證用之意大抵渾身壯熱必由風熱痘疹傷寒時氣且先與之也其頭痛目澀鼻流清涕者用川細辛喘嗽者用桔梗

人參多服者川茯苓恐傷冷濕氣乘裏弱者用白
朮也治風熱瘡疹栝蔞根也栝蔞味苦寒治身熱
煩滿大熱除腸胃中痼熱八疸面黃燥渴通月水
止小便利熱而胷痺不下乳陽證傷寒治難下乳
皆攻其熱也故非裏寒者可用其裏寒者由身若
大壯熱不渴而大便反利小便不赤面青目白睛
不黃赤皆裏寒證也其中雖有白朮以溫終非爲
虛熱者用人之臟腑寒則寒藥先効熱藥未必能
制之臟腑熱則熱藥先効寒藥未能制之此勢之自
然也豈得不辨表裏冷熱而用藥也和劑方小兒

傷寒壯熱當先服此大効次服羌活散如壯熱未
退切不可與通利大便及凉藥恐是瘡疹服藥則
誤矣

苦桔梗　細辛去葉　人參
甘草炒　白茯苓去皮　栝蔞根
白朮各壹兩半

右爲細末每服貳錢水一盞入薄荷貳葉同煎至
三分去滓溫服要和氣入薑煎不拘時候身雖壯
熱大便自利者不可服

海藏云惺惺散治風熱咽不利[illegible]

便不利也

荊芥散　治麻痘子兼瘙痒或癮疹大便自過

右用荊芥少許爛研以新汲水將布帛濾過入一
滴許麻油打勻令飲之使不亂悶麻痘已出用黃
蠟煎青膠木飲即安[illegible]荊芥治血風麻子
是疹子常言風瘙癮疹則皆出皮膚其毒輕而浮
又以麻油打勻此消痰之理又以黃蠟煎青膠木
服則安此滋血行榮衛榮衛既順麻疹出矣指迷
方荊芥湯乃消毒飲加薄荷煎服之

羌活散　解熱散毒治風壅欲作瘡痘者

羌活　獨活　川芎
桔梗　蟬退　前胡
柴胡　地骨皮　甘草炙
栝蔞　天麻炙　荊芥
防風各等分

右爲細末每服貳錢水三分盞薄荷兩葉盞內煎
至二分通口服量大小加減藥水此藥皆其藥味
治風治寒治驚化痰涼肝治血熱透肌但實熱發
無所不治如稟受怯弱或脾胃弱或外熱目白睛
青色皆裏無熱不可輕用

薄荷散　小兒纔覺是瘡疹宜服之
薄荷葉去梗　麻黃去節　甘草炙各半兩
右為細末每服二錢水一中盞棗二枚生薑三片
同煎至六分去滓放溫日三兩次服此是小兒稟
受極實毒氣甚者宜服之蓋此方六小兒纔覺是
疹痘便服之服之而汗出者服調中散服薄荷散
若作寒熱脉及遲者進脫甲散以溫之詳其理非
下藥之法也實者服之未必妄虛者用之必危殆
參蘇飲方見急驚　人參羌活散方見急驚
羌活散　此方初熱暫用兼治驚搐
羌活壹錢貳分　獨活　荊芥各捌分
前胡　防風各壹錢　柴胡
白芷　蟬退　甘草各陸分
細辛壹分
右加薄荷姜棗水一鍾煎五分不拘時服發搐及
熱盛不退者暫服煎熟用硃砂調下治搐如神
人參敗毒散　治傷風瘟疫風熱頭目昏眩四肢痛
憎寒壯熱項強目睛疼常風眩拘倦風痰身體
頭疼及咳嗽鼻塞等症寒熱並治之
柴胡　前胡　川芎

枳殼　羌活　獨活
茯苓　桔梗　人參各壹兩
甘草半兩
右為麤末每服二錢生薑薄荷煎
李氏敗毒散　治初熱壯盛等證
即前敗毒散加升麻荊芥牛蒡子蟬退山查地骨
皮薄荷紫蘇紫草　減獨活柴胡茯苓人參
如熱甚加柴胡黃芩　夏加香薷　冬加麻黃
瀉加豬苓澤瀉
右薑一片水煎臨服加葱白汁五茶匙

正氣散
甘草炙叁分　陳皮　藿香去梗
白朮各伍分　厚朴薑製　半夏薑製各壹錢半
右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服
調解散
青皮　陳皮　枳殼麩炒
桔梗去蘆炒　人參　半夏湯泡七次
川芎　木通　乾葛各肆分
甘草　紫蘇各貳分
右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服

方加紫草糯米

蘇解散　治痘初壯熱頭疼腰痛腹疼作脹一切熱毒甚者

紫蘇　葛根　防風

荊芥　白芷　蟬退

紫草　升麻　牛蒡子

木通　甘草各等分

右加燈心葱白各七根水煎熱服

和解湯　解表和中

升麻　乾葛各壹錢半　白芍壹錢

人參　防風各柒分　川芎捌分

甘草伍分

右用薑一片水煎服

右十七方發表之劑

上編本四物解肌湯

芍藥　黃芩　升麻

葛根

每服四錢水一盞煎至七分去滓服或云小兒傷寒瘟疫溫熱瘡疹五日已來疑似不能辨别者並皆辛涼之劑潤之即以四物湯解肌之類　海藏

一云此論卽有表也若內傷腹中有物未得大便而發熱者當以食藥去其物則可若得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯比錢氏升麻葛根湯減甘草加黃芩以有表熱之意也

防風蒼朮湯　治小兒邪熱在表惡風惡寒瘡疹未出可解表發瘡疹

防風　甘草炙各半兩　蒼朮

石膏各壹兩　川芎　黃芩各貳兩

右爲麤末每服二錢生薑三片薄荷七葉水煎日二服

雙解散　卽防風通聖散益元散二方也

防風　川芎　當歸

白芍藥　薄荷葉　大黃

連翹各伍分　石膏　桔梗

黃芩各捌分　白朮　桂枝

荊芥穗各貳分　滑石貳錢八分　甘草壹錢

右剉細加生薑三片水一盞煎至一盞去滓溫服無時

葛根橘皮湯　治冬溫未即病者被積寒所折不得發至夏熱得其寒解冬溫始發肌肉斑爛癮疹如

錦紋而咳心悶不嘔吐清汁服此

葛根　橘皮去白　杏仁去皮尖

知母　黄芩　麻黄去節

甘草炙

右剉散每服抄三錢用水一盞同煎半盞去查温服不拘時候

右四方辛凉之劑表有實熱者宜之

五積散

白芷　川芎各叁分　桔梗壹分

芍藥　茯苓　甘草炙

當歸　桂枝　半夏各貳分

陳皮　枳殼　麻黄各伍分

蒼术壹錢　厚朴肆分

右除桂枝枳殼二味別爲麤末外一十二味剉細慢火炒令轉色攤冷次入二味末令勻水一盞半生薑三片煎至一盞去查温服無時

桂枝葛根湯

桂枝　葛根　赤芍藥

升麻　防風　甘草各錢半

右剉細加生薑三片淡豆豉一錢水一盞煎七分去查温服無時

柴葛桂枝湯

柴胡　葛根　甘草

桂枝　防風　人參

白芍藥各等分

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去查温服不拘時

右三方辛温之劑表有寒邪者宜之

或裏大便酸臭不消化畏食或吐乃内傷飲食宜枳术丸傷冷食飲神應丸

紫霜丸見驚　神應丸

枳實丸　枳术丸俱見傷食

七物升麻丸

升麻　犀角　黄芩

朴硝　梔子仁　大黄各貳兩

淡豉貳升微炒

共爲末蜜丸如黍米大凡覺四肢大熱大便難即服取微利爲止

備急丸

木香貳錢　大黄　牽牛末各伍錢

右爲細末煉蜜丸如芡實大每服五七丸食前山
查煎湯下

和中加味四君子湯

人參　白朮　茯苓

砂仁　橘紅各壹錢　甘草伍分

水一鍾煎六分食前温服

理中散

厚朴薑汁製炒壹錢半　人參　白朮

茯苓各壹錢　乾薑炮　甘草炙各陸分

水煎服

加減六一散　治諸熱證暫用

桂府滑石水飛過陸兩淨　大甘草去皮為末壹兩

右和勻每用一錢薄荷湯或冷水調下內加製辰砂叁錢名辰砂六一散治狂言發搐驚悶用防風荊芥薄荷天麻煎湯候冷調下更加牛黃叁錢纔豆蔻叁錢名退火丹治痘初出時大熱不退及標影稠密成片者用紫草木通蟬退地骨皮紅花牛蒡子片黃芩燈草各等分煎湯候冷調下能減標稀痘極良法也本方加鬱金名牛黃六一散治痘後瘡癤毒壅及天行瘟疫冷水調下多服大効

大靈丹　治壯熱煩躁驚搐瘀血紅紫斑焦乾陷一切惡證

白滑石飛過　雄黃飛過　犀角各叁

辰砂飛過錢半　牛黃　冰片各壹錢

麝香伍分

右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷燈草牛蒡子紅花紫草黃連各叁錢水二碗煎至半碗細絹濾去查加蜜肆兩同熬滴水成珠和前藥丸如小龍眼大金箔為衣每用一丸燈心湯下暑月冷水化下

無比散　初熱服之甚能稀痘又治痘夾黑點子及黑陷黑痘等證

辰砂壹錢　冰片　麝香

牛黃各伍分如無牛黃用牛膽南星代之　膩粉貳錢

一方有蟾酥

右研細末一歲兒服壹字大者五分刺豬尾血三兩點新汲水調和送下取下惡物如爛魚腸葡萄穗狀即愈

小無比散　治痘壯熱口渴小水澀大便秘口氣熱煩躁不寧或焦紫或紅斑白泡發熱至起壯時有熱

者皆可用痘後餘熱亦可用
桂府滑石（飛過）石膏（飛過）粉草
寒水石（飛過各二）鬱金（……各錢）甘草湯
右俱製淨末和勻每五歲者服一錢大人再加
冬月燈心湯下　夏月井水調下　熱甚不解者
井水磨犀角汁調下　若紅紫頂陷不起加穿山
甲末壹分麝香半分紫草煎湯加酒一二匙調下
即起
無比散　治熱毒太甚發狂譫語引飲痘瘡紅紫
黑陷
桂府滑石（飛過陸兩）粉草（壹兩）　辰砂（飛叁錢）
雄黃（飛壹錢）
右為末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初
用敗毒散調下亦能稀痘　若報痘後用燈心湯
下
涼血解毒犀角地黃湯（見口）　消毒飲（見咽喉）
玳瑁湯　治時行痘疹及赤瘡疹子未發者令內
消已發者解利毒氣令不太盛
生玳瑁　生犀（各以冷水濃磨汁二合）
右同研令勻每服半合微溫服一日四五服為佳

又治出而未快者宜服之又云毒氣內攻紫黑色
出不快用玳瑁水磨濃汁一合入豮猪心血一匙
子大以紫草濃煎湯和作一服服之玳瑁犀角其
性微寒以治熱毒則知其無失也二藥皆治痘疹
蠱瘴解百毒通血脈消癰腫故用之以解痘毒可
宜服也
犀角飲子　解熱毒及風疹
犀角　甘草（炙各一兩）　防風（貳兩）
黃芩（壹兩）
右為麤末每服五錢用水一小盞煎至半盞去查
溫服不拘時候
犀角湯　治小兒疹痘瘡及赤瘡子
犀角（屑）　大黃（炒）　桑白皮（蜜炙）
鉤藤　甘草（炙）　麻黃（去節各壹兩）
龍膽草（半錢）　石膏　栝蔞
黃耆（炙各半兩）
右為麤末每服一錢水一小盞煎至四分去滓溫
服量兒大小加減服瘡子退後濃磨犀角水塗之
更良錢氏亦附方同以此藥治痘瘡疹太盛令不
入眼則名瀉肝散此藥治風盛氣實心肝血熱津

液內燥大便不通毒氣上感表熱未散之藥也且
大黃栝蔞治內燥鉤藤龍膽治風血熱桑白皮石
膏治上焦熱麻黃前者散肌熱犀角甘草解毒大
抵用藥貴於與病相主則病去而正氣自復苟爲
不然則反爲大害如犀角散自非大便數日不通
喘急悶亂煩躁譫語者豈可服之恐病藥不相主
治也

奪命散　治瘡疹已發未發並宜服之

升麻　糯米　紫草

甘草各半兩　木通各貳錢

右剉爲散每服一大錢水七分煎四分去滓温服
出瘡疹熱毒勢甚者可服解結熱利小便瘡痘初
發氣盛亦宜服

牛蒡散　凉血解毒

右用牛蒡子炒爲末米煎一盞服之小兒冬月有
非節之煖及春月天氣暄暖或甘肥之過或重衣
溫厚幃帳周密傷皮肉守血脉瘡瘍發黃是生多
疾宜預常服之也

獨勝散　治小兒發瘡疸早微熱晚大熱目黃脇動
身熱手足發其如驚者又名牛蒡獨勝散

牛蒡子　[illegible]等分

右爲麤末每服一大錢水六分盞紫草二七寸同
煎至四分盞連進三服其瘡便出此藥用牛蒡子
出癰透肌白殭蠶治遍身癮疹疼痛成瘡爲末酒
調服之立瘥又以紫草煎之令利竅是瘡疹證無
虛寒證者服之立出也

解毒疎痘湯　預服解熱去毒　已出解熱毒痘疹
又治紅紫[illegible]乾壯熱譫語

防風　荊芥　羌活

柴胡　川芎　白芷

當歸　連翹　黃芩

黃連　鼠粘子　紫草

蟬退

右剉葱水煎服

安斑散　調理瘡疹

升麻　赤茯苓　羌活

黃耆　人參　桔梗炒

枳殼麸炒　甘草各等分

右爲細末每服一錢水七分盞紫草薄荷少許同
煎至四分盞去滓放温服之量兒大小增減此藥

為解毒涼血生肌寬腸導熱利小便快膈之藥也
患瘡疹有熱無寒者可服之

西來甘露飲　清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不退痘色紅紫口渴大便結燥服之能[illegible]紅潤亦治疹家煩熱[illegible]咳嗽疹色枯燥或譫語喘急睡臥不安

絲瓜藤[illegible]

若發熱煩躁口渴未見紅點將茜根壹兩水煎濃汁二酒盃攪絲瓜藤汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕　若已見標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯衝服使見紅潤　若夾斑者犀角紫草茜根煎湯衝服冬月用酒煎衝服　蓋此汁極能解毒清熱尤治大行時疫每以生薄汁少許加蜂蜜調勻服之有神功

渾元汁

即紫河車不拘男女但胎者尤妙入新瓦罐內封固其口上以碗覆埋於土中久則化而為水是也專治氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等證以此汁

清而補之其効立見氣虛甚者人參紫草煎濃湯衝入服之

蟬蛻膏

蟬蛻去毒　當歸　防風
甘草　川芎　荊芥穗
升麻各等分　加竹[illegible]藥

右為末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

辰砂散

好辰砂壹錢　絲瓜近蒂者五寸連子燒灰存性此物發痘最妙

右研末蜜水調服云多者可少少者可無或以紫草甘草湯調服尤佳

初熱吉凶

發熱時身無大熱腰腹脚膝不痛過三日纔見紅點又堅硬礙指此為吉證不須服藥

發熱時渾身壯熱不時發驚痘自心經出也乃為吉證可治而愈　按近年屢有痘前發驚而終凶者好事不如無未可言吉

發熱之初腹中大痛腰如被杖及至報痘乾燥而前痛猶不止者死不治先腹痛後止可用助血氣藥救之

初發熱一日遍身即現紅點稠密如蠶種摸過不礙
手者死不治
初發熱時頭面一片紅如臙脂者六日後死
初發熱時用紅紙撚蘸油點火照心頭皮肉裏紅如
一片臙脂或遍身皆有成塊紅者八九日後死

見形證治

痘疹之則始於見點從見點而數之期止七日七日之內如花之始蕾而發也其勢日盛以出七日之後氣斂而花謝矣故服藥者當於七日之內日夜連服毋或姑息誤之以七日所以全之於百年人不知此而惟務姑息七日之外服無益矣予嘗謂痘毒之在血氣猶若穢糙之在米也惟血氣充足運轉迅急若篩米然運轉不停則穢糙不混於米而騰起浮聚自作一團血氣充足則流通痘毒不滯於榮衛之中而自然收斂以成痂故痘疹及時貫膿未嘗爛肌損肉只

是將皮肉紅色毒氣收斂窠囊而已其有日久纔發見爛者此皆變證而非本然如此也今舉世以食物發痘而不知其本無益也惟服補氣血藥以助其運行推出之勢可也

發熱三日之後熱退身涼大小不等作三次出淡紅色如水珠光澤者不須服藥　凡痘子出現疎則毒輕不可妄治密則毒甚須要稀落大小分明不相粘連略與托裏解毒之劑快斑湯消毒飲上之使之易發易靨如出太密稠迸粘糊其毒亦甚托裏解毒之劑宜多飲之以防後時黑陷之變更察外證可治則

治不可則勿治　凡痘子出形皮肉如常根苗明潤
此毒輕也不可妄治如皮肉昏黑或赤腫根苗乾枯
青紫或灰白者此毒甚也以消毒飲奪命丹合服

快斑湯

人參伍分　當歸　防風
木通各壹錢　甘草炙分　木香
紫草　蟬蛻各貳分

右剉細水二盞煎七分去查溫服不拘時

消毒飲

牛蒡子　連翹　甘草

綠升麻　山豆根　紫草各等分

右剉細水一盞煎七分去查溫服不拘時

奪命丹

麻黃　升麻各半兩　山豆根
紅花子　大力子　連翹各貳錢半
蟬蛻　紫草各壹錢半　人中黃叁錢

右研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

凡痘子之出最要唇潤不潤紅鮮如常其毒則輕如唇焦破裂古燥有此為毒火太甚表裏鬱遏急宜解之黃連解毒湯加大力子

黃連解毒湯

發熱一二日便出　如纔發一二日間痘便一齊湧出者須問其曾數日前有熱否如曾數日前午熱午凉以過期論惟原未發熱至今纔熱便斑現此表氣虛毒氣盛榮熱衛弱腠理不密肌肉不堅不能約束於外使毒氣衝擊故出太驟也宜用實表之劑可以無癢塌無潰爛實表解毒湯主之　一方用羌活散調紫草膏或保嬰丹加紫草牛蒡子蟬蛻與服熱盛不退以羌活散調退火丹進之另用燈草木通蟬退地骨皮煎湯候冷服此用發表之劑與表虛衛弱之說背馳蓋亦有初發熱時見表證失於解散實熱壅遏而怒發者此法猶可施也然得全者鮮矣

實表解毒湯

黃耆　人參　當歸稍
生地黃　白芍藥　地骨皮
甘草　酒片芩　柴胡
玄參　升麻

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉拾片水煎溫服無時

消毒快斑湯

桔梗　甘草節　荊芥穗
牛蒡子　防風　當歸尾
赤芍藥　天花粉　黃耆
玄參　連翹　前胡
木通
水煎服
清地退火湯　治痘帶熱而出名為火裏苗急用此
方以退其熱則後無中黑變陷之候
地骨皮　地膚子各壹錢　牛蒡子
紫草　葛根各捌分　連翹陸分

當歸伍分　木通叁分　蟬退貳分
右加薑一片水煎服如熱不退再服一劑或服導赤散
瀉心湯服
消毒散本門加熱
火丹宜服六一散加生地黃　保嬰丹本門俱見湯
凡痘發熱三日始出如發熱四日至五六日後始出
者須審視其外感內傷若前傷風寒傷食之熱久
而不去則所蘊之毒亦能乘間而出不可以過
期論惟無內傷外感之因一向熱而不出此裏氣虛
不能送毒外出也即用參芪湯以助其氣於

臟腑胃之間宜先用托裏之劑令其快出次以和
中之劑多服之可以無伏無陷無倒靨托裏宜托裏
快斑湯或十宣散和中宜四君子湯加黃耆或保元
湯合匀氣散主之
托裏快斑湯
當歸　黃耆　川芎
木香　青皮　牛蒡子
紫草　連翹　木通
防風　桂枝　蟬蛻
右剉細加淡竹葉十片水煎溫服無時

十宣散　一名千金內托散一名托裏十補散
黃耆　人參　當歸各貳錢
厚朴薑製　桔梗各壹錢　桂心叁分
川芎　防風　甘草
白芷各壹錢
右為細末每服一錢或二錢木香湯調下
增損八物湯
人參　黃耆　白朮
甘草　當歸　川芎
牛蒡子炒　赤芍藥　防風

荊芥穗　連翹　桔梗
葛根
右川水煎服

匀氣散
木香　[illegible]　山查肉各五錢
右為細末每服一錢甘草湯調服

痘出不出　痘疹之出自有常期如過期應出不出有數證不同不可不辨如肉素實之人皮厚肉密毒氣難於發越一旦時其徹厚不怯風寒又為外邪所襲或體素弱者風寒易感以致腠理閉密氣血凝澀故

應出不出也其證頭痛四肢拘急偎倚蓋覆常惡風寒此類宜發之氣實者用雙解散氣弱者用參蘇飲或惺惺散見前或內虛者脾弱食少宜用補脾之劑加行氣發未樂四君子湯合調元湯見前大法參者飲非用木香青皮黃耆桂枝或臟腑自利宜用溫裏之劑黃耆建中湯或益黃散合與合命丹合進利未止者豆蔻丸見前合進溫果湯則氣不消則氣不消削則不陷伏矣若依上法分治猶不出者此毒難伏於三焦不久而變生焉

加減參蘇飲
人參　紫蘇葉　葛根
陳皮　前胡　白芷
桔梗　枳殼　甘草
羌活　防風
右用竹葉為引煎服

加減調中湯
人參　白朮　黃耆
甘草炙　木香　桂枝
白茯苓　藿香　白芍藥酒炒
陳皮

右用生薑為引煎服

聞人氏規云是痘疹發熱數日而不發見者進退皆難便欲大發之懼其本稀而成癩爛不發之又無以出其毒氣古人立論始以藥微發之微發不出則加藥加藥不出則大發之大發之後所出不多氣候和平無他證者即是痘本稀不可更發也以此言之發不至太過守不至不及乃用藥之圓活也愚按古方用發未者升麻葛根湯輕劑也惺惺散重劑也謂微發謂加藥者或先用輕劑後用重劑或只用本劑先小作湯以飲之後漸加大多飲之非謂於本方之外

再加辛熱大發之藥也

凡痘疹過期應出不出者或因外感風寒依上發表之法或因內虛泄瀉依上和中之法如按法調治猶不出快熱反甚大渴腹脹滿大便硬結不通煩躁不安者此毒邪壅伏於內三黃丸七味升麻丸初熱擇而用之甚則三乙承氣湯主之閻人氏云且身熱脉數大便秘而腹脹此熱毒壅遏未見形狀者當微下之非微下則熱不減此是始者熱在裏痘未出之時也若痘點隱隱在皮膚中者是巳發越在表痘已發□則不可妄下也又有結膿窠痂兆之際脉尚

□□而大小便秘此表已罷裏有熱毒宜微利□□臟腑有熱行徃利大小便者以其主出而不

張氏從道云痘疹氣匀即出快蓋氣匀則榮衛無滯匀氣之藥如桂枝防風荊芥穗薄荷葉所以行在表之氣而使之無滯也故凡發表之劑多用之木香青皮枳殼木通所以行在裏之氣而使之無滯也故凡和中之劑多用之又瘡出之時常宜和煖如三春發生之氣則氣血和暢自然其出快其發透其膿務若偏於大熱則壯火食氣其氣反虛而不能行偏於太寒則氣凝澀而不得行矣

痘瘡之證其初不免於發熱者未出毒邪在裏煎熬氣血薰蒸臟腑而然瘡既現形則毒洩而熱解所以瘡出熱退者瘡本必疎若瘡已出熱不少減此毒蘊於中其勢方張其瘡必密宜急解其毒通聖升麻湯加防風荊芥穗地骨皮或解毒防風湯大法加升麻或東垣黍粘子湯本條兼服代天宣化丸發防服藥之後瘡或不出或再出其熱頓減者為氣和也熱若不減瘡漸加多再消詳大小便何如大便不通七物升麻丸初熱小便不利連翹湯小便不利小大便俱不通

八正散小便不利自利者黃芩湯自利加白頭翁酒黃連調赤石脂末裏氣和毒解矣如更加渴煩躁不已或譫妄或腹脹滿氣促或自利不止手足厥冷此逆證勿治

出太密 一發便密如鍼頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹升麻湯主之然稠密之處各有經絡部分所屬額主心面主胃腹與四肢主脾脇主肝兩腋主肺下部主腎背主膀胱當隨見證治之若面色黃大便黑煩躁喘渴或腹脹者瘀血在內也用犀角地黃湯或抱龍丸生犀角汁但根窠分明肥滿者無

妨臍前後者宜心經用導赤散之類肝經用犀角
散之類肝經用柴胡湯之類大凡稠密者熱毒熾盛
也若密而不通用東垣消毒散若密而作搐用仙方
活命飲若密而小便不通用八正散若密而大便不
通用承氣湯若密而惡寒發熱用麻黃甘草湯
連翹升麻湯□□□□□□□加
連翹壹錢　升麻　葛根
桔梗　甘草　牛蒡子壹錢
木通　白芍藥伍分　薄荷葉少許
右剉細加淡竹葉燈心水一盞半煎一盞去查溫

卷八　幼科　百三

服時
梔子湯　治痲疹已出稠密身表熱急與此
□防後再乾黑附
鼠粘子炒　當歸身　甘草炙
柴胡　連翹　黃芩
黃耆　地骨皮八錢
右㕮咀每服五錢水煎入香溫服空心服藥里且
勿與乳食
犀角消毒散　治痲疹斑發熱痲疹及瘡疹等證
牛蒡子　甘草　荊芥

防風分　犀角分　金銀花分
右水煎熟入犀角汁出服
東垣消毒散　仙方活命飲　痘出太盛
發表痘出大盛煩喘甚者麻黃甘草湯
煩喘咽痛而嗽者麻黃湯入寶香丸妙
麻黃甘草湯　治表實痘盛煩悶稠密
麻黃　生甘草
右水煎服
痲疹□□瘡已發密重微喘飲水者有熱也用去
氣微下之　滄洲翁云瘡已發稠密微喘渴欲飲

卷八　幼科四　百三

下之當歸丸及龐氏□□實外以黃蘗膏塗
□州大盛喘促腹滿小便赤手足心并服下
□武狂□安□大便不通宜四順飲小承氣湯下
後瘡痂急退不可再下
表虛由氏調肝散　治瘡疹太盛宜服令瘡不入眼
犀角　龍膽　麻黃去節
鈎藤鈎　黃耆　桑白皮炒黃
石膏　人參　栝蔞仁去皮
甘草炙各
右為麤末每服□□水煎□後溫服微利効

瘀血溺癥云出太多者犀角地黄湯地骨皮散痲二
湯 即地骨皮散加鼠粘子
龐氏地黄竹
生地黄半兩　豆豉一升　雄黄一錢
麝香半錢
右以豬膏壹觔和勻以露一宿煎九六沸令三分去
一絞去下雄黄麝香攪勻稍稍飲之毒從皮膚中
出即愈
再又解痘毒藥
絲瓜　升麻　芍藥酒炒
痘瘡　入幼科回
甘草生　山查　黑豆
赤小豆　犀角
右㕮咀水煎服
或云一見皮肉變紫紅黑則倚急用紫草藤燒灰加
製砂進進二兩服或薄荷湯調退火丹進之仍以牛
蒡子爲末傅顖門上以散熱氣非惟能使痘疎且免
侵眼之患　用紫草藤燒灰爲末加入退火丹內又
用紫草木通蟬蛻地骨皮煎水調退火丹進進二三
服則痘之稠密不分者遂分明矣後再用乾葡萄五
十箇甘草根壹兩爲末進服後伍箇荒荽子伍錢
一荽亦可用如無用二碗煎一碗徐徐以熟水
薄常與服之服盡再用水煎准葡萄常與之服則痘
之稠者以退不作害矣退者遂令如水珠起壯灌膿
結靨矣
凡痘子初出磊磊落落似痱珠之狀其後旋加日多
一日此毒伏於裏裏氣虛弱不能托之即出要大補
兼解毒或什可救其一二也十宣散加無價散主之
十宣散見前　無價散見前
王放言曰痘瘡多者由毒氣多便先宜解毒然多則
恐氣血周貫不足故又當宜兼補藥以助成膿血
痘疹
痘毒自內出外一二三日方出其毒氣尚在內出至
六日則當盡發於表七八九日成膿而結痂矣若毒
氣盛不能盡出過六日毒反內入臟腑故須於六日
以前毒氣未出盡之時急服涼血解毒之藥以驅出之
六日以後醫無及矣
出痘遲緩　痘疹三日不出或出不快即微發之
如痘發後不多出即加藥
即大發之　如發後不多及
無逆即瘥本稀不可更發也有大熱者當利小便
臟六一散　小熱者當解毒若不快勿發勿下攻

抱龍丸治之　【書】錢氏消毒散化毒湯活人鼠粘子
湯皆發瘡痘溫平溫凉藥錢氏所謂微發之者是也
如微發不出者即就以前項藥該每服貳錢者即加
至叁肆錢該每日二服者即加至三四服如加藥又
不出者即用升麻葛根麻黃桂枝大發之如大發後
不多及脉平無事者即瘡稀不可更發如脉洪有熱
有大熱者當用四聖導赤八正黑利小便有小熱者
當用芩連及金花丸皆解毒若利小便解毒後又不
快則勿發勿下止用抱龍丸治之此錢氏心法也
【醫】若出不快清便自調知其在表不在裏當微發升

痘疹集覽　卷四　頁

麻葛根湯　若青乾黑陷身不大熱大小便澀則是
熱在內煎大黃湯下宣風散　若身表大熱者表證
未罷不可下　若瘡已出見小熱小便不利當以八
正散利之
【海】太陽出不快身之表也　荊芥甘草防風湯
陽明出不快身之肌也　升麻加紫草湯 [illegible]方升麻湯加紫草
少陽出不快身之傍也　連翹防風湯 附連翹散
四肢出不快　防風芍藥甘草湯
【呂】凡痘瘡出不快者有五證臨病審而調之　一證
天時嚴寒爲寒所折不能起發宜救表溫表冬三月

炎暑紅痢初見宜五積散正氣散參蘇飲楊氏調解
散 [illegible]　陳氏木香散 [illegible]　一證炎暑隆盛煩渴昏迷
瘡出不快宜辰砂五苓散煎生地黃麥門冬湯調服
身熱者小柴胡加生地黃熱甚煩渴便實者白虎
加人參湯輕者人參竹葉湯加生地黃 [illegible] 煎服
一證服凉藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜
理中湯 [illegible]　吐利甚者加附子或陳氏異功散 [illegible]
人參白朮散 [illegible] 丸 [illegible]　一證或成血泡一半尚是紅點此
氣發越不透必不能食大便如常者宜半溫裏半
表之劑用四聖散加減及紫草木香湯絲瓜湯既

痘疹集覽　卷四　頁

發之 [illegible] 散湯氏安斑湯　一證外實之人皮膚厚肉
腠密毒氣難以發泄因出不快宜消毒飲透肌散如
大便秘實於消毒飲內加大黃梔子仁煎服瘡出太
稠宜犀角地黃湯張氏解毒防風湯血氣不足宜十
奇散咽喉不利宜如聖湯加薄荷枳殼口中氣熱咽
痛口舌生瘡宜甘露飲子餘熱抽搐宜抱龍丸煩渴
宜獨參湯黃芩六一湯
【張】瘡已出而不遍勻者聞人氏云惟透肌解毒無壅
塞之患則自然出勻以必勝散大紫草飲調 [illegible]
類主之　瘡出不長隱於肌膚者人參透肌散 [illegible]

出不快有數證不同內虛熱極而不發者朱汝明

用四君子加黄耆紫草發之 内虛甚而生寒大便

利而出不快者宜理中湯附子以溫之則氣不消剝

自不伏陷有內實而兼諸熱而出不快者用四聖散

加味四聖散紫草飲子紫草木香湯紫草木通湯快

斑散絲瓜湯俱可選用或氣壅痰嗽而發不出者蒼

术白芷防風升麻黄芩芍藥連翹當歸[illegible]等

分煎服兼化抱龍丸若毒根在裏或血氣虛弱或邪

氣衝觸內陷而出不快者托裏散

彭氏云疹痘發未透宜四君子湯加黄耆紫草糯米

煎凡發熱病不可損胃氣故用四君子及糯米等助

其胃氣 服此藥後若患者身全不熱又以兎絲子

醋製爲末後分在大人宜錢小兒半分或叁分托之則

痘疎疎出矣此藥大補助火不可多多則托出太多

矣 隱於肌肉不起宜紫草飲子煎服又不可過用

候三日發後以保元湯加好酒人乳一二服最穩

紫草貳兩細剉以百沸湯一大盞沃之以器合定勿

令洩氣量兒大小溫溫服

微發消毒散 治瘡未出或已出未能勻遍又治一

切瘡疹瘡去痰治咽喉痛

牛蒡子兩炒 甘草兩炙半 荊芥穗半錢

右同爲麤末每服三錢水一盞半煎七分去渣溫

服 每藏云此藥皆溫平之劑一去加防風薄荷

鼠粘子湯 治小兒痘瘡欲出未能得透皮膚熱氣

攻咽喉眼赤心煩

鼠粘子兩炒香 荊芥穗 甘草各壹

防風兩半

右爲細末沸湯點服臨卧大利咽喉化痰涎止嗽

實宜 每藏云大便以陽爲度涎實宜諭還不止者此散

又法 用牛蒡子炒熟爲末同荊芥煎服

右三方消毒飲加減法也

化毒湯 治小兒痘瘡已出未出並宜服之

紫草茸 升麻 甘草各等分炙

右㕮咀水二鍾粳米伍拾粒同煎此陽明之藥也

每藏云出不快者化毒湯加[illegible] 本事方用糯米不用粳米

丹亞玉痘出兩日不能透食稍進汗微出然略減但

食物口中覺有惡味此由得斑發未透須微微表之

升麻 甘草炙 紫草

白术 陳皮 芍藥錢少半

作一服加以酒同煎勻須炒見其大便雖出不

多加白芍藥消併
透肌湯　治痘不透
紫草　白芍藥　升麻
秫米粉（炒各等分）
右三方皆化毒湯加減法也
天發頭面出不快此太陽經也當用荊芥甘草羌活
防風天麻共煎　胸脇出不快此少陽經也當用柴
胡黃芩紫草木通紫蘇共煎　四肢出不快此陽明
經也當用升麻葛根紫蘇芍藥甘草連鬚葱白共煎
遍身都出不快當用九味羌活湯　以上四證藥
則各加蘿葱為佐連進二服痘出快矣

痘疹　幼科四　百辛

九味羌活湯
羌活　防風　蒼朮
細辛　白芷　黃芩
川芎　生地黃（宜以芍藥易之）　甘草
水煎量大小輕重加減
散寒五積散　正氣散
調解散（見二方俱熱）
清暑辰砂五苓散（五苓散加辰砂細研末是也）
人參竹葉湯　治痘因吐瀉煩躁口渴心悶不寧及

疹後餘熱不退小便赤或赤斑者
人參　半夏　麥門冬
當歸　淡竹葉（各等）
右剉散每服三錢水一盞生薑一片煎服
白虎湯
石膏（一兩）　甘草（三錢）　知母（壹兩二錢）
右為麁末每服三錢水一盞粳米二十粒同煎至
半盞去滓溫服不拘時加入人參壹兩貳錢名人
參白虎湯聖惠方加乾葛
小柴胡湯（發熱）

痘疹　幼科四　百壬

吸襄汪機云有紅斑點出日數未盡其內實而肌熱
者宜疎利之
紫草例海藏云小兒瘡疹出未快可濃煎紫草汁服
按紫草通竅理利九竅涼血活血故為痘家欲出
未出必用之藥若出已透而大便利者忌之
紫草散　發痘疹
鉤藤鉤子　紫草茸（各等分）
右為細末每服一字或五分一錢溫酒調下無時
四聖散　治瘡疹出不快及倒靨一方有黃耆
紫草茸　木通　甘草（炙）

枳殼[illegible]

右等分爲麤末每服一錢水一盞煎至八分溫服[illegible]

無時[illegible]

紫草迴瘡散 小兒瘡疹出不快或倒黶[illegible]

紫草茸　黃耆　桑白皮

木通　枳殼　白朮（各等分）

右爲麤末每服三錢水酒各半盞麝香少許同煎

服

紫草木通散 治小兒瘡疹

紫草　木通　人參

茯苓　粳米（各等分）　甘草（減半）

右爲末每服四錢水煎此小便不利之劑也

人參蟬蛻散 治小便不利瘡疹不散煩躁多渴咬

牙咬齒氣麤喘滿

人參　蟬蛻　白芍藥

木通　赤茯苓　甘草

紫草茸（各等分）

右用水煎服

透肌散

紫草茸　綠升麻　粉甘草（各壹錢）

右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

紫草透肌湯 治瘡熱而出不快及頂陷者

紫草（壹錢）　升麻　木香（各五分）

牛蒡子　防風　荊芥

黃耆（各[illegible]）　甘草（[illegible]）

右薑水煎服 如色紫[illegible]加蟬退[illegible]錢

紫草快瘢湯 治痘疹血[illegible]不足不能發出色不紅

活幼論名紫草湯

紫草　人參　白朮

茯苓　當歸　川芎

芍藥　木通　甘草

糯米

右每服二錢水煎

[illegible]紫草膏 治發熱至七日已前或因風寒痘不起發

或紅紫或驚搐俱可用

殭蠶（[illegible]）　全蝎（[illegible]）　甘草

紫草　白附子（[illegible]）　麻黃（各伍錢）

穿山甲（[illegible]）　蟬退（[illegible]）

右爲末將紅花紫草各壹兩好酒貳鍾熬去大半

去渣入蜜伍兩慢火熬滴水成珠爲度丸如龍

服移入筍服一丸燈心湯化下

紫金散 治痘瘡出不快及倒靨亦治遠年不愈瘡

瘡

紫草　蛇退（小根）　牛蒡子（炒各伍錢）

右為細末每服一錢水半鍾煎減半溫服

獨勝散（無時）

蘿蔔湯 治痘疹出不快者

右用開花蘿蔔煎汁時時飲之蓋痘疹氣勻即出

快蘿蔔治嗽定喘下氣消脹解毒

野通散 治痘瘡出不快及傷寒不語

乾野人糞（臘月採煆存性）　冰片

真麝香（各等分）

右為細末每服五分看大小用新汲水入蜜調下

十歲以上者服一錢　按野人糞治蜘蛛咬瘡此

治痘出不快大効若蜘蛛咬瘡久而不愈其緣生

皮膚延蔓遍身不愈者加雄黃青黛水調以蜘蛛

試之立化為水屢驗當此二味是治痘疹當用之

藥取山中者若人家所養之猴食物味鹹即不効

失其本真也

補虛劑門勉奴痘已出第　日色淡不肯發此血氣

俱虛與此方

人參　訶子（煨各壹錢）　白朮（炒）

黃耆（蜜炙）　當歸身（酒洗各壹錢）　陳皮（貳分）

甘草（炙少許）　荳蔻（麵煨壹錢半）

右煎入好酒些少飲之

六一湯（見前）

秘傳大透肌散

人參　芍藥　川芎

甘草　茯苓　白朮

木通　陳皮　黃耆

糯米

右各等分為麤散每服四錢水煎服

活血散 治瘡子或出不快用白芍藥末酒調如欲

止痛只用溫熱水調嚥下（雞冠血張和之治四肢出不快加防風大効此）

四物湯治痘瘡出不快不甚紅活不起根窠緣血

也此藥能活血調順痘疾無如此方自古及

之如實只加甘草服之

通□散 治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參　桔皮　桂枝（各分）

川芎　熟地黄　芍藥各壹錢
當歸　紫草各壹錢半　紅花
木香各叁分　甘草三分　知母捌分
荔枝殼三枚
右用灘水一鍾煎七分不拘時服初服到頸
再服到胸三服至足神効
人參透肌散　治痘瘡虛而有熱雖能出快長不發
[illegible]用者
人參　紫草如無以紅花代之　白朮
茯苓　當歸　芍藥
木通　蟬蛻　甘草

糯米各等分
右每服三錢水一盞半煎半盞徐徐服
升均湯　治痘瘡已出不均或吐瀉熱渴
升麻　乾葛　芍藥
人參　白朮　茯苓
甘草　紫草茸無以紅花代之
右每服三五錢用水煎常服之
秘方　兔絲子一味酒浸一宿焙乾為末發熱時每
一歲兒服七分量兒大小加減好酒調服其易發

易服易出用後無餘證　此方氣血弱者未出之
先可用既出之後不可用用則托出太多　此方
係胡黃谷祖仰山公在遼府東得之用者百發百
中但元氣厚者服之不免太驟乃大補助火故也
或曰痘未出之先既可服此又奚取於保嬰丹乎
殊不知保嬰以解毒而使之稀此則氣血弱不能
出者服此而托之使出也
又方　臘月梅花將開時採摘乾為末煉蜜為丸未
出之先量兒大小三四服可令豆稀加硃砂尤妙
二花散　治痘疹已出未出不發不起隱在皮膚之

間熱證並治
鷄冠花陰乾壹兩　絲瓜陰乾伍錢　桃花陰乾伍錢
硃砂水飛過壹錢　甘草去皮火煨壹錢半
右為細末每服五分半米粒時寒水調下
服前藥仍不快無諸惡候者可服八味二花散見大法
瘡食倒靨女子痘後出痘血氣俱虛又值冬寒難易
退不出
丁香伍粒　附子　肉桂
陳皮　當歸酒洗各伍分　人參半兩
黃耆蜜炙　甘草炙貳分

陳氏異功散 治痘瘡已出之間不光澤不起發根窠不紅謂之表虛

木香 當歸各叁錢 桂枝

白术 茯苓各貳錢 陳皮去白

厚朴薑製 人參 肉豆蔻各貳錢半

丁香 半夏 附子炮去皮各壹錢半

右㕮咀每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎服

右治虛寒[illegible]參耆者方

[illegible]補散 滋養氣血調脾胃能使瘡痂速出有寒證者用之加紫草木香糯米名參耆內托散

黃耆 人參 當歸各貳錢

厚朴 桔梗 川芎

防風 白芷 甘草各壹錢

桂心一分

每服四錢水煎服或為末溫水調下一錢五分

虛熱倒靨板藍根散 治瘡疹出不快及倒靨一名二聖散救小兒垂死

板藍根壹兩 甘草炙錢半

右末每服半錢取雄雞冠血三兩點同溫酒少許食後調下無時甚則三五服立效

絲瓜散發瘡疹最妙絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下或以紫草甘草煎湯調服尤佳米湯亦可

蘿蔔湯見前

煩不得眠例 痘疹煩不得眠者甘桔加梔子湯

桔梗 甘草 梔子

右各等分煎服

治痘出不快煩躁不得眠者赤解散麻黃黃芩湯麻黃黃芩湯主之

赤解散 治天行頭疼壯熱一二日兼治疱瘡未出煩躁或出尚身體發熱者

麻黃去節壹兩 大黃 黃芩

桂心 甘草炙 芍藥各貳兩

右為麤末患者以生熟湯浴訖以煖水調下二錢相次二服得汗利便瘥強人服二方寸匕風實之人三伏中亦宜用之若去大黃春夏通用

升麻黃芩湯治痘瘡出不快煩躁不得眠 麻黃黃芩湯治痘瘡出不快益煩躁昏憒或出尚身疼熱者

二方見小[illegible]

胡荽酒　胡荽一味細切　銀器以好酒二盞煎一二沸入胡荽再煎少時用物合定放溫每吸一大口微噴從頂令足勿遺勿噴頭面病人左右常令有胡荽氣即能辟去汚氣以瘄疹出快

指南有禁揩之說　言瘄疹發出因氣血虛弱不能拘領其毒以致毒盛而聚於肢體之處夫瘄之初出也或一點二點見於臂腋節之處及方廣四肢之間此瘄一出則諸瘄不得宣發成聚矣故曰禁忌其禁有五一曰胃禁二曰火禁三曰水禁四曰風禁五曰寒禁　胃禁者毒火炎胃不能發散於肌表脾胃潰

爛其外發之瘄出於唇口之間者或二三四五點相連諸瘄未發此瘄已先黃熟知由熱毒內攻胃已腐爛故諸瘄不得成聚也如唇口一見此瘄當察其面色煩紅氣穢其口臭異常皆是其驗也　火禁者小兒初發之際或因身發寒熱而誤以火熏炙其衣被或睡卧於火箱之中使皮膚乾燥故瘄毒發泄不出又兼氣虛而不能拘其毒則毒停皮膚之內隱隱不能發出肌表也細看皮內見有紅點無頭無腳或於四肢頭面方廣之處見一二點瘄子則諸瘄皆從此瘄上發泄為瘄而皮內隱隱不出之瘄終不能快出名為火禁以水楊加荊芥煎湯洗之出諸瘄自發矣輕則升麻和解散主之　水禁者初發熱之際陰陽未分毒氣方熾或誤食生冷則毒停於皮肉之間隱隱有紅點或於方廣兩腸手足頭面之際發有水泡者是也蓋冷氣在內則腹疼肚脹在外則發熱惡寒此其驗也以丁桂茯苓升麻大腹之類逐之冷食遺積脾胃須防下泄再加山查　風禁者發熱之初失於不避風則風入肌表瘄不能發或肌膚麻木不知痛癢或不麻木而乾燥或毛直而乾焦或皮癢欲搔或重則紅煩譫語此風與火搏故也治法以升麻

湯加羌活荊芥以逐之甚則荊芥蟬退以攻也　寒禁者發熱之初誤經冷水沐浴或睡卧於鐵漆寒冷之處或衣被單薄感冒寒氣則瘄必不能宣露有手足麻木不知痛癢有四肢冷痛不能舉動者有麻木冷痛之處不出瘄子惟於交曲避風之處或頭面髮際之下瘄出如瘄疹者是其驗也內以丁桂川芎升麻逐之外用綿衣以溫之余見小兒年十一二歲發熱之初卧新漆床上初因熱極父母不防出瘄任小兒于貼漆床而卧致令寒氣侵入于臂其餘四肢面腹方廣之處俱出瘄惟一臂麻木不仁無一點瘄

見苗頭發之班不知其故請予至詳察其由乃以前
方治之後見一臂痘發出比他處尤爲稠密贅痘一
出苗痘俱起凡目而至俱如故
面部形象 經曰諸痛痒瘡皆屬心火心之華在面痘
瘡心火其出先在於面之部位可以知其
候也內經曰知先在左頰者皆發太
陽之邪下傳陽明胃者與大腸積陳受朽氣血
俱多又曰爲水木界須辨屬木火爲水制不能作
過如在額角有心先出者因發太陽見于膀胱六
小腸火丙火獨旺不受壬水之制其毒併於

之經而先自額膀胱多氣少血又正額爲心火火不
務德妄行無忌心爲君主之官主危則十二官皆危
矣凡起發成漿結痂亦如此論 經曰頭者精明之府
府又曰春氣者病在頭可見頭乃人身元會聚之所
爲發生之本又面列五官分五行而五臟之氣皆見
於面是頭面者人身之象至貴至尊不可凌犯者也
咽者胃脘水穀之道路也主内而不出喉者肺脘呼
吸之往來也主出而不内在人之身猶關津要路
也痘瘡之出最要頭面稀少頸項無方見吉兆若頭
面多者謂之蒙頭諸陽獨亢五官俱廢神明失守精

竭自萎絕六府閉塞則機關不利氣止則化絕者此也頸項
多者謂之鎖項内者難出外者難入上者不升下者
不降經云一息不運則機緘窮一毫不續則霄壤判
者此也故皆不治 陳氏文中曰痘瘡稠密者作三四
次出頭面稀少胸前無點頭面者諸陽之會胸者諸
陽之所受氣此數處痘宜少不宜多以清陽之分
不可濁亂也手足雖諸陽之末乃身所役使卒伍卑
賤之職非若頭面爲元首也又屬四末非若胸膈心
肺之居神明之舍也故雖稠密不必慮也若頭面胸
項手足稠密瑣細一樣者却愁氣血衰微脾胃虚弱

不能周流灌注起發不透收靨太遲而生他變矣
凡痘子初出便自手足先出者他處未起而手足先
起他處未收而手足先收者此陽火大旺宜用解毒
抑陽扶陰之劑四物湯合黄連解毒湯主
之如他處俱起而手足起遲他處俱收而手足不收
者此脾胃虚弱不能行其氣血達於手足宜補脾胃
十全大補湯桂枝芍藥湯主之 一出紅點
數粒發於山根之上爲毒盛氣虚而毒乘虚犯上或
發三五粒一現者皆不吉之兆也宜急用凉血解毒
以防危急若腮頰地閣之間成叢發見淡血潤色三

次出者乃吉證也

出見形色　凡痘瘡之出不論疎密而論磊落若磊磊落落如珠如豆顆粒分明尖圓緊實雖密無妨此謂出盡無留毒也如黏聚成叢模糊作塊不分顆粒恰如紅痱雖只一二處亦可畏此謂之伏出未能盡若待後者再出則先者或陷而復起或癢而俱潰成壞瘡矣此猶淹延引日久而後斃者如蠶之殼如蛇之皮此氣至而血不榮也謂之乾枯如蚤之咬如蚊之喙此血至而氣不充也謂之陷伏不能引日危急而死矣　痘瘡初出與未病時皮色一般者善若瘡瘡[illegible]太赤根下皮色通紅此血熱氣不管束也後必起發太驟皮嫩易破癢塌而不可救宜急解血分之熱四物湯[illegible]加升麻地骨皮紅花紫草或消毒飲活血散[illegible]合而飲之待色少淡急補氣分之不足四君子湯[illegible]加黃耆防風木香或調元湯[illegible]參苓白朮散[illegible]合而飲之仍用血氣二方相間而服若成漿不破損者吉服藥不效反而癢塌者命也　痘瘡初出有四善紅活明潤緊實尖圓布散磊落稀踈頭子賴血以潤之血活則其色如丹砂如雞冠若焦紫血聚則遂成紫色今而焦黑者乃營血不能

流行內外壅鬱遏此證甚危其人必大小便祕喘急煩躁宜用七物升麻丸[illegible]當歸丸[illegible]通關散便祕三乙承氣湯[illegible]量輕重緩急用之以解裏之急得利後以紫草飲加味四聖散調無價散以解表之毒仍用臙脂塗法瘡變紅活以漸起發者吉若更乾黑者凶莊氏云凶瘡倒陷而黑色者謂之鬼瘡痘子賴氣以束之脾胃強氣實則肌肉厚皮膚堅今痘皮嫩薄溶溶如淫濕之狀乃脾胃氣虛其人必少食或自利宜用十全大補湯[illegible]去生地黃加防風[illegible]用天水散[illegible]一散客水調拂瘡上以解表之濕熱瘡若起發成漿者吉漸變癢塌者凶聞人氏云瘡痘作癢深為可慮能調和愛護勿令有此乃為上策　痘出如灰色白者氣虛也保元湯加官桂木通川芎肉桂最穩川木通者取通心氣也　出不紅活淡色者血虛也保元湯中加酒製當歸酒炒赤芍藥及川芎血熱者仍加生地黃[illegible]倍黃耆　痘出皮膚乾燥枯澀者必難起脹用溪中白石洗淨燒紅以井花水淬之使濕氣蒸於痘上頃間光澤甚易起又能辟穢　一出與地皮相似無肯起之意乃是紅斑急宜涼血解毒[illegible]故加酒炒芍藥紫草紅

花蟬退木通糯米通進數服或以六一散保嬰丹□□
草膏隨意用之亦可痲退以保元加木香豆蔻煎服
以解紫草之寒防其泄瀉若火疹因此如治稍遲□□
變成黑靨實痲頂陷矣大抵用紫草必下糯米五十粒
則不損胃氣無泄瀉之患痘人熱大便滑者不下糯
米以糯米黏膩故也餘詳火盛火疹條一出其紅燄赤摸
過皮軟不礙手者此係賊痘過一日後成水泡甚至
紫泡黑泡此危證也急少加保元大加紫草蟬退紅
花解之或煎燈草木通湯調六一散利其心熱而紅
紫自退如已成水泡則保元中大下四苓利之此千

古妙法也不然則遍身擦破赤爛而死　痘子初出
六顆粒但皮膚間濟濟簇簇如寒風粟子之狀或
曰形與鍼頭相似稠密無縫此皆惡候雖有良工
莫能為矣

紫草飲

紫草　芍藥　麻黃
當歸　甘草各等分
右剉細水一盞煎不拘時服

加味四聖湯

紫草　木通　木香

黃耆　川芎　甘草
人參各等分　蟬蛻去足
右剉細加糯米百粒水一盞煎服

臙脂塗法

先以升麻一味煎濃湯去滓却用臙脂於湯內揉
出紅汁就以木綿蘸湯於瘡上拭之

阮氏萬金散　治痘瘡出不紅潤

防風　人參　蟬蛻各等分
右細切每服四錢水一盞入薄荷三葉煎六分溫
服熱而實者加升麻

化毒湯　治痘已出而熱毒未解宜清熱凉血毒一
解不致黑陷血一凉不致紅紫

紫草　升麻　甘草
蟬退　地骨皮　黃芩酒炒
木通
右各等分水煎服

解毒散　治毒先發順者名為痘母後發者十有九
死先發者吉

金銀花五錢　甘草□錢　木通
防風　荊芥　連翹

牛蒡子錢叁

右用酒水各一鍾煎服　如泄加訶子荳蔻　痘紅者加炒黃芩芍藥　瘙癢者加歸身生地或加何首烏尤佳　疼痛者加赤芍藥

露桃花散　痘形一兩日後紅筋鎖或色焦紫惡濕煩躁睡卧不寧而不宜以藥下之者服露桃花散自然紅活

露桃花　紫草　紅花

白芍藥加倍　木通　生地黃

茯苓　甘草　橘皮

右用燈草煎服　露桃花性陰而和陽取時須待白露時清晨摘取飯鍋上蒸熟焙乾帶蒂入藥不可多用多用則恐作瀉若不預收多加紫草茸

芍藥□□

黃連解毒湯　痘出三兩朝身中熱烙焦紫無紅活色暴炎猛烈之甚也或眼紅臉赤或小便澀結須服黃連解毒湯加減犀角地黃湯可也

黃連　生地黃　芍藥

甘草　木通　車前草

黃芩　桔梗　連翹

牛蒡子　荆芥

水煎服或去殭蠶荆芥加麥冬黃芩心熱甚加柴胡地骨皮飽悶加人參麥冬山查氣弱不用枳查

加減犀角地黃湯

犀角　木通　生地黃

芍藥　紅花　紫草

茯苓　車前草各五分　地骨皮鮮者二

甘草

水煎服　犀角須用井水磨濃俟藥煎如度投下一服之不可和內煎也若身熱驚厥加紋銀一塊仝煎蓋因肝木旺而心火炎上故仝以魁之耳

五龍湯　痘一見形就是蚊蚤咬的形者是痘毒繫於心肝二經而然也極是犯忌痘經云臣陵於主逆天條有痘兒重篤地逆絕然和順成功去也在乃此走一遭好把化痲湯浴之內服五龍湯

黃連　紫草茸　芍藥各五分

生地黃玖錢

煎濃入水磨犀角汁和服　王氏治此多用大黃湯下之微逐其毒隨用升表之劑固為美法　下後不能提陵速致其死不若五龍之為妥也

化癍湯
金線薄荷　大水楊柳　荆芥
蒼耳草
四味共煎濃去查將頭髮滾湯洗去油垢閒桃仍
湯熱徐徐浴之必須置之暖處外再服前藥癍去
而痘自鼎峻矣
四仙散　痘起遍身俱是黑色論備載在前矣要是
元癸奪權爭先如青天晴極而雲霧霹水風動而
波行第一奇痘也只以化癍湯浴之於外而內服
四仙散自然色變而為美矣
甘草紫草斑通草三般遇此多是寶黃連連翹與
石蓮三味合浸共一妙研末惟在空心時砂糖調
服霎時好　此痘得者甚鮮非富貴之至者不能
見此若見形而盤纏失天元者不在此列　按此
即所謂殲㓕痘也雖黑而光潤圓頂峻與常痘
同得之者必主人貴
玉泉散　痘形一朝就結焦粒是臭炎徹於肝榮血
玄水弗克和解急服玉泉散庶可挽治
犀角貳錢　白芍　黃連各壹錢為細末
冰片叁分另研

濃煎甘草湯或建糖調服大者五六分小者再減
此方屢治痘焦者恒獲速効但犀角人不諳用法
必須羅磚瓦盤井水磨之待澄濁去水晒於綿紙
上略有乾燥方和前藥用之若以鐵器銼下細末
犀不漬水則不効
出疹不透　涼血解毒湯　疹出熱不退紅不分地
或痘菌乾枯黑陷急用此方可起非灌漿
紫草壹錢　生地黃　柴胡各捌分
牡丹皮柒分　赤芍藥　蘇木
防風　荆芥　黃連
木通各叁分　牛蒡子肆分　天麻
紅花　甘草各貳分
右用薑一片燈心二十根糯米百粒水煎服
清地退火湯見前
加味犀角飲　痘已出不匀心煩壯熱口舌生瘡
犀角　牛蒡子　荆芥
甘草　防風　升麻
桔梗　麥門冬
水煎服
疹因麻疹未有咽不痛者心胃有熱上攻於咽

乾靨而發宜於發熱初出之時預解之甘桔湯加牛蒡子甚者射干鼠粘子湯令毒火解散不停留於咽喉之間致生他變也若初時輕忽不即解之以致毒留咽喉發而為瘡腫脹潰爛水漿不入呼吸不能聲啞難言却欲呼醫悔無及矣所以甘桔湯瘡出之後常宜飲之利咽喉寬胸膈清肺金解毒火也如兼口舌生瘡齒浮齦腫者宜甘桔湯合黃連解毒湯加牛蒡子水漿不入者射干鼠粘子湯加桔梗荆芥穗山豆根也上證俟須能食臟腑亦熱方可用如上焦雖熱却覺小便清大便溏飲食不進者只用甘桔湯不須加牛蒡子益其性涼為瘡疹所宜服者能透肌出癍癢是以瘡疹亦出也大便利則不可服

甘桔湯　　射干鼠粘子湯 咽喉

護目 痘瘡方出之時使不入目以神應膏塗眼四周或只以臙脂取汁塗之或傅以水調黃蘗末或以牛蒡子為末蜜調貼顖上或以白芥子末水調塗足心此皆養護之良法也若眼中流泪或多眵或目中紅赤此肝火大旺宜早解之洗肝明目散加蟬蛻又有忌食之法如釀浮滋味牛雞猪鴨皆不可食食雞猪鴨卵未有不為目害者但令食淳淡之物或少入鹽亦無害如澂臨之家不可煮雞鴨以助其氣相觸能損目不可不知

神應膏

黃蘗壹兩　菉豆粉壹兩　甘草肆兩

紅花壹兩

右為細末用臙脂水和蜜水調塗兩眼四畔之瘡瘡上

黃蘗膏　如瘡疹已出此藥塗面次用胡荽酒外治法

黃蘗壹兩　菉豆粉壹兩半　紅花貳兩

甘草肆兩

右同為細末生油調從耳前至眼眶並厚塗之日三兩次如早塗瘡不至面縱有亦少 彭氏云痘疹護眼人多用臙脂搽[illegible]

痘瘡初出用鼠粘子為末水調傅顖門並無患眼亦妙

洗肝明目散 眼目

夾疹夾斑 錢氏云痘瘡只出一般者善凡痘初出其間碎密若芥子者夾疹也皮肉紅腫成片者夾斑也疹出心熱斑由胃熱宜急解其毒治疹用黃連解毒

湯（痘疹）合消毒飲化斑用人參白虎湯（痘瘡）合消毒飲或只以升麻葛根湯夾疹者加防風荊芥穗木通麥門冬黃連夾斑者加石膏人參大青玄參淡竹葉如疹散斑解現出正痘跡終停匀者吉痘被斑疹夾雜不能起發者凶

【疱瘡】聞人氏云傷寒熱邪在表裏未能作汗或當汗不汗熱鬱於肌膚故發疱瘡色白或亦如火丹頭作漿白膿者輕根下紫色隱隱在肌肉者重甚者五內七竅皆有之其形亦如痘小兒肌肉嫩薄尤多此證非正瘡痘也又云六腑屬陽有熱則易出是以作瘡瘡一出即遍滿肌皮之上如痱瘡細疱子見而便沒其所受氣淺故也五臟屬陰有熱則難出其爲瘡痘在肌肉血脈之間必先發紅斑而後如豆故名瘡痘其所受氣深故也大抵藥熱而使出者必膚疹久熱而漸出者必是正瘡痘膚疹非正瘡痘也愚按痘瘡初出五臟不同肝水疱其色微青而小肺膿疱其色微白而大心爲斑色赤而小脾爲疹色赤黃而淺及五七日之後不問其初出自何臟悉成血疱血疱成膿疱正如豆樣膿疱之後結痂疤則愈此方是正瘡痘也或人疑之曰肺既爲膿疱而血疱之後又成膿疱者何耶蓋膿疱之出於肺者言其初時淡淡如膿其色白而非黃俗稱白痘者是也若血疱之後所結膿疱則是其瘡已熟（熟）如果之成實飽足充滿包裹黃膿其色黃而非白也

【子母痘】夫痘發於心者必湧出而無漸經於腎者必沉匿而難見（痘）若有子母者非肝肺脾三經來者或作兩三次而出（出）或作四五次而出（出）或一邊灌漿一邊表發或同出而旁際處痘又繼出或頭面先稀少身體多布列而後上焦又添出焉或身體先稀少頭面多布列而後下焦又倍出焉此所謂子母痘者也蓋因元氣以漸而至（至）以漸而微不失之峻迭以貽臭勝之患不失之隱滯而踵攻發之害疔斑消溶於起點之時癰毒自能除於膿痂之後非陽明胃太陰脾二經并充致也世俗以先標者謂之望痘後出者謂之贈痘意有在焉

【痘後】瘡疹本不因熱而出然發其則其出便難故斑點未見之時惟當用平和藥如升麻葛根湯參蘇飲（飲）或更加風粘子湯（湯）大保安散（散）皆解利之或有不問虛實便以平熱之劑入發之遂之虛者猶庶幾實者之人熱[illegible]閉塞[illegible]其者大便

不通小便如血是謂鬱毒不散毒氣無所從出反攻臟腑表毒盛者瘡凹而不起遂成倒陷或爲潰爛或爲癰瘡當此之際不能解利千於斃者多矣是陽盛熱熾無陰氣以感之也用消毒飲咽喉七物升麻丸初熱得毒氣解散榮衛流通痘子將自起矣

見形三朝先死

凡小兒發熱三日之間熱退身涼涼而復熱熱而復涼然後報痘從口角頰腮上兩兩三三成對報點至三四五日出齊者順之兆也其或發熱只一日或二日即見紅點或吐瀉腹痛或戰慄身溫不食昏悶三四日痘不起發不光澤慘暗不明根窠色白皆虛寒之候也所謂險也可治而愈苟發熱太甚煩躁悶亂喘急不食反熱而復涼連熱一舜突出紅紫黑色不起潁不光潤爲表中實熱或白太陽天庭方廣出起皆凶之兆難治

報痘時頭面稀少胸前背後皆無根窠紅潤頂尖凝手如水珠光澤者吉也不必服藥

報痘時煩躁不寧腰腹痛不止口氣大臭出紫點者死　亦有出青斑如藍靛色者皆死證也

報痘時色白皮薄而光根窠全無紅色或根帶一點紅三五日即長如菉豆大此痘决不能灌漿久後成一包清水擦破即死不可因其好看妄與下藥

報痘全不起頂又尖如湯泡及燈火燒之狀十日後癢塌而死

報痘時起紅斑如錦紋者六日死遍身如蛇皮者死

報痘時黑斑如痣狀肌肉成塊黑者即日死

痘身發熱未透而即報點現標已而復沒不見又出又沒者謂之弄標痘蓋痘瘡全憑熱透則肌膚通暢自然易出今熱不透則地皮未熟出而復沒隱而又出氣血衰弱之甚無力發越故也難治

痘色紅紫焦枯貼肉不起皮厚黑如鐵挑之不破黑[illegible]血者謂之鐵甲痘乃氣滯而不營血枯而不潤窮礪皮肉八九日內死

凡瘡子已出頭面要稀疏磊落須頂上宜少不宜多胸前要少而疎如此者其毒則輕如面上模糊一片未發先腫纏項稠密胸前亦密此毒甚也勿治

凡痘子出盡正將起發其中有發血泡者此毒伏於心即死有發水泡者此毒伏於肝旋見癢塌而死

金壇王肯堂宇泰輯

痘瘡中

起發證治

〇痘瘡之發熱三日出三日後方起發此常論也蓋先出者先起後出者後起痘疏毒輕氣實厚者自易出易發易靨痘密毒重氣虛薄者自難出難發難靨未可拘定日數時師不究虛實補瀉之理但於起發之初便用補脾果內氣不足少食者用之允當若內實便秘能食之人寧不黨邪為惡乎非徒無益而反害之　痘瘡之出有輕有重觀其形狀即可知之如一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外微紅者輕外黑裏赤微重也外白裏黑至重也瘡端裏黑點如鍼孔者勢劇也青乾紫陷昏睡汗出煩躁熱渴腹脹啼喘大小便不通者困也善用藥者能使輕者易安重者不致大困斯可謂之十全矣　凡痘瘡疏則無毒密則有毒痘疏毒少者邪不勝正其氣和其勢順不須服藥痘疏密佈散邪正相持其氣病其勢險此宜抑邪扶正使邪氣亟奪不為正氣之賊痘稠密無縫正不勝邪其氣弱其勢逆善治者什可救其二三不善治者束手待斃而已故順者不必治逆者不可治險者乃治此以下專言險逆者之證治也　痘子輕者作三四次出大小不一等其起發亦先後循次大小分明不相連串顆粒尖圓根窠紅活光壯肥澤此表無病飲食如常小大便清潤此裏無病表裏無病大吉之兆不須服藥　凡痘密者多難起頂但欲皮厚有膿漿色以燈影之苟非皮薄水泡光潤雖平亦無傷

凡痘子出得稀疏者自然易發易靨不可妄治若痘稠密常患其發不能透宜細視之但紅活不甚長大者氣不足也用四君子湯合勻氣散加燒人屎治之如焮腫色帶紅紫者血熱也用四物湯失血合消毒飲見形加燒人屎治之如不潤澤而乾者此血弱也用活血散加消毒飲與之如不起發不紅活平塌灰白者此氣血俱虛也用十全大補湯見加燒人屎牛蒡子與之如有青乾者內服快斑湯見形加燒人屎合奪命丹見形與之外用四聖散疔瘡合臙脂塗法或用胡荽酒俱見形或用水楊湯浴法務求光壯紅活而後已如中間有成水泡者防其癢塌宜先補脾胃

疎風瀉火使肌肉會不作癢可也十全大補湯方見加
防風大力子主之
瘡子起發只以出勻為期不可拘定日數務出以漸
其發亦以漸謂之適中若也一齊湧出便皮肉虛腫
一齊焮發者此表氣虛毒氣倂潰而出表虛不能收
斂必生癢塌或成潰爛急宜救表十宣散調無價散
活血散合消毒飲相間服之若出已盡當起不起或
起不透此裏氣虛毒氣留伏痘遏而不出必增煩躁
腹滿喘促或後為癰毒急宜救裏十全大補湯合勻
氣散或參苓白朮散調無價散服之　痘至四五停

住不甚起者必後力宜助之用生黃耆參伍錢人參
貳參錢當歸鹿茸壹貳錢煎服或磨入木香少許兒
大者倍之俟漿滿足而止
十宣散見后
活血散即芎歸湯
當歸　川芎各等分
右為細末每服壹錢紅花湯調服
消毒飲見形　十全大補湯并
勻氣散見形　參苓白朮散并
無價散倒靨

參耆四聖散　治痘瘡已出六七日不能長不生膿
或癢塌
當歸　芍藥炒　黃耆
川芎各等分　白朮　茯苓
紫草　木通　防風各等分
糯米
右水煎母同服
胎元散　痘不起發不紅潤是血氣俱虛
胎元者乾為末加麝香少許酒調服參伍分
獨參湯　治陽氣虛弱痘瘡不起發不紅活或膿清

不滿或結痂遲緩或痘痕色白或嫩軟不固或膿
水不乾或時作癢或畏風寒
用好人參壹兩生薑伍片大棗伍枚水二鍾煎八
分徐徐溫服嬰兒乳母亦服
乾枯灰白紅紫黑　凡痘如將出成就之際却色淡不
正者為血虛宜用補血藥當歸川芎白芍酒洗之類
或加紅花　如將成就之際却色紫不正者為熱宜
用涼藥解毒升麻芩連桔梗連翹之類甚者用犀角
屑　如用後頂滿平正者宜兼用上項藥治之仍不
痘瘡之毒必藉氣以呴之血以濡之而後可得成熟也

故於起發之時光壯者氣有餘也肥澤者血有餘也
氣血有餘表裏俱和不須服藥如形長大而色枯燥
者此氣至而血不榮也宜四物湯(見今)加人參麥門
冬色紅潤而形平陷者此血至而氣不充也宜四君
子湯(不能食)加黃耆官桂川芎(形平陷)(一云倍參者)此氣
血俱不足也宜十全大補湯(去)合無價散(即無價)主之
色灰白者氣虛也四君子湯加黃耆當歸官桂色紅
紫者血熱也四物湯加紅花地骨皮牡丹皮
凡痘瘡起發遲滯頂平色灰白者氣虛也其人不日
食少脾胃不足人參白朮散(渴)去葛根加桂十全大

補湯(形)去地黃加木香主之如倉有吐瀉以致氣弱
者四君子湯(不食)合益黃散(脾)主之瀉未止者四君
子湯吞肉荳蔻丸(泄利)甚者陳氏木香散主之(泄利)
若紅紫色燃脈(方)血熱也四物湯(方血)合消毒飲(見
形)加紅花外用臙脂塗法(見上)解之乾枯者血虛也
四物湯加人參麥門冬地骨皮外用臙脂塗法水楊
湯浴法(見白芍)
起發之時根窠紅活形色潤澤者此血隨氣行灌注
瘡自然紅活肥澤不須服藥如雖起發乾枯無水
謂之不肥澤帶白而紫黯色謂之不紅活其變為黑陷

乃血虛也四物湯(見前)加人參麥門冬紫草紅花
間進調無價散(見前)或不服者命丹(見形)外用臙脂
塗法(見形)
水楊湯
水楊柳五觔淨洗春冬用枝秋夏用枝葉剉斷用
長流水一大釜煎六七沸先將三分中一分置浴盆
內以手試不甚熱亦不可太溫先服宜用湯藥然
後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯為度不拘次數
祛邪湯　痘瘡天花最忌諸穢臭惡血五六朝間痘
本美麗鼎峻而一時失防或觸於腥血或感於穢
臭倏忽更變外宜祛邪湯浴之而內服玉樞正氣
丹可也

雞毛(拔去翎軟者)　升麻　荊芥
木通　紫蘇　荔枝殼
水楊條
右用水煎湯去渣洗浴
玉樞正氣丹
玉樞正氣丹功從什地紅花併甘桔參耆須倍橘
紅杠蟬蛻防風藏愛並貫谷相朝嫩桃抄五箇和
糞甘草列煎濃投酒服須臾不覺痘自還元吉

頂陷起發之時不徐不疾以漸長大尖圓蒼落光壯堅實根脚紅活此氣充足載血而行透徹諸痘自然尖圓光壯不須服藥如掀紅活頂平中陷不成尖圓色嫩皮薄不能堅厚其變爲癢爲瀉爲留伏纏遲乃氣虛也四君子湯不食 能食勻氣散見形 加黃耆官桂或人參白木散渴 加黃耆官桂防風或保元湯大法 加官桂防風白芷荊芥穗或十全大補湯方 去地黃加防風白芷或十宣散見痘 皆可選用若發皮薄色嬌淫淫如濕者此氣不勝血宜補氣凉血四君子湯四物湯去川芎地黃加黃耆官桂防風荊芥穗如痒癢

痘起發中無水者此氣不依血血不附氣其變爲癢爲癰腫十全大補湯去白木加大力子連翹防風實人參 痘瘡起發尖圓爲貫如四圍起中心平陷者此有二種有血化成水四圍高起心中略低凹者俗呼爲茱萸苗此中氣不足發未透徹故耳能食者至養漿之時盡充滿而起矣不能食者宜扶中氣人參白木散主之有四圍湧起中心落陷無水猶是死肉其形如錢宜急攻之若待漸變黑黯不可爲矣此名鬼痘四君子湯合九味順氣散加燒人屎或紫草飲出不快 或紫草飲子連進服之外更用臙脂塗法見形

出齊後痘有小孔自頂直下至脚不黑不白與痘色相同名爲蛀痘皆因表虛而腠理不密成此證也失於早治大泄元氣不起不斂[illegible]不旋踵急用保元湯下生糯米川芎肉桂[illegible]提經連進二三服必待孔閉而[illegible]則爲丁矣頂陷色白皮薄晶光者[illegible]也大下保元倍加酒炒黃耆肉桂川芎丁香炙皮人乳好酒進之

九味順氣散 又名勻氣散

白木　白茯苓　青皮

白芷　陳皮　烏藥

人參各伍分　甘草炙 各叁分　木香叁分

右銼細水一盞煎七分去查溫服

[illegible]

紫草茸　人參　白芍藥

蟬蛻　甘草　穿山甲各等分

右銼細用水一盞煎八分作三四次溫服

內托散 治痘瘡根窠不紅[illegible]色不起發根窠不紅內托排化

人參　甘草　肉桂

白芷　白芍藥　川芎各壹錢

黃耆伍錢　桔梗　防風各貳兩
川芎　當歸伍錢　木香貳錢
右水煎服　渴加訶子肉　肉荳蔻　有癍減肉桂
加紫草酒炒黃芩黃連牛蒡子之類

治痘塌陷不起迴陽丹

此方用於出痘前與劑前只効其速若用於六七日後則噬臍矣製法將臘月將生胞羊酒洗淨隨用黃麻纏摠一團把臘糟裹外置新瓦上四圍炭火炙之候其外糟焦了如炭樣削去其糟再焙乾另爲末入官桂末丁香末各伍錢人參末壹兩木香末參錢再研極細升麻煎酒藥調服十歲以上服二錢十歲以下服一錢十五歲以上服三錢年多服多年少服少加減而用無不獲効若加大附子壹兩去木香則爲附子迴生丹胞羊須預覓屠肆過便收製若特殺傷生大不仁

痘黑陷　此證由心中出迎四圍乾平無水者或裏紅外黑者此由不曰感受風寒皮膚堅未以致痘毒鬱而不發宜桂枝葛根湯初熱十宣散見形以散表邪外用水楊湯浴之見出形

痘陷　痘於起發且於顆粒分明如其彼此相串皮腫肉潰爛於本處內傷旋出小瘡攢聚胖大漸成一塊此候緊著宜以快斑湯合消毒飲俱見出形加燒人屎服之更禁忌以防擦癢之變

陷伏　痘瘡以起發光壯紅活肥澤爲順若將起發之時間有乾黑不起者須急治之不可因循以致傳變多不可救藥矣

痘瘡四不出謂之伏外而復入謂之陷痘瘡黑陷當分

一則感於寒肌竅閉塞血凝而不行必身痛四肢微厥癍點不長或變黑色或青紫瘾疹此爲倒伏也宜溫肌發散桂枝葛根湯初熱加麻黃蟬蛻或以紫草飲出不快奪命丹見出形外用胡荽酒噴之須令溫散寒邪然後熱氣得行則其痂自長矣

二則毒氣太盛內外熏爍毒復入裏必心煩狂躁氣喘妄言如見鬼神大小便秘澀而腹脹此爲倒陷伏也病邪輕者宜利小便解毒連翹湯通關散俱見便閉甚者以百祥丸牛李膏俱見黑陷以瀉膀胱之毒令陽氣復還脾胃溫煖服之欲飲水者可治是脾強勝腎腎者當復出矣若加以寒戰身冷汗出耳尻反熱死然百祥丸太峻今以宣風散餘熱三乙承氣湯便閉

伏之外以木樨湯浴之見前
三則內虛而不能使陽氣以副榮衛者出而復沒癍
點白色或黑色其人必不能乳食大便自利或嘔或
厥此胃虛而不出謂之陷伏也宜用溫中之劑令其
胃緩榮衛復行則當自出矣宜調元湯六十加丁香
官桂理中湯泄利加黃耆官桂甚則陳氏木香散泄
利異攻散泄利不皆可用也外用胡荽酒見形噴之或
因誤下之後毒氣入裏而黑陷者則宜溫養而未出
之先以理中湯溫養其裏後以桂枝葛根湯疎解於
表也不出再加麻黃

四則彼房室等雜穢惡氣衝觸而黑陷者則宜熏解
之內服紫草飲子見前外用胡荽酒噴之及茵陳熏
法餘詳前禁忌條內

茵陳熏法
用乾茵陳研末搗棗膏和丸如雞子大曬乾烈火
燒煙熏之

大便 凡痘自起發之後大便常宜堅實緣小兒脆弱
身熱而大便不通者則易實大便自利者則易虛雖
四五日不便無害也不能食者聽其自便賴舊穀氣
爲養至五六日後則膿成而化解利之劑可用也能食
者二三日後不通不腹滿不裏急後重則亦不必攻之
可用膽導法便閉導之不通以當歸丸便閉微令潤
通使氣道升降無壅滯之患不可妄下 凡能食者
大便喜潤賴新穀以爲養若治之不留自然臟腑
流利血氣和平不可妄用溫補及增其熱之證 胃
主腐熟水穀大腸主傳送已化之物故食多少可以
知人穀氣之虛實大便滑澀可以知人臟腑之冷熱
大便如常是亦痘疹之一順也如起發之時忽然泄
瀉此宜急止之恐腸胃虛其氣脫也須辨冷熱虛實
如瀉而手足冷面色青白瘡不紅綻者冷證也理中

湯丸豆蔻丸泄利益黃散泄利甚則陳氏木香散泄利
異攻散泄利不皆可用也瀉下之物黃色酸臭渴手足
心熱面赤瘡紅綻焮發者熱瀉也黃芩湯泄利五苓
散泄利主之 一顖門怯弱精神慢而不食者爲虛當溫
養之益黃散 身熱中滿渴而不食者爲實當清利之
五苓散甚 或臟氣自脫或因服寒藥致令瘡毒陷
入大腸瀉下如豆汁或便膿血或便黑汁日內臭氣
辟焦日期加腹脹者必死之證 方論詳泄瀉本門
不二散 治痘當起脹泄瀉將泄瀉不止以此止之
只一服愈如服此不已是元氣已脫不可爲矣 二

蓮肉（壹兩）去心　[illegible]

右各取淨末和勻每服三四分米飲調下　此方不但止瀉亦治煩躁蓋大腸之滑脫易知也飲心火之浮游難知也

【手足】痘瘡起發欲透惟四肢稍遠難得均齊必脾胃素強能食多者不須慮此若脾胃素弱又食少者手足上瘡常發不透蓋脾主四肢脾虛則不能行其津液溉灌四肢所以發遲以補脾為主快癍越婢湯如不令透其後手足必作癰毒又手足瘡痘多發水泡者此肝乘脾也先瀉肝羌活湯（發熱）加柴胡後補脾

人參白朮散（瀉）去葛根加桂如見而復隱起而復塌色紫黑者此腎乘脾不可治

快癍越婢湯

黃耆（炙）　白芍藥　桂枝

防風　甘草（炙）

右剉細加生薑一片棗一枚水煎溫服不拘時

【頭面】頭面為陽瘡疹亦為陽以類相從故出現起發收靨自頭面始升生浮長陽之性也痘瘡起發頭面以漸腫大升生浮長之性不須憂恐只要瘡子磊落紅活光壯肥澤各各成膿之後毒化結痂而腫亦漸消矣如瘡粘連通串模糊成餅者又要紅活潤澤以快癍湯消毒飲（方見）合而飲之或消毒化癍湯以解其毒更以甘桔湯（咽喉）加牛蒡子相間與之以利咽喉寬胸膈令飲食無阻也又以胡荽酒護目（見形）若灰白青黃乾燥瘡面焦起者皆死證也其頭面腫有不閉目者毒淺而輕有閉目者毒深而重亦待瘡熟腫消而目自開若瘡不成腫消目開者此將死也勿治

消毒化癍湯

升麻　柴胡　桔梗

甘草　龍膽草　牛蒡子

連翹　防風　蟬蛻

密蒙花

右剉細加淡竹葉十片水一盞半煎一盞去滓食後服

凡將起發頭面預腫者此時行疫癘之氣名大頭瘟其毒最酷急用羌活救苦湯解之

羌活救苦湯

羌活　白芷　川芎

蔓荊子　防風　桔梗

黃芩　大力子　連翹

升麻　人中黃各等

右剉碎加薄荷葉七片水一盞煎七分去查食後溫服

【痘疔】痘疹之毒自內而出衝突氣血發散腠理初出一點血乃身中氣血被毒驅逐現於皮膚之外其成形者氣也成色者血也毒火太甚煎熬氣血先至之氣則削矣血則枯矣氣削血枯腠理反閉毒不得出未免復入於裏遂成陷伏將人以黑猪子為痘疔又曰鬼痘者深惡而畏之詞也此乃毒氣鬱遏非外感風寒內虛吐利雜氣觸犯者可比古人立方如大小

便秘腹脹煩躁者則下之但大小便秘者則利小便解毒自利者以瀉膿血為順水穀為逆却不立方以毒雖入腹皆瀉出也攻之則無所攻補之則不可補昏悶不醒者用龍腦膏子[illegible]以去心中之邪枯黑不起者或內用無價散[illegible]以解在裏之邪或外用水楊湯[illegible]四聖散[illegible]臙脂塗法[illegible]以解其表使邪氣得出皆良法也然丁者令下即下令利即利合發即發或解其裏或解其表應變出奇勿泥常法可也

【發泡】痘瘡發泡亦與黑陷相類外出內入雖不同而其氣鬱則一也或發水泡或發血泡或赤或紫或黑但見此證十無一生然亦有似是而非者不可不辨其人身上原有瘡疥或破傷疼未痊或雖痊瘢痕尚嫩一旦痘出則瘡瘢四圍痘必叢集者物從其類之理也發生之後必然作泡者腐敗皮肉氣色先變宜與完膚有別也治此者先以鍼刺破洗去惡血後以臙脂塗法[illegible]合化[illegible]傳之此瘡又易作癢起發之後常宜以肉[illegible]法[illegible]護之勿令爪傷若被爬搔則反覆灌爛淹延不愈變為疳蝕壞瘡以致不治者多矣

【發痘】痘起六七朝膿漿未曾充稔頭面身背或手足四肢遍起水泡或似葡萄樣或似鸞了大或如破[illegible]內肝榮不能以資泡而肺金竊勢以凌傷爭服三化丹歌曰七例泡起勢相凌三化丹中二味全白朮茯苓俱[illegible]兩[illegible]般法製用工深一兩要同歸酒浸一兩和炒乳[illegible]蒸一兩再和雞附煮一兩分與炒米停為末必須酬醴服自然泡裏注黃金痘裏起泡多患乎膿漿不能充滿若虛泡結軸十中八九泡內微有膿漿滋養凡爪抓擾兩儀寒剝之剩毫不可救或單川芎大湯和人參酒服但恐癢作而泡潰死在旦夕耳

起發不透　凡痘起發欲透頂磊落尖圓光壯肥滿者上
也根脚橫開皮起水泡者次也頂皮不起根脚不開
猶是先出之形不見新生之水此謂起發不透當查
證候如氣本實者必曾感風寒以桂枝葛根湯（發熱）
合奪命丹（見形）發之如氣本[illegible]或食或吐利以
人參白术散（渴）合奪命丹以補中氣而發表邪如欲
成陷伏者依前四法治之若將日已多發猶不透或
煩躁不安者此毒熱在裏心惡熱以導赤散（心）送服
牛黃清心丸（痘瘡）以解散熱毒熱引心火也或啼哭
者凡人五臟平和則神宇安靜今五臟熱毒內外熾

神不安舍以導赤散送服安神丸（痘瘡）使毒熱解
而[illegible]清快也若瘡[illegible]妄有見聞特狂叫者此五臟
總積陽氣獨盛無陰氣以和之大便必不利以
當歸丸（便閉）微利之再行膽導法（便閉）使無留滯易
快利也甚則三乙承氣湯主之（便閉）若昏不知人腹
脹喘呼死證也
雞鳴散　男女發熱三四五日或痘未形或痘形隱
隱或纔形於外而不能快利或煩躁譫語或腹疼
嘔吐或痰喘惡渴急服此藥則毒自表出矣

炒术　當歸　川芎

甘草　大力子　茯苓（等分）
木通　桔梗　蟬蛻
升麻　橘紅　山查
紅花
燈草生薑煎臨服入雄雞血并酒妙
震蟄丹　小兒熱三四朝痘或隱隱伏於皮膚或形
於頭面一二顆或標於身體四五顆上不宜補下
不宜瀉當服震蟄丹穿山甲肆錢酒洗淨和砂仁
陳米炒捲去砂仁米用白芍酒漿煮焙肆錢紅麴
叁錢紫蘇叁錢和勻共研細為末每用酒漿量兒

大小增減大者一分小者半分若踰十二三歲者
斟酌加之用升麻煎酒調服其効立見
天元接髓丹　男子十七八歲或二三十歲破陽虧
元倏一時患痘稀少者雖年大無妨倘多密連布
欲其肥峻充滿勢必難矣急服天元接髓丹
歌曰男兒陽破痘來臨不遇奇方坐視沉天元接
髓丹功捷世上醫家盡不明真正酒漿澄十碗一
毫酸苦莫相侵人參黃耆各貳兩橘蝉歸地半加
添鹿茸乳炙壹兩半附桂半兩要調停慢火甕中
煨熟後去查出火莫仍斟酌鍾入乳三杯和溥溥

生薑二片存此乃一潮仍濕服立建奇功者有神
此方屢獲明効但製法要詳明當歸去頭尾懷地
揀鱉軟人參覓清河黃耆選綿白橘紅連木蒂蟬
退要身全附子連皮臍官桂削外皮煨將度候只
以米熱驗之入乳取來就不宜過夜入壓辛酉年
杭城邵語溪子年一十八歲下叅弱患痘痘勢
沉匿不起單以此方倍加人參服之竟後保全一
內托散 痘不起發根窠不紅或灰白色咬牙寒戰
等證
人參 黃耆 甘草

川芎 當歸 防風
白芷 桔梗 白芍
厚朴 木香 肉桂
右薑一片棗一枚水煎服 色紅紫者去肉桂木
香加紫草蟬退 漿不滿水酒各半煎服 色淡
白者去防風白芷加糯米 大便燥加人乳
治孩兒白日果痘歌曰全蝎要身全五箇蜜焙乾蟬
蛻不可脫完身又完足五箇酒漿洗和炒研細末
再加酒芍藥砂糖調來服自然痘森森那怕月不
足 川果患痘稀疾若多容惡者少變蒸未踰猛

痰之痲不宜多服以其燥陷白投百効
痘至五六朝忽然手脚牽痲一團不知者以爲驚使
然耳豈知陽明受熱毒之蒸鑠而筋絡不能榮血以
滋養故也理之 把縛須服羚羊散歌曰
白芷羚羊壹兩術木通紫草生地黃芍藥鉤藤全
蝎桔橘紅甘草荊芥防按法服來隨受用誤者驚
治即多傷 此痘多起於四五六朝則爲是若起
於兩三朝則爲驚搐若起於八九朝則作寒戰治
之可也羚羊角必取其銳尖處用之
陽毒 七日前陽毒者凡瘡也以兒未出痘之先或生

疥瘡有形窠而成膿因而發熱出痘者或凡瘡未痊
而出痘者或凡瘡方結成瘢因而出痘者蓋凡瘡
及初結瘢處肉分必虛毒趨虛處而出故陽瘡
出猶爲一驗氣血俱盛則易成漿氣血衰弱則枯
燥乾紅與諸瘡俱不成漿治法與頂陷同
起發最忌泄瀉故特著之其他證候如發熱痛癢腹
脹煩躁譫妄等各有本門宜就彼中杏之茲不贅敘
起發吉凶 凡痘放標以後漸漸起脹先出者先起後
出者後起微紅光潤根窠明潤的口漸肥能食無雜
證者吉 大抵痘脹一分則灌出一分至六七日不

黯脹又黑陷者死一身有涕口有涎眼有淚者可治
俱無者大凶　凡痘子已出日放標之日筭起如當
起發不應有漿先有賊漿者如當作漿不應收靨便
有乾收者此皆惡候治之無功　口唇者脾之外候
人以脾胃為本不宜受傷如初發熱唇焦裂者此毒
發於脾便宜用瀉黃散解之不知早治痘子之出叢
集於唇及至起發之初諸痘尚未成漿此痘已熟內
帶黃漿者此惡候也待諸痘成漿此瘡已靨唇皮揭
脫漸變嘔食飲不入昏睡而死矣　大抵起發之初瘡
頭便戴白漿者不分何處並非佳兆不特口唇為然

凡痘瘡初出一點血血化為水水化為膿膿成而毒
解此自然之序也若初出之時便是水泡或纔起發
便有帶漿者或未成膿即乾收者火性躁急失其自
然之序不應至而至所謂早發還先萎也此毒火所
為倏忽之間散息氣盡而死矣　痘瘡最要以漸起
發漸落紅活如一發將起無復顆粒糢糊串連不紅
活帶灰白色而上浮腫如錫餅形此惡候也其人能
食大小便如常無它證候者吉若食頓減或原不能
食者凶　凡起發之時痘瘡稠密又見悶伏煩躁狂
叫之證或口中出臭氣者此毒火熏蒸肺爛胃敗之

氣也或不飲食失聲者此咽喉腐爛也寒戰咬牙者
邪傳腎也或悶亂者神已去也或肢寒者陽脫也或
嘔或瀉者腸胃俱敗也經云五藏氣絕於內者利不
上六府氣絕於外者手足厥凡見已上諸證者皆不
可治

【驗】痘瘡初出一點血只成小小血泡起發則漸長大血化成水爲水泡至水泡轉作膿泡始成實矣成實之時却要箇箇成膿肥澤飽滿根脚紅活又蒼蠟色如此者可以刻定日數而知收靨之期　痘瘡初出或中心陷下者或頂平者或根窠白色者其人能食或治不專方以至起發之後陷者盡起平者復尖白淡者變紅活窠中血水已化爲膿夫陷起平尖起發可謂透矣紅活飽滿氣血可謂足矣水化爲膿毒亦解矣表無癢痛之證裏無吐瀉之證是表裏又無病

矣如此者坐待收靨不可妄投湯劑　痘子輕者常作三四次出有大小有先後起發亦作三四次先出者先起後出者後起大者自大小者自小亦如初出之樣待至養漿則先長者先作漿後長者後作漿大小亦如之磊落分明不相粘連者上也痘子密者長大胖壯以至作漿未有不相串者只要陷者盡起無處不透轉成膿漿次也膿成之後毒氣已解無復留伏矣　人言痘瘡只到成膿則毒氣化解便稱無患不知膿亦有凶有吉如蒼皮堅厚膿漿渾濁約束完固無以破損此其吉兆若嫩皮軟薄膿水清淡滲漏浮泡易於破損此猶在也惟痘久熟時日已過當靨不靨者則膿復化爲水皮亦易破勿依此論

痘瘡起發之初已當避風寒遠人物節飲食守禁戒到此養漿之時比之起發尤加謹焉可也蓋前此人病未久氣血猶強足以禦重災之疑至此則氣耗血虧精神減損少有乖戾不能任之况倖始成就尤易觸犯不可不加謹矣如天大熱則微去衣被令常清涼但謹門戶幃帳勿使邪風透入天大寒則添厚蓋覆令常溫煖更用親人左右夾之房室中可明亮勿絕燈火常燒辟穢香加乳香令香氣襲人日夜常用

一人看視互相更代勿令疲倦恐或作癢爲之撫摩莫使誤破以致潰爛結痂不美

辟穢香

蒼朮壹觔　大黄半觔

右判細捻放火爐中燒之不可間斷

【不作膿】凡痘瘡出欲盡發欲透至於養膿便要成膿飽滿者膿已成也渾濁者膿之形也黄白者膿之色也若當作膿之時猶是空殼此氣載毒行血不附氣毒者血也血既不至則毒猶伏於血中而不出四物湯失血合紫草飲見形加蟬蛻主之如已成水清淡

灰白不能作膿此氣血俱虛所有之水乃初時一點血氣解而為水非自內潮起之水十全大補湯（方主）之此二證者為癢塌為難治不可不知也　痘瘡初發之後正待作膿却不作膿者此與不起發而黑陷者分四證同論如感風寒則當溫散桂枝葛根湯（初熱）加黃耆白芷防風毒氣盛則宜托裏解毒利小便紫草飲子（起發）連翹湯（便閉）相間服之大便秘者宣風散（痘瘡發熱）內虛宜溫裏十全大補湯陳氏木香散（泄瀉）觸犯宜熏解內服紫草飲外用茵陳熏法（起發）若煩躁昏悶者龍腦膏（瘡黑）　薛氏云若灰白色或癢而膿不貫用紫草四君木香色赤或癢而膿不貫用紫草木通湯（出快）不貫而膿清稀用參耆內托散（癢塌）不應加附子緩則不救　秘要云頂陷無膿為逆急用保元加川芎肉桂歸芎木香糯米煎熟加人乳好酒溫服　色白如水晶內無膿者宜保元加糯米人乳好酒進之　按病者元氣素弱或出痘時因稠密故服解毒之藥太多或起發時曾有吐利等證俱傷元氣雖用參耆等助發膿漿而猶恐元氣薄弱止灌清漿或缺而不滿且有癢塌難治之慮宜於前藥內加上好鹿茸及紫河車凡藥仍進八味二花散為妙

俱見痘形初出至漸起發必透身得氣膿漿之時去不作膿往往變為壞證者或因其人不能食脾胃虛又自利不知調理者或出未盡發未透毒氣陷伏妄談稀疎者此皆人事之不修非天時之所然也

六一湯（專發痘瘡之膿）

黃耆（六錢）　甘草（一錢炙）

右㕮咀每服二錢水六分煎入酒二分同煎至半盞溫服更加橄欖同煎尤好加山藥亦得

助漿丸　治痘瘡七八日漿稀不來者急服

黃耆（蜜炙三兩）　白芍藥（酒炒）　當歸（酒洗各壹兩半）

鹿茸（鮮者色如琥珀作鹿角膠香者乳炙）　紫河車（酒洗去筋炙乾）

白朮（炒）　人參（各壹兩）

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一二丸炒糯米煎湯化下

參耆四聖散（起發）　秘傳大透肌散（見形）

升天散　即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參（陸分）　黃耆　山查（各捌分）

白朮（土炒）　當歸　川芎

橘紅（各伍）　甘草（炙八）　淫羊藿

穿山甲炒 木香 肉桂
痘瘡右薑一片棗一枚水煎服或爲末服亦可 如嘔吐生薑湯下 瀉米飲下 腹痛神麴煎湯下 煩躁麥門冬湯下 渴川麥門五味子煎湯下 吐瀉藿香陳皮湯下 痘不成漿多服數帖無妨

補漿湯 痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿參分多發痘 人參 當歸
山查各捌分 穿山甲土炒叁分 黃耆壹錢
枸杞子壹錢 川芎 甘草

陳皮各伍分 木香貳分 白朮土炒陸分
官桂叁厘 黃豆叁拾粒 筍尖叁箇
右加薑棗糯米水煎服 一方有白芷防風

治痘白色帶寒戰方 痘標六七朝正要貫膿漿遽乃色白洋洋無紅活飽峻之美有土錢塌陷之凶火熱不退而有寒戰之狀宜服田單火牛湯

人參 黃耆 參子擇細葉者是若川參
用大草葉中有青黑白翎辨之和穿山甲炒甲氣盡去甲 當歸各貳錢
附子壹錢 甘草伍分 桂叁分
橘紅捌分

右水煎服

脾胃 痘瘡已長膿漿欲成之時專以脾胃爲主脾胃強則氣血充實自然膿漿易成飽滿堅厚不須服藥脾胃弱則氣血衰少不能周灌於身使之作漿虛軟清淡雖有漿亦水而已宜十全大補湯方去地黃加木香或人參白朮散方去葛根加黃耆官桂多服乃佳然脾胃強弱於食多少大便堅利求之食少大便堅者脾胃之氣猶足也若泄瀉則脾胃益虛四君子湯食不能送下豆蔻丸方利止復以人參白朮散去葛根加黃耆官桂服之便清要能食不能食者亦依上

法如能食大便堅數日未更衣者用膽導法大便通之使氣得疏通榮衛和暢不致癰爛也

泄瀉 痘瘡出形起發並不宜泄瀉恐裏氣虛毒邪不出及成陷伏故以泄利非佳兆也若成漿之時尤不宜利比之於前殆有甚焉蓋前此爲病未久脾胃尚強足以任之今則病久津液已奪脾胃已弱若復泄瀉則僅存之氣亦瀉於內方張之毒不能成於外或爲癢塌或爲倒靨或寒戰咬牙煩悶而死輕則人參白朮散去葛根加木香官桂黃耆甚則陳氏木香散與攻散出不快 肉豆蔻丸 可以併進 不効亟服

不二散（此方缺）

便秘手足厥冷　痘瘡手足和煖爲貴養漿之時手足發熱手足必有汗此毒熱鬱於中必大小便不通脈沉滑數疾宜利之三乙承氣湯（缺）、便去苦痛主之手足厥逆者此陽氣欲脫必自利不止或可脈沉細微弱或浮大而虛宜急溫之理中湯（方出）加熟附子或陳氏異攻散（出不快）服藥後手足和煖者生厥者死若大便秘小便不通煩躁狂妄腹脹喘而渴脈沉滑數疾不起者此附伏之證爲陽厥自利丸（見出）三乙承氣湯主之

安靜　痘瘡始終貴於安靜膿成之時毒已化解臟腑平和神守爽快尤宜安靜也若忽加煩躁不得眠者但就痘子上辨之如膿多漿淡尚不滿足此毒猶在（…）不得盡出也龍腦膏主之（出黑陷）如膿已成又飽滿因發熱乾燥而煩者此宜利小便導赤散主之（心）如瘡子太稀膿成之後心血虧虛虛煩不得眠者四物湯（失血）去川芎加人參麥門冬梔子仁又酸棗仁湯（煩躁）主之

鎖喉嘔噦　凡痘瘡稀咽中亦有之成漿之時咽瘡早熟肉虛皮薄易致破損瘡瘢新嫩觸之即痛漸皮沾滯痰涎纏裹所以咳嗽食難入勉強吞嚥則爲痰痛所苦痰涎所隔是以水入則嗆穀入則嘔也如語言清亮者可治甘桔湯（咽喉）加牛蒡子天花粉利咽膈化痰涎惟多飲之自然平愈若聲啞喉音不出者咽喉潰爛不可治矣

瘙癢　凡痘瘡皮嫩色嬌者到成膿時多生瘙癢先當調理勿令有此可也若失於早治而發癢者內服消風化毒湯（瘙癢）外用茵陳熏法（出瘙）破者以白龍散（瘙）（見）傅之大抵痘瘡作癢乃是惡候古少內多如其人能食或大便堅抓破之處復灌成膿原無痘處續出

大小不等雖遍瘙破可治內服十全大補湯（…）苦參丸（瘡瘍）問而與之外以滅瘢救苦散（出瘢）合百花膏（出瘢）塗之若發癢之時其人煩倒悶亂抓破之處不復腫滿或成坑窩或自乾黑或皮白脫又加以嗆水嘔食水漿不入或泄瀉或寒戰咬牙或失聲或手足厥逆或狂叫皆死證也

頭面　凡觀痘瘡以頭面爲主五臟精華皆萃於面故也身上瘡有癢者或至抓破不能爲害惟面瘡不可犯動一處苟於行[illegible]之間抓破一處此肺有敗也急用甘桔湯（咽喉）加牛蒡子以解之其癢即止

乃佳兆也若癢不止皮潰漸開氣愈泄而癢愈急必至滿面抓破而死　凡痘瘡起發養漿之時額上瘡如火燒湯澆之狀潰爛破壞無復完膚或兩頰之傍亦如是樣不待爬搔而自破爛者以漸而開洩崩之勢莫之能禦殼焦水去似靨非靨陽氣脫而死　痘瘡作漿之初面上諸瘡未滿成膿或見準頭瘡先乾如橘子色者或眉心瘡自乾黑者或唇上瘡焦黑者或兩耳上瘡自收者或兩頰瘡如餅中間乾陷者此名倒陷乃死之候不可認作正收對人妄言

手足　手足痘瘡最要膿漿飽滿乃脾胃強氣血足也若灰白色或清淡水或虛餒皺塌此脾胃弱快斑越婢湯主之如此者縱得收靨之後必手足腕膝及關節之處發癰毒也

快斑越婢湯　起發

肩背　肩背痘瘡初出起發邪氣雖旺正氣亦強足以任之至於成漿則氣血漸耗精神漸弱有不勝之狀起止艱難多喜仰卧惟有胛背臀之瘡展轉摩擦最受虧苦若瘡子好者自然堅厚耐久不破其次則收靨稍遲膿熟自潰最可惡者如湯火之疱水去皮脫又蒼白破清水非膿漿即乾焦是皆不治之證

漏瘡　歌曰瘡漿將收時未能收靨頭有孔漏膿漿依然團聚封瘡孔洩去真津身反枯凡漏瘡作膿窠之時最要皮厚包裹完固若膿未成忽然瘡頭有孔其水漏出或結聚成團堆於孔外者或水去窠空自乾黑者俗名漏瘡必死若膿熟之後窠皮亦乾漿水沸出因而結靨此頭額正面之間多有之俗謂之堆屎收不可以漏瘡例論蓋漏瘡膿未成堆屎收膿過熟也

咽喉不利涕唾稠粘　瘡痘者每至作膿窠之時咯唾痰涎稠粘膿結或有膿血夾雜者咽喉不利飲食亦少此肺受火邪津液不足故多粘痰喉舌牙齒之間瘡潰血出惟用甘桔湯　咽喉　加牛蒡子天花粉清肺化痰利咽膈直待收靨之後自然平和不可妄用大涼之劑

睡夢呢喃　痘內之膿皆身中之血薰蒸而成瘡痘稠密膿血周遍津液消耗心主血血虛則舍空故心熱者虛煩不得眠酸棗仁湯　煩躁　主之心虛者喜睡夢中呢喃如與人言者多怪誕之事喚之不醒安神丸主之　驚妄　若昏悶甚者先以龍腦膏　黑陷　開其心竅後以安神丸人參麥門冬湯下

腹痛　痘瘡初出腹痛者毒在裏也起發不透腹亦

脂伏也若作膿則毒已出又無脂伏忽然腹痛加其人不大便者必然燥屎也當歸丸膽導法便秘大以通之便清者必受冷也急與理中湯加桂腹痛或黃耆建中湯腹痛加木香主之　痘瘡其出已盡其發已透其膿已成表無邪也能食小便清大便潤裏無邪也一向平安忽然腹脹作痛煩躁喘促痘瘡色變如灰木之狀此必傷食得之先以丁香脾積丸宿食原物湯下去其宿食後以人參白朮散渴去葛根加青陳橘皮與養脾丸宿食相間調之

癍爛 大痘瘡膿熟潰爛者常候也若未成膿先即潰者此名癍爛癍爛之由病當發散而不發散則毒氣閉塞喘促悶亂不當發散而悞發散則熱毒隨陽氣纍出遍身皮肉潰爛此不善表之過治之宜調脾進食令大便得所安養榮衛生肌解毒解之不至於冷調養不至於熱方為良法宜十全大補湯汗去桂枝加防風荊芥穗多服作大便秘以膽導法便秘潤之膿水不乾以敗草散膿爛襯之癍爛作膿痛甚者以天水散即六一散見發熱和百花膏夜臥塗之又有發表過甚外為癍爛而內虛陽氣不守臟腑自利此又急當救裏解表陳氏木香散瀉利主之厥逆者異攻散出不快

板黃 瘡已發膿則毒盡今又發何有乎板黃豈知乎不在乎厚薄而在乎體之純疵不在乎大小而在乎體之明痘漿不在乎飽滿而在乎黃活大黃者中央土之正色漿汲乎脾其黃而潤者也彼痘氣得其衛而不逆血養其榮而不傷氣充榮運膿漿溢注於中者活動而不賦其明潤不死色焉有所謂板黃者哉若陰陽雜其正氣衰傷其榮虛根窠薄劣膿房狹窄膿漿之溢注於中者板賦乎則死寒而不活動乾蠟而不明黃以手指抵之凝結板定五經痺而二氣截矣此謂之板黃若方廣天庭板黃而餘者潤活雖毒必結於腦項腮臉板黃而四體潤美痘雖必發於胸阜肚腹板黃者雖起於曲池三里背脊板黃者雖結於兩軸尻骨遍身板黃者死項頸前後板黃者死頭面板黃者死眼眶上板黃者死兩脇腸球板黃者死觀此而痘變之膿固欲其充黃尤宜潤活也

滋榮散　治痘中板黃

黃耆一　當歸一　紅花一

右和酒入罐內浸煮之另用　蟬蛻　金丸即雞屎

八後硬一味細研以藥汁調服

補瑤丹

雞一隻以參耆當歸紅花杜仲和糯酒煮熟食之

灌膿吉凶

灌膿時根窠紅潤膿漿滿足如黃蠟色二便如常飲食不減此爲吉證不須服藥

灌膿時純是清水皮白而薄與水泡相似三四日後抓破而死

灌膿之時痘中乾枯全無活血此名空倉不治

灌膿時吐利不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者死若二便不下[illegible]猶可用[illegible]與[illegible]之劑

灌膿時二更[illegible]

收太急　收太遲

收靨證治

痘瘡成膿之後鮮明肥澤飽滿堅實以手拭之瘡頭微焦硬者此欲靨也大小先後以漸收靨不失太急不失太緩已靨者痂殼周圓無有突凸凹陷者乾淨無淫濕破濺者此爲正靨否極泰來之象也　凡痘瘡收靨不可以日數拘也大抵痘本稀元氣實者自然易出易靨若瘡本稠密元氣虛者難出難靨也只要先後有次疾徐得中飲食如常便無他證如收太急者毒邪未盡煎熬津液以致速枯非正收也必爲目病爲癱毒爲諸惟疾甚則夭亡微則殘廢宜微利之以徹其毒當歸丸主之大便秘　如收太遲者中氣已虛脾胃太弱不能榮養肌肉使之完就以致潰爛內服十全大補湯方見外用敗草散方見觀之　海藏云瘡疹膿而不焦此本治失清涼之氣有如五穀得陽氣而成熟非涼風至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與痘疹何異須察何經而清涼之或下而成嚴肅之氣則瘡氣必不至於膿而不痂矣要當知之餘毒不盡而疾作蓋出於此宜當是肅亦飲子下之是也　非陽和則苗不秀非嚴肅則秀不實　錢氏云五七日痂不焦是內發熱蒸於外故不得焦痂也

宜宣風散熱導之用牛蒡湯汁解之必若痂突
劉洙瘡子訣云痘發如膿窠不肯靨者但調沙糖水
與喫劉提點云亦曾試用但後來結癜痕白
薛陳文宿先生云痘欲靨不靨其痂欲落不落若腹
脹煩渴忌食水蜜生冷之物若食之轉渴而死急與
木香散救之如身熱煩渴者宜服人參麥門冬散身
熱大渴人參白朮散如不愈仍服木香散錢氏前證
乃脾胃氣虛津液不足所致非實熱爲患也如身不熱
煩躁手足發熱脾胃有熱也用人參麥門冬散身熱
作渴手足微冷者脾胃氣虛也用人參白朮散腹脹

泄瀉或寒戰咬牙脾胃虛寒也用十一味木香散泄
瀉氣促手足逆冷脾氣脫陷也用十二味異功散凡
[illegible]痂作膿皆由元氣充實而內融也若當見虛弱
便與滋補血氣無虧可保終吉若見不靨而後補劑
恐無及矣 一小兒出痘貫膿不靨發熱作渴余謂
血氣虛甚之假熱也用十全大補湯數劑漸愈忽又
惡寒余又曰此邪氣退而真氣遂見虛象也仍用前
藥內參耆各五錢數劑而愈 一小兒痘不結痂用
補中益氣湯加薑桂煎服而愈次年出痘後寒熱
作渴煩躁[illegible]心肺經虛火上炎也以

前藥各加肉桂五分引火歸經而愈
治痘日久不靨歌曰防風荊芥錢炒术與茯苓當歸
大腹皮煎服得安寧 竹吾托命氏專以四製白术
散治痘瘡日久不肯結痂收靨者亦此方之遺意也
但迴漿之痘元氣充壯者[illegible]若元氣不足而迴速
必宜保護不如痘之隨期而迴迴何必勉強用藥以
速其收功也

回漿散 治痘不收漿結痂

何首烏　白芍藥　黃耆
人參　甘草　白朮

白茯苓
右藥水煎服

象牙散 治同上

人參　黃耆　白朮各壹錢
甘草[illegible]　茯苓[illegible]錢　何首烏貳錢
右加糯米一錢棗一枚水煎調下象牙末一錢

潰爛 痘瘡過期不收遍身潰爛者此與癰爛不同乃
熱太過也其候不同或因天寒失於蓋覆使瘡受凍
而不收者宜內服五積散 外用乳香燒煙於被
內熏之或因天熱過求溫煖使瘡被蒸而不收者宜

內服人參白虎湯或五苓散外減去衣被令
少清涼以天水散（即六一散）撲之或大便祕結內外極熱
毒氣散漫無陰氣以斂之而不收者宜內服宣風散
（痘發熱）或三黃丸四順清涼飲外用臙脂法（以大便）
以敗草散襯之或泄瀉氣虛脾胃弱津液少肌肉虛
而不收者宜內服陳氏木香散外用敗草散或因
渴飲冷水過多以致水漬脾胃濕淫肌肉而不收者
內服五苓散如因食少氣虛而不收者人參白朮散
去葛根加桂主之已上諸證以法治之已潰者結
薄痂未潰者結痂方為佳兆若痂皮俱不結者成倒

靨矣　痘已成膿之後過期不靨以致潰爛膿汁淋
漓不可著席粘惹痛疼者用敗草散或蕎麥粉以絹
袋盛於身體上撲之更多佈席上襯臥尤佳而上欲
不成瘢黶者用滅瘢散和百花膏敷之

敗草散

多年屋上爛茅草擇淨者為末摻之牆上爛草亦
佳以多受風露之氣故能解痘瘡毒

蕎麥粉

蕎麥一味磨取細麪痘瘡破者以此敷之潰爛者
以此遍撲之絹袋盛撲以此襯臥尤佳

滅瘢救苦散

密陀僧　滑石（各一兩）　白芷（半兩）

右為細末濕則乾摻之乾則好白蜜調傅

百花膏

石蜜不拘多少略用湯和時時以翎刷之瘡痂
亦易落無痕

倒靨　痘子初出磊落成箇後來長大作膿始相連串
外雖相串皮下猶一箇是一箇至於結痂脾消膿乾
現出初來本形所以收靨斂束要完全堅厚復成箇
數為貴或根腳相通皮肉盡串者結痂之時亦要乾

淨無有淫濕及濺破者次也若未成痂者潰爛已成
痂者只是嫩皮此倒靨也　痘毒當靨不靨復入於
裏者謂之倒靨此死證也元氣素怯又不食常自利
者陳氏木香散異攻散（方俱見前）不死中求活聖藥也如
原無泄瀉大便久秘今添腹脹喘呼此毒盛薄蝕元
氣復入於裏宜急下之用宣毒散若不急下則腸胃不
通榮衛不行益加喘滿躁悶而死矣若毒入裏忽然
自利者此人脾胃素弱毒氣難留故自利須看利下
之物如利痂皮膿血者毒氣得出為順不可止之待
利盡膿血自愈如利水穀者此毒氣反逼水穀脾虛

不能制之其證必逆不可治也

排毒散

大黃二兩　白芷　木香

穿山甲[illegible]

共為細末[illegible]水煎沸調服

如痘瘡破損潰爛者復[illegible]不致乾枯原無痘瘡處復出一個如初出之[illegible]以漸起發作膿者此裏氣充實毒不得入猶在於表未成倒靨逆中之順證也但瘡子重出一番必其人能食大便堅足以勝其再作之毒如食少大便潤者用十全大補湯人參

白朮散肉豆蔻丸主之蓋病久氣虛惟利溫補不可解毒也

霍亂哽氣腹脹 陳文宿先生云痘瘡十一日至十二日當靨不靨身熱悶亂不寧啼則哽氣腹脹泄瀉寒戰咬牙急用異功散加木香當歸以救陰陽表裏助其收靨[illegible]若手足並冷屬脾胃虛寒宜用十二味異功散[illegible]屬脾胃虛弱宜用五味異功散加木香若手足熱大便秘為脾胃實熱宜用清涼飲救其陰以抑其陽[illegible]發熱飲湯哽氣腹脹[illegible]實

四聖散而愈後哽氣[illegible]余欲用枳殼之類余詳究氣屬心火虛下氣屬脾氣虛朝用六君子湯加薑桂夕用補中益氣湯而愈　一小兒哽氣喘咳腹脹下氣手足不冷不熱此脾虛不能攝氣而腹脹下氣肺虛不能攝氣而哽氣喘咳用五味異功散加升麻而愈

泄瀉 痘子初出以來表裏俱病收靨之時表邪已解裏氣宿和大便宜潤小便宜清忽爾洞泄水穀者此中氣怯虛不能禁固水穀或毒氣乘虛入裏欲作倒靨勢宜陳氏木香散瀉出不快異攻散　肉豆蔻丸瀉主之利止者佳利不止者陽脫而死

一痘瘡潰爛先傷於面者面乃諸陽之會痘乃純陽之毒以類相從如水就濕火就燥也又心之華在面痘瘡皆屬於心心火上炎之象如面瘡已破腫消目開者此不著痂先已乾燥病為倒靨死在旦夕如已破復灌滿而成餅焦裂濺起膿血淋漓食穀則嘔飲水則喉咯啞粘涎語音啞嗄口中氣臭者此臟腑敗壞故諸證蠭見也淹延悶絕而死如瘡潰膿飲食無阻大小便調更無他苦如上證者此則可治內用十全大補湯升陽解毒湯相間服之外用滅瘢救苦散有花膏合而救之

升陽解毒湯
當歸　升麻　柴胡
桔梗　甘草　牛蒡子
密蒙花　蟬蛻　連翹
防風　荊芥穗各等分
右剉細末一盞煎七分去柤食後溫服
人中 人中為任督交會之衝督乃陽脈自人中而上任乃陰脈自人中而下故自準頭至印堂與額至鳩尾相應印堂至髮際與鳩尾至膝相應髮際以上與膝以下相應痘瘡收靨但觀面上收到之處則知身上收到之處矣凡痘子自人中上下左右先出先靨者吉陰陽變合相濟之理也若自額角先靨者孤陽不生足下先靨者孤陰不長皆凶兆也

痘瘡收靨　閃　幼科　四三

逆靨 造化之理生於陽者陰成之生於陰者陽成之故痘瘡收靨頭自髮際以上陽氣獨盛謂之孤陽足自膝以下陰氣所聚謂之寡陰所以諸瘡皆靨之後此二處難靨乃造化自然之理不可作倒靨論

瘡蝕 痘已靨未愈之間忽被風邪搏之成疳蝕瘡宜雄黃散綿繭散治之久不愈多潰骨傷筋殺人瘡爛證屬足陽明胃經其方解毒殺蟲之劑若毒發於外元氣未傷者用之多效若胃氣傷損邪火上炎者用蕪荑湯六味丸若赤痛者用小柴胡湯加生地黃肝脾疳證必用四味肥兒丸及人參白术散更佐以九味蘆薈丸　附痘瘡結膿之先或曾傷犯被損者灌爛成瘡至於收靨此獨不靨膿汁不乾更多痛楚若不急治漸成疳蝕瘡損骨傷筋以致橫夭宜內服十全大補湯外用滅瘢散和百花膏傅之　痘子已成疳蝕瘡者若在肢節及諸虛怯軟弱血氣俱少之處色青紫黑腫痛潰爛以漸延開血自出者難治若所生之處在於陽分不痛不爛色不變血不出者以綿繭散主之

痘瘡收靨　八　幼科　四四

雄黃散　治小兒牙齦生疳蝕瘡
雄黃壹錢　銅綠貳錢
右二味同研極細每用量瘡大小乾貼
綿繭散　治小兒因痘瘡身體及肢節上生疳蝕瘡膿水不絕用出蛾綿繭以生白礬搥碎入繭內令滿炭火燒令白礬汁盡取出研極細每用乾貼瘡口上

口瘡 痘瘡入九朝之時雖發黃結痂而口中惡臭噴外上下牙床[illegible]若不早

潰則膿水落而成瘢矣速將出白散吹之 歌曰
痘中班臭世休輕腕床落齒漸淪成出白散方多不
識細茶薄荷共煎濃亂髮蘸湯頻洗淨指纏拭口去
膜腥纔將青黛硼砂片薄荷鷄蘇共細青棱製研為
極細末吹來頃刻痘瘢下 人舌痘瘢川人中白
煅過和片腦薄荷吹之朝夕片細茶黃連薄荷煎湯
頻頻漱口後吹之極效

【喉痹】凡痘至七八朝之際而喉內鎖緊腫痛難咽毒
發於陽明而然也金虛則鳴當以稀涎散吹之 歌
曰喉中鎖痛覓稀涎山豆根負效可言薄荷熊膽相

圭合再把茶芽總共研隨時吹入喉門裏頃刻之間
痛遂痊 此方甚妙熊膽山豆根須要識得真正者
方可用此獲效否則以為無用之方矣

【發熱】痘瘡常宜溫煖有熱不可盡去如一向身溫令
反發熱者俗名乾漿此亦常候只怕內傷飲食外感
風寒以致發熱又當別論然病久氣虛不可輕用汗
下因外傷者桂枝葛根湯 倒煎 加人參因內傷者木
香大安丸 傷食 上之
歌曰待到渾身膿水乾人情從怠病偷安不知禁忌
多翻變一命終歸九以山斷收場之時人必怠忽居
處飲食不知禁忌以致變生異證者紛紛皆是也行
百里者半於九十可不慎哉

收靨吉凶

痘瘡收靨圓淨堅厚如螺靨者上也頭穿膿出堆聚
成痂如雞矢者次也皮破膿出痂薄如紙者又其次
也皮爛膿潰不成痂皮膿汁腥臭者斯為下矣如已
過期譬如瓜果熟久則爛此造化之常還作順看若
未及期則為擦爛乃逆候也綏倒靨而死
結靨時色轉蒼蠟一二日從口唇四邊結靨由胸腹
收至兩腿然後脚背和額上一齊結靨落而愈者吉

結靨時遍身臭爛如塔餅臭不可近目中無神者死
結靨時遍身發痒抓破無膿皮卷如豆殼乾者死
結靨時寒戰手足顫掉咬牙噤口者死
落痂後瘢痕蒼白全無血色者死急宜補氣血養脾
胃庶幾可活
家忌痘入九日充灌回謝宜保全矣然有回至項頸
而死者有回至胸前而死者有回至臍上而死者有
回至陽物而死者其故何歟曰消息盈虛自有定數
若痘證保收其漿滿則可也倘元氣所稟者本是薄
劣痘兼多發遂四肢物盡以發之而援升劫之劑盡

把元氣趕出疳雖充滿然外裝實而內體耗竭矣五
經傷而不能幹補矣頸上喉突氣喘肺之關轄也肺
氣先絕回至此則魁結而死胸骨心之關轄也心脉
先絕回至此則死臍乃脾之關轄也脾脉先絕回至
此則死眼眶乃肝之關轄也肝脉先絕回至此則死
陽物乃腎之關轄腎脉先絕回至此則死本拔則枝
枯源塞則流涸自然之道也若論其變風寒不知慎
護而致衆邪逼於中飲食不知樽節而致脾胃傷於
內肚腹腫脹痰喘不息於是回至各關轄而死者亦
有之也又有一樣靨痂靦之者似黃膿滿滿回至胸
口魁死此真魁疳也

落痂治法

瘢赤黑 凡瘡痂落後其凸瘢或赤或黑者用四白滅
瘢散臨睡以清漿水調搽凸上至曉以水滌去之自
然白瑩脫去更宜愛護不得早見風日經年不滅如
瘡瘢突起成凸者此熱毒未盡解也防風湯主之見形
發熱外更用蜆子內水搽之如陷下成凹者此脾胃虛
不能長肌肉也人參白术散方見發熱加黃耆主之

四白滅瘢散

白芷 白附子 白殭蠶
鷹矢白 密陀僧各等分

共研極細末以水調搽凸黑神効

韶粉散 治痘瘡纔愈毒氣未盡瘡痂雖落其瘢猶
黯或凸凹肉起當用此藥塗之

韶粉壹兩 輕粉壹錢

右研細末豬脂髓熬熟調成膏薄塗瘡瘢上如痘
疹欲落當滅瘢痕一名滅瘢散

瘢黑暗 凡瘡瘢頭凸凹渾身黯黑暗者未可便說無事
猶恐日前未見作膿收靨今忽此倒靨歸腎也但察
其表裏如壯熱大渴未除煩悶昏睡少食或大便不
通或自利此毒倒陷歸腎也又有溫愛熱火食斯加

大小便調者此邪毒不已無慮也

痂不脫 痘痂收後其痂日脫者但不脫以百花膏潤之令其速脫稍遲則乾硬深入肌肉經久方脫遂成瘢痕然久而不脫者脾胃虛也人參白术散加黃耆官桂主之不可搔搯剔去若不禁之反傷皮膚復灌作瘡苦覆潰爛一時難愈其後多成疥癩也 黃耆

痘瘡黏著皮肉不肯脫落此表虛也尤當禁忌以防異變用調元固表湯主之

調元固表湯

黃耆　人參　當歸

甘草　蟬退

人參固肌湯　治痘表發太過致肌肉不密痘痂粘肉久不落者

人參　黃耆　甘草

當歸　蟬蛻 去足翅　糯米 百粒

右用水煎服

人參清神湯　治痘痂不落昏迷沉睡者

人參　黃耆　甘草

當歸　白术 炒　麥門冬

陳皮　酸棗仁　黃連 酒炒

茯苓

右各等分加棗子糯米水煎服

馬齒莧散　治痘痂不落成瘢痕者

馬齒莧 搗汁　豬脂膏　石蜜

三味共熬成膏塗腫處

凡痘痂日久當脫不脫者胸背手足無妨惟面上不脫必成瘢痕凡未脫者以百花膏潤之 [illegible] 令其易脫脫盡之後瘢痕黑黯者以四白滅瘢散塗之

羊筒骨髓　治痘痂欲落不落瘢痕

羊筒骨髓壹兩煉入輕粉壹錢研成膏塗之

如收靨既遲瘡痂不落昏昏喜睡者此邪氣已退正氣未復脾胃虛弱宜調元湯 見前即參耆飲 加麥門冬合安神丸 [illegible] 或只用酸棗仁湯 見煩躁 緩緩調理待氣血平復榮衛和暢而安矣

瘢痂成瘡 痘瘡收靨之後痂皮盡脫曾見瘢痕凸起復作膿窠依舊結一層痂子者或因收靨太驟毒氣未盡或因誤服溫補之藥多啖肥甘之物飲酒喜食煎炒辛熱或因出風太早榮衛鬱而不通皆能復成此證亦與前日一般但無苦耳若此者毒邪外散決無留毒之患　宜痘瘡遍身貫膿不結痂者到靨也或

三五處肌濡滑爛不結痂者此非餘毒也乃已成膿起自脫或面上或手足或片結硬瘡頭雖焦中含膿漿者此是原出瘡子之初其處太密糊塗成片無復顆粒所以毒壅於裏不能起發作膿結痂也但用滅瘢救苦散敷搽和百花膏敷搽塗之待膿盡痂起自愈或手足腕膝之間於其連串作大一塊膿化作水停蓄於中恰如嚢袋皮不破水不去日久只如是者此裏面肌肉已好原出瘡皮剩於外也宜用鍼決去其水自乾脫矣

能食不能食 瘡痂既落中氣暴虛多不能食必藉人參白朮散去葛根加陳皮木香以調養之其間或有瘡痂起而能食者是胃中有積熱故也蓋胃熱則消穀所以能食其人必大便稍秘或大便難當用三黃丸和之否則恐胃熱不去變爲口臭齒腐生風之證流散四肢則發爲癰癤肺毒然有一等脾胃素壯實者平素能食大便亦不至有秘結之患此又不可一槩論也

見幼科五 五一

瘢痕赤白 痘痕赤白各有所因治法亦異凡痕赤而作癢血虛而有熱也用四味牡丹皮赤而作痛餘熱也用四君連翹金銀花治發熱而大便調和者脾胃虛熱也用五味異功散若發熱而大便秘結者腸胃內熱也用聖濟犀角地黃湯若母有肝火用加味逍遙散若母有鬱怒用加味歸脾湯佐以加味逍遙散治之　白者[illegible]氣爲本養而作渴者氣血俱虛也十全大補湯之類乳食減少四肢倦怠者中氣虛也五味異功散之類氣虛發熱者補中益氣湯之類血虛發熱者當歸補血湯之類須參兼變之證治之此證若服藥而瀦紅活者可治色不轉者不治雖經年後多患瀉利而死若妄投攻代禍在反掌

治驗　一小兒痘瘡如期而愈痕赤如赭余[illegible]此乳母有熱也診之果有肝脾鬱火先用加味逍[illegible]四劑與母服之子各飲少許而並愈　一小兒[illegible]色赤作痛熱渴喜冷大便不利先用前胡枳殼散便利渴止再用聖濟犀角地黃湯而安又用芹菜汁而愈　一小兒十六歲痘痕白用獨參湯數斤色[illegible]又用地黃丸大補湯而安

見幼科五 五三

痘瘡新痊之後氣血未復視之未勝尤加調護也蓋痂皮起落肌肉新嫩不宜澡洗增減衣服則[illegible]已虛寒暑之氣易襲也[illegible]內作臟腑俱傷毒雖不散陽[illegible]已弱不宜[illegible]則裏氣虛飲食

之物易傷也時俗不知此理謂之已發再無他變之患
玩縱弛致生後災一旦病生悔之晚矣
倚杌痘症 按孫氏樹倚杌痘以垂世而不註解其詳
迨黃石峰盡註明白凡痘將收結痂自頭抵心膺已
脫矣又身發火熱於關節處重出一番痘疾蒙蒙家
痛愈加其服藥調護庶免夭亡倘飲食不節風寒不
避邪氣感迫囊破潰爛肚腹漸脹陰陽不分死在旦
夕矣若起於頭面者須防兩井湧泉 兩井腮頰穿湧泉眼角耳門
之患起於背腹者應慮蜂螫瓦石之慮 蜂螫痛身也瓦石皮肉
內四關起於手足者不免有脫筆之羅起於陽球者預
症疹 九 幼科五 痘三
宜防脫囊之害玉函云天花結果慶奇全倚杌歸門
痘倒顛不是凜痹脊肉浪使教關節結癰癱為父母
倚杌痘疹之

初

發熱

瘄疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若瘄
疹則面燥腮赤呵欠頓悶乍涼乍熱多睡咳嗽噴嚏
驚悸吐利手足稍冷饑涼耳涼也然發熱者瘄疹常
候也不可盡除之但熱微毒亦微熱甚毒亦甚
初發熱時精神清爽唇鼻滋潤更無他證者此熱在
表其瘄必疎不須施治 初發熱時渾身壯熱熇熇
然不渴清便自調此邪在表拂鬱於皮膚之間宜以
輕揚之劑發之升麻葛根湯主之 初熱 甚則羌活湯
主之 本條 初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便
幼科五 五四
赤大便祕煩悶不安此表裏俱熱毒氣壅遏宜發表
攻裏雙解散主之 初熱 初發熱時表不大熱其人煩
躁不安此熱在裏也以三黃丸微利之 本條 初發熱
時或乘疫癘之氣人參敗毒散主之 初熱 初發熱時
或為風寒所襲出不快者桂枝葛根湯羌活湯雙解
散去大黃主之 見三方俱初熱

甲

痘瘄之證其初不免於發熱者未出毒邪在裏煎熬
氣血薰蒸臟腑而然瘄既現形則毒減而熱解所以
瘄出熱退者瘄本必疎若瘄已出熱不少減此毒蘊
於中其勢方張其瘄必密宜急解其毒連翹升麻湯

加防風荊芥梔子以頭面盡防風湯
升麻或東垣鼠粘子湯 以形 兼服代天宣化丸 見前
服藥之後瘡或不出或出而其熱頓減者爲氣和也
熱若不減瘡漸加多而消渴大小便何如大便不通
七物升麻丸 初熱 小便不利連翹湯 小便不利 小大便俱
不通八正散 小便不利 自利者黃芩湯 自利 加白頭翁酒
黃連調赤石脂末裏氣和毒解矣如更加渴煩躁不
已或譫妄或腹脹滿氣促或自利不止手足厥冷此
逆證勿治 如瘡已出但微發熱不須治之蓋瘡疹
屬火非熱不能成就也 以上見形而熱

錢氏云有大熱則當利小便小熱當解毒大熱謂身
熱脉實大小便祕津液燥而渴懼其變生他疾故利
小便八正散通關散大便潤者連翹湯 小便不利 三方俱見 導
赤散 心 加人參麥門冬使心火有所導引則雖不用
冷藥熱亦自減去矣瘡瘡不全熱過不爲冷誤甚爲
良法小熱解毒之說謂小熱不解大熱必生利其小
便則虛損氣故但可解毒而已甘桔湯 咽喉 加牛蒡
子荊芥穗 以上起發而熱
如瘡漿膿已成毒氣已盡又復發熱者俗呼爲乾漿
不須施治

如結痂之後其熱不退者此邪氣未盡或正氣未復熱
微者不須治之熱甚者當觀其虛實

羌活湯

羌活 川芎 防風
山梔子 龍膽草 當歸 各等分
甘草 減半

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉水一盞煎七分去
查溫服無時

加味葛根湯 治痘失表發熱譫語

升麻 葛根 赤芍

甘草 桔梗 柴胡
荊芥 防風 連翹
牛蒡子 木通

右水煎服

如聖湯 治痘已出身熱如火

紫草 升麻 葛根
白芍 甘草 木通
猴梨

各等分加薑一片葱白三莖水煎熱服 心煩加
麥門冬赤茯苓 煩渴加[illegible] 七八[illegible]

如火者加酒炒黃芩地骨皮

柴胡麥門冬湯　治痘壯熱經日不退

柴胡　麥門冬　甘草

人參　玄參　龍膽草

右水煎服熱退即止　一方無人參

[適]胡宅痘瘡發熱此血少有餘毒也

陳皮　白朮　當歸身

白芍藥各三錢　牛蒡子二錢炒研　木通

犀角　生甘草　川芎各一錢半

右分六貼水盞半煎食稍熱服

[活]連翹散　治一切熱兼治瘡疹如神

連翹　防風　梔子

甘草各等分

右為末水煎服（海藏云治熱在外而不秘此大腸藥也）

易老云涼膈去大黃芒硝者能解六經中熱此不惟

解熱治小兒瘡疹熱候亦使發之則本藥與防風荊

芥二物各半同水煎服

[河]梔子金花丸

黃芩　黃連　黃檗

山梔炒各

右為末滴水丸如豆子大每服五丸白湯下

[錢]三黃丸　治諸熱

黃芩半兩　大黃煨　黃連各二錢半

右為細末糊丸菉豆大每服五七丸至十五二十

丸食後米飲送下

右錢氏云有小熱者解（此如瀉黃潤解之類）大熱者三黃丸

金花丸之類是也

四聖散　海藏紫草木通湯（二方俱見痘形）

導赤散心　八正散（小便不利）

[冊]有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來膈不

寧急以涼藥解其標如益元散之類可用

右五方利小便退熱之劑錢氏云有大熱者利小

便又云身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂

大吐此當利小便蓋此用導赤散之類是也

[錢]宣風散

檳榔兩箇　陳皮　甘草各半兩

牽牛四兩半生半熟

右為細末三二歲蜜湯調下五分已上一錢食前

易老加防風

痘瘡此利上下氣[illegible]也

大黃　各等分

右爲細末滴水丸如粟粒大每服三五十丸量兒大小虛實加減

右錢氏云有大熱利小便不瘥者宜宣風下之

渴

圖瘡疹渴者裏熱也蓋三焦者水穀之道路津液者水穀之精華變化流行以滋潤乎三焦也瘡疹之火起之於內銷爍水穀不得以變化津液滋潤臟腑故渴也又瘡本稠密津液外洩化爲膿漿不能滋養真氣亦渴也小渴者常病也不須治之大渴者視其虛實以法治之切不可以冷水紅柿梨橘西瓜等物與之恐損脾胃致生災異也　辨前證若二便自調飲食溫和口渴飲湯手足不熱是爲虛熱不可食生冷之物若二便秘結飲食喜冷口渴飲水手足並熱是爲實熱可與冷水飲之凡痘出而熱未止者既出盡則熱自止

如發熱時便大渴者熱在裏也葛根解毒湯主之不止更加黃連以瀉心火之有餘黃蘗知母以滋腎水之不足舌潤則生舌如芒刺則死蓋舌乃心之苗少陰之脉絡於舌也如發熱自利而渴者津液不足也黃芩湯加人參白朮麥門冬主之　丹溪云初熱煩躁渴引飲者急以凉藥解其標　錢氏云身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐此當利小便不瘥者宣風散下之

葛根解毒湯

葛粉　天花粉　麥門冬

生地黃　升麻各等分　甘草減半

右剉細取糯米泔水一盞煎七分去査入茅根自

然汁一合服之

黃芩湯痘泄利　五苓散泄

宣風散痘熱發

如瘡已出或起發或收靨一向渴不止者人參麥門

冬散主之　海藏云若身熱小渴者六味人參麥門

冬散治之如不愈或身熱大渴者七味人參白朮散

治之又不愈十一味木香散

人參麥門冬散

麥門冬　葛粉各貳錢　人參

甘草　升麻　白朮各壹錢

右剉細加粳米一合淡竹葉七片水一盞煎米熟

去査溫服

六味人參麥門冬散

麥門冬去心壹兩　人參去蘆　甘草炙

陳皮　白朮　厚朴薑製各半兩

右爲粗末每服三錢水一盞煎至六分去査溫服量

人大小加減

龐氏地黃膏見形

退火回生散　治痘血熱枯澁發渴

滑石　朱砂各壹錢　冰片參釐

右爲細末冷水調服一分冰片時必轉紅活矣

如能食而渴者肺熱也經曰心移熱於肺傳爲膈消

由心火上炎乘於肺金熏蒸焦膈傳耗津液故渴也

治在上焦人參白虎湯加黃連主之

人參白虎湯又名化斑湯

人參　甘草各壹錢　知母參錢

石膏伍錢　粳米壹合

右剉細水二盞煎待米熟去査溫服無時

竹葉石膏湯　治痘瘡表裏俱虛胸中煩悶小便赤

澀多渴成赤癍熱者又宜服犀角散

石膏　知母各貳錢　麥門冬

甘草炒各壹錢

右剉散每服三錢水一盞淡竹葉一握煎半盞溫

服不拘時

麥門冬湯　治癍疹煩渴吐瀉及痂後餘熱

麥門冬　人參　甘草

赤芍藥　赤茯苓　升麻錢

甘草伍分　石膏參錢

右用水煎服

如不能食而渴者脾虛也叔和云口乾飲水多食亦饑虛由脾素弱不能為胃行其津液故渴也治在中焦參苓白术散主之

人參白术散 又名參苓白术散

人參　白术　藿香

木香　甘草　白茯苓各壹錢

乾葛貳錢

右剉細加生薑一片水一盞煎七分去查溫服無時

〔附〕陳十妹年廿歲出痘而有孕七箇半月大渴不甚出透寒熱交作血虛氣虛

人參　白术　黃耆

陳皮　甘草炙　當歸身各壹錢

薑三片酒水各半盞煎服

自利而渴輕則人參白术散甚則陳氏木香散自利而渴者邪傳腎也正理論云自利而渴者屬少陰虛故引水自救蓋腎上連肺少陰脈絡於肺繫舌本邪傳於腎則開闔不利故自利利則津液下走腎水乾不能上潤於舌故大渴也治在下焦宜溫之陳氏異攻散主之出不快而自腹脹自利而渴者陳氏十一味木香散主之文中云腹脹渴者瀉渴者足指冷渴者驚悸渴者身溫渴者身熱面皖白色渴者寒戰渴不止者氣急咬牙渴者飲水轉水瀉不已者已上九證即非熱也乃津液少脾胃肌肉虛故也宜木香散治之如不愈更加丁香官桂此證渴咬牙渴亦多屬熱者不可不察

如渴而大便秘者宜利之四順清涼飲主之熱

存藏云瘡疹大腸閉澀或發熱四君子加瓜蔞根桔梗主之

痘子稠密津液少者十全大補湯

生脈散　止煩渴前尾通用

人參　五味子　麥門冬

水煎當茶飲

神功散　治痘作渴

人參　黃耆　甘草

牛蒡子　紅花　生地黃

前胡　紫草　白芍藥

右水煎服

紅花湯 治同上

紅花或子隨意煎湯飲其渴即止縱口中如烟飲之即止 加牛蒡子尤妙

煩躁

[醫]煩者擾擾而煩躁者憤躁之躁合而言之煩躁皆熱也析而分之煩陽也熱之輕者躁陰也熱之甚者難知集曰火入於肺煩也火入於腎躁也痘疹煩躁須宜忌之若吐利厥逆腹脹喘促而煩躁者皆不知人譫妄狂擾而煩躁者謂之悶亂皆不治之證 凡痘瘡出不快發不透靨不齊有煩躁者此有二證如面黃大便色黑煩躁喘渴或如狂或喜忘腹脹或痛此為有瘀血在裏也宜當歸丸（便閉）或四順清涼飲（發熱）並加桃仁泥紅花甚者桃仁承氣湯主之（失血）

如便血下黑糞而又睡不醒心為血之主睡不醒則心之神昏矣玄參地黃湯（失血）加木通麥門冬若無面黃屎黑如狂喜忘之證只大便不通煩躁腹脹者此有燥屎也此却真狂譫妄以三黃丸四順清涼飲（俱發熱）三乙承氣湯當歸丸膽導法（俱便閉）看病輕重擇而用之如偏執不可下之說以致悶伏而死者醫之咎也 [辟]東垣云火入於心則煩入於腎則躁皆心火為之蓋火旺則金爍水虧故心腎合而為躁宜用梔子豆豉湯凡痘瘡盛作之時必令心火有所導引防其毒氣出而不盡遂生煩躁又宜黑豆煎湯或生

屏痢汗飲之加□渴液不足虛煩不得臥者活人
酸棗仁湯此證多因脾胃氣虛或服尅伐之劑所致
但當調補中氣爲善

【圖】如肺熱而煩者坐臥不安錯於何時若初發熱便
煩者此毒火內鬱人參白虎湯（發熱）加梔子仁主之
若瘡發見猶煩者此毒伏於內未盡出也消毒飲（見形）奪命丹（起發）合而服之若瘡出盡又已起發猶煩
者此內熱也牛黃清心丸主之　如脣燥而躁者必
實自利輕則陳氏木香散（見形）甚則陳氏異攻散（見形）
主之　如揚手擲足欲去衣被者此熱甚於表也羌

活湯主之瀉青丸去大黃加甘草　如神識昏迷反
覆顛倒者此熱甚於裏也導赤散（心）牛黃清心丸合
而治之　吐利不食而煩躁者正氣虛也陳氏木香
散主之　如晝日煩躁夜則安靜者此陽盛於晝至
夜則陽氣退而安靜也人參白虎湯加梔子仁主之
　如晝日明了夜則煩躁者此陽陷入於陰夜則陰
盛陰陽交爭故煩躁也四物湯加梔子仁主之

活人酸棗仁湯　治痘疹虛煩驚悸不得眠
酸棗仁（炒）　甘草（炙）　知母（炒）
白茯苓　麥門冬（去心）　川芎
乾薑（炮各參分）
右水煎溫服兒大倍之

梔子豆豉湯
山梔（肆箇）　豆豉（半兩）
右水一盞先煮梔子一盞內豆豉煎至七分去滓
溫服得快吐即止

黃連解毒湯　治發熱熱甚心煩不得眠
黃連　黃芩　黃檗
山梔（各等分）
右每服四錢水一鍾煎五分溫服　若瘡毒甚者

加青黛壹錢調入湯內服之　凡脈弦數內外熱
甚譫語者合小柴胡湯主之　若脈洪數內外熱
甚舌燥煩渴者合化斑湯主之

牛黃清心丸
黃連（生伍錢）　黃芩　山梔仁（各參錢）
鬱金（貳錢）　辰砂（壹錢）　牛黃（貳分）
共研細末臘雪調麪糊丸如黍米大每服七八丸
燈心湯送下

人參蟬蛻散　治小便不利痘瘡不發煩躁作渴咬
牙諸

人參　蟬蛻　白芍藥
木通　赤茯苓　甘草
紫草茸
右每服三四錢水煎
人參竹葉湯　治虛煩不得寐或兼自汗
人參　竹葉　甘草各貳錢
半夏貳錢伍分　小麥　麥門冬各壹錢伍分
右每服二三錢薑二片粳米一撮水煎服

譫妄

譫多言也妄虛妄也譫妄者妄有聞見而語言無倫也皆邪氣熾盛正氣虛弱神識不清之所致夫言爲心聲心熱則多言睡中呢喃者熱之微也狂而語言差謬熱則甚矣亦有胃熱而譫語者大便必鞕數日不更衣方見　薛陳文宿先生云痘紫色頂陷心煩狂躁氣喘妄語或如見鬼神內熱便秘者宜用龍腦膏子豬尾膏如無內熱大便不實不可輕服竊謂前證多因初起熱盛之時失於解利所致亦有因痘毒未盡有因胃經有熱有因肺胃有熱有因心脾有熱煩躁痘裂出血便血衄血尿黑痕赤詳見各證大凡作渴發熱手足指冷或大便秘結者內有熱也切不可禁其飲水觀張子和述水中兒事良可驗矣蓋熱極故得水而生也　一小兒痘疹狂喘熱渴飲冷痰涎不利先君用十六味清膈飲犀角地黃湯而痊

一小兒出痘發狂作渴飲冷此上焦熱熾也用黃連解毒湯芹菜汁而止又用紫草快斑湯將靨因問禁餌三日色黑倒靨用紫草散渴止又用人參白朮散而痊　一小兒痘愈後時發狂兼喘發過面色黃白手足並冷此脾胃虛弱也余用補中八珍二湯各三

十餘種或云當先降火邪而後補元氣乃服老道枕

痢之類汗吐不止而發

初發熱便妄有所見聞妄言如見鬼狀此爲惡候蓋毒攻於裏心志昏惑神識不清而然況小兒神氣怯弱見魅易侵又厲鬼常□□□行乘人之虛而疰之故凡痘疹妄見妄聞妄言如見鬼者不可治也須審發於何臟如目直視手尋衣領亂捻物此發於肝爲亡魂悶亂喘促手搯自鼻面此發於肺爲亡魄上竄咬牙多叫哭驚悸或不能言此發於心爲喪神困睡手足瘈瘲不思飲食此發於脾爲失意目無精光畏明欲墜下而縮身此發於腎爲失志故曰其發見者不治　或發熱時無此證因大便祕結却有之此內熱也先以宣風散發熱解利其熱後以導赤散心送下牛黃清心丸驚　或粉紅丸驚以鎮其神病已者可治連作不已者勿治　如胃中有燥屎三五日未更衣者宜滌腸解毒宜四順清涼飲三黃丸俱發熱主之　如初發熱狂亂大便自調者五苓散加辰砂主之大便秘者輕則三黃丸甚則承氣湯主之

如起發成漿欲靨之時忽然神昏譫語者此由瘡本潤溶清血外耗不能養神宜養血爲火安神丸主之

痘疹　八　幼科上　十七

安神丸

黃連　當歸身　麥門冬

白茯神　甘草各半兩　朱砂壹兩

龍腦貳分半

右爲末湯浸蒸餅和豶豬心血搗勻丸如黍米大每服十丸燈心湯下

梔子仁湯　煩躁譫語驚狂發斑

梔子仁　黃芩　石膏各貳錢

知母　杏仁各壹錢半　大青

柴胡　豆豉　赤芍藥各壹錢

升麻捌分　甘草伍分

右水煎服

如昏不知人語言無倫者死經曰衣被不斂言語不避親疎者神明之亂也故不可治　如初發熱便妄有聞見狀如見鬼而恐怖者不治此證自始至終皆不可有乃神志俱喪軀殼徒存不過引日而已

痘疹　八　幼科上　十七

【錢】瘡疹搐由風火相勝也惟斑疹能作搐疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜爲熱神氣不安因搐成癇斑疹爲心所生心生熱熱則生風風屬於肝二藏相搏風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母栝蔞湯主之錢乙【海藏】云諸癍瘡疹皆屬於心火無論虛實皆從心火上說脾虛則肝乘之肝與心火相合故用栝蔞湯若脾土實火旺逆乘而成癇者此實邪也便結者瀉青丸便軟者瀉青湯亦當以脈別之【翁】經曰諸風掉眩皆屬肝木然痘出之始雖有四藏心實主之心火熱盛肺金受尅不能制伏肝木熱則生風風火相搏神氣不安故發驚搐醫者當辨痘疹驚搐不可遽投凉心之藥苟不審而槩以驚藥治之則心寒而肌斂毒氣內陷痘何由而出也治法當平肝木利小便爲切要瀉肝則風去利小便則心熱退風熱既定則痘隨出而驚搐自愈矣然亦先驚者多吉痘後驚者多凶何也痘未出之先熱蘊於內故作驚搐痘出驚止而內無凝滯故吉痘出之後氣血虛弱復感風寒熱毒反歸火母故經云必致驚搐故有非痘證而發驚

者亦屬於肝而治法專理脾土何也蓋由平日或吐或瀉脾土虛弱不能當肝木所尅此非肝木之本病也治法只須溫補脾土爲主而肝木自寧譬如土薄而上有大木不能乘載故無風而自動栽培者當厚壅其土使根深本固而自無風邪之害也痘後有此證者亦由氣血虛極使然也必爲難治【瘡疹論】挾熱吐瀉不可投燥藥傷其身熱不可投凉藥瘡疹發搐不可投驚藥此皆外同而內異蓋瘡疹出於心驚搐亦出於心也瘡疹本熱熱則動心此理之自然夫心火獨盛於上肺金受火尅而不能制伏肝木熱則生風木氣盛則脾土衰熱氣動於心神心喜爲熱心藏痘脾藏疹瀉肝則風去利小腸則熱退也風熱既退則驚搐自愈矣昧者不知投以銀粉腦麝青黛硃砂硝石凉心損胃之藥則誤矣故見發似驚風用藥當作瘡疹防之蓋瘡疹之初似驚風者多大抵瘡疹發驚必先咳嗽痰涎心悸煩躁惕惕唇紅頰赤發渴耳冷足冷脈數舌白如行此數證則銀粉等凉藥切不可用蓋心凉則丹損胃而毒氣斂伏又況心主血寒則血凝而不行且中焦既冷上焦熱愈不降何由運出又有小兒平常無病忽然發搐皆是瘡疹先

當解毒者毒氣內盛宜以發散如惺惺散消毒散升
麻湯紅綿散兼以快氣利小便枳殼等藥與之待其
熱氣得泄心氣亦自定矣或有風寒與內熱相搏而
驚搐者各隨證治如前法但加勻氣藥爲妙張氏云
瘡疹氣勻即出快氣勻則榮衛無滯雖有毒亦散瘡疹
當自出矣 如大叫色青唇眼動手足牽搐
慢脾風證也宜小異功散加川柴木香乾薑治之
醫 凡未出而發搐者是外感風寒之邪內發心熱之
所作也當用茶粉下解毒丸牛角地黃湯主之 世
治瘡痘欲出身熱煩躁忽發驚搐宜驅風膏小如聖

飲小便不通八正散涎盛利驚丸抱龍丸量證施之
丹 欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚風宜發散
醫 前證痘疹未見而先發搐者乃毒氣自心經
也若病勢輕緩或形氣虛弱者不宜用峻厲之劑
元氣內損則毒氣內陷而瘡不能起發也或外感
風寒之邪內因瘡疹之熱而相搏或肝血虛火動而
內生風當補元氣爲主佐以見證之劑然前方多峻
厲之劑審有是證方可用須察其色赤白而以脾胃
爲主虛則用溫補實則用解毒 因 痘瘡始作未形
見之間忽發驚搐是毒氣自心經而出也苟不以內

外證辨明之便用銀粉青黛等劑則心寒而毒氣內
陷往往氣絕之際或隱癍方出已無及矣治法但當
以導赤散加防風辰砂末與瀉肝丸合而治之搐甚
者抱龍丸如再不止小便利合下治以導赤散送下
牛黃清心丸或粉紅丸 方見幼治
惺惺散 初熱 方見升麻湯
紅綿散 解表之藥
全蝎 麻黃去節 荊芥
白芷 川芎 桔梗
天麻各二錢 甘草 蘇木各一錢

右爲末每服一錢加紅綿少許水煎 有熱加荊
芥稍熱服 一方入薄荷葉三片好酒四五點同
煎
羌活散調三製辰砂末加防風荊芥表之 方見初熱證治
世 麻痘風搐方
人參 羌活 防風
殭蠶醋炒 南星薑製 白附子薑製
甘草炙
右等分生薑三片水煎服其搐立止
右皆解表之劑然其所謂外感風寒之邪丹溪所

謂宜服散藥者是也

解毒丸

寒水石研　石膏研各一兩　青黛半兩

右以二石細研如粉入青黛和勻湯浸蒸餅爲丸如芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼凉水下亦可三歲兒服半丸量歲數加減服之

犀角地黃湯（見失血）

柴胡二連丸　治肝經實火

柴胡　宣黃連　胡黃連

右爲末糊丸桐子大每服一二三十丸白湯下

右解毒凉血瀉肝火之劑有熱者宜之

導赤散（心熱）　八正散（小便不利）

六一散

右利小便之劑小便不利者宜之然瀉丙火以瀉肝之子乃治驚搐第一要法不獨小便不利者爲當用也

紫草快癍散（即加減大紫草散有木通無黃耆方見痘出太白）

東垣消毒散（即消毒救苦湯見咽喉）　參耆四聖散（羅膿）

八物湯（虛羸）　柴胡梔子散（即梔子清肝散見五藏熱）

地黃丸（腎藏）　小異功散（四君子湯）

益氣湯

右皆錢氏所用方大抵主於後脾補腎乃補虛例也

抱龍丸　牛黃清心丸（方見驚搐）

粉紅丸（即溫驚丸）

右鎮驚豁痰劑痰涎潮壅及仵彼外物驚者用之

（痘疹發搐）錢氏癍疹病後欲發癇餘熱難發癇以木勝脾木歸心故也若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸　萬氏痘後非時搐搦者有二證一則心熱留而不去熱盛生風風火相傳其人必喉中有痰目直上視面赤引飲居處

喜冷宜導赤散瀉青丸清心瀉肝後以抱龍丸調之一則病後多食胃弱不能勝穀謂之食蒸發搐其人必潮熱大便酸臭秘泄不調或嘔吐腹痛先以備急丸丁香脾積丸利之後用木香大安丸錢氏異攻散調理取愈　薛氏曰一小兒痘痂脫盡因其穢氣用蔥椒煎湯浴之發搐痰喘用八珍加白殭蠶蟬蛻一劑痰喘頓止又用四君芎歸鈎藤鈎而搐止　一小兒痘瘡色赤四肢發搐作渴寒熱此心肝二經熱甚乘脾所致也用四君防風鈎藤鈎而愈　一小兒痘後四肢發搐作後元動小便頻數面目青赤此肝經風熱

用四物柴胡山梔少愈但四肢倦怠飲食少思大便
不實此脾氣受傷而未復也用四君升麻當歸而痊
一小兒痘後寅卯申酉時熱甚或兼搐余謂寅卯
時發熱此肝火本證申酉時發搐乃肝木侮金先以
四物白朮茯苓鈎藤鈎煎送柴胡二連丸而愈夕用
地黃丸朝用四味山梔柴胡及四君子加當歸而痊
一小兒痘瘡色赤發搐痰盛服抱龍丸而頓愈又
因母大怒兒仍搐因服柴胡梔子散加味逍遙散母
子並愈　一小兒痘愈後發搐唇額青赤唇口牽動
余謂肝心二經風熱所致先用柴胡梔子散加鈎藤

鈎後用加味逍遙散而搐止再用五味異功散而痘
愈　一小兒痘將愈發搐痰涌頭目不清脾氣虛弱
肝木侮之先用五味異功散加柴胡鈎藤鈎搐愈而
膨

涼驚丸　溫驚丸（並見驚癇）
導赤散（心臟）　瀉青丸（肝臟）
備急丸　丁香脾積丸
木香大安丸（並見傷食）　柴胡二連丸（見肝）
補中益氣湯　四君子湯
四神丸　十一味木香散（並見[illegible]）

秘蒙散　治痘熱發生風發搐
栝蔞根（貳錢）　白殭蠶（壹錢）
右慢火同炒老黃色為末每服一二三分薄荷湯下
保命丹　一切驚風發熱
天麻　鬱金　全蠍（去尾）
白附子（炒）　殭蠶（薑汁炒）　薄荷
蟬蛻　茯神　桔梗（各伍錢）
防風　甘草　青黛（各叁錢）
大半夏（冰滾湯泡曬乾又用薑汁浸曬乾又炒）　南星（製同上各壹兩）
鈎藤　牛黃（另研各貳錢）　麝香（伍分）

辰砂（水飛伍錢為衣）
右為末煉蜜為丸芡實大每服一丸燈心湯下

丹痘風分氣血虛實以日干守之多帶氣血不足
虛則黃耆生血之劑助之略佐以風藥　實則白芍
黃芩爲君連翹白芷續斷之類爲佐若觸寒陳氏方
可用　薛前證更當分痘瘡已出未出已靨未靨外
邪所傷內虛火動若未出而搐搦熱毒內蘊也紫草
快斑湯加鈎藤鈎已出紅綻而搐搦熱毒作痛也東
垣消毒散加鈎藤鈎灌膿而搐搦血氣虛也參耆四
聖散加鈎藤鈎若靨後而搐搦血氣尤虛也八珍湯
加鈎藤鈎或目瞤或直視者風火相搏也柴胡梔子

散或六味地黃丸加柴胡山梔或口角流涎者木乘
土也五味異功散加升麻柴胡鈎藤鈎或目赤眵淚
肝血虛而生風也四物湯加柴胡鈎藤鈎或角弓
反張者水不生木也六味地黃丸加柴胡當歸隨用
補中益氣湯加天麻鈎藤鈎不可直用治風之藥蓋
風藥能燥血散氣必驗其手足冷熱溫和三證而用
補瀉調理之法庶無誤矣如嬰兒當審乳母而治之
薛痘後忽徧身青黑色手足瘈瘲口噤涎潮角弓
反張語言謇澀者此中風也蓋痘方愈榮衛正弱不
知避忌忽遇節令氣交八方不正之氣乘虛而入故

爲此證宜消風散貳錢入蝉蛻末壹錢分爲二服搗
生薄荷汁及酒各數點溫湯浸之連二三服或作
癮疹或再出隱疹而愈
薛楊氏女年十餘歲痘後不透靨各後骨節痛食少
夜間或熱此餘毒在內虛甚難於疏導須在補中
有道此方主之

當歸　白朮　陳皮各七分
牛膝三分　通草　甘草根炙
蘇梗各三分　犀角末五分

右㕮咀生薑二片水煎溫服

男子十七歲痘瘡初出不透毒氣攻內骨節作痛兩足
不可直縮痕欠紅活脉浮而和小便赤少

當歸身　白朮各壹錢　陳皮
木通　犀角錢　人參
茯苓各伍分　甘草炙少許

右分二貼煎服

消風散

人參　羗活　川芎
甘草炙　防風　荊芥穗
白茯苓　蝉蛻去土　厚朴

……陳皮去白　薄荷……

右為末每服二錢茶清調下

紫草快斑湯 見形出不快　東垣消毒散 見大法

參耆四聖散 灌膿　八珍湯 虛弱

柴胡梔子散 熱　六味地黃丸 腎

五味異功散 吐瀉　四物湯 血分

補中益氣湯 氣虛

當歸補血湯治痘瘡血氣虧損發搐熱渴喜飲脉洪大而虛重按如無者 發搐

自汗

自汗者不因發散而自然汗出也衛氣者衛護皮膚肥實腠理禁固津液使不得妄泄也痘疹之火由裏達表干於衛氣皮膚為之緩腠理為之疎津液外泄故自汗也凡病自汗宜遽止之痘疹初出自汗實為美證乃陰陽氣和榮衛通暢邪氣不留易出而解也又心主汗諸痛皆屬於心自汗出者毒氣外泄也雖然熱之甚者亦為汗解身復清涼此毒散也若汗出不止其熱反劇此邪氣併於陽而陽虛宜斂汗固表清熱解毒使衛氣充實無癢塌潰爛之患保元湯大

當歸六黃湯 盜汗 主之　如痘已收靨痂皮脫落自汗者此氣虛也宜補陽救陰使氣無洩十全大補湯 見本方 主之若更不止調敗蒲散同服外用溫粉撲法

薛氏云靨後最宜審治若血虛者用當歸補血湯 虛熱 氣虛者用四君子湯加黃耆氣血不足者十全大補湯飲食自汗者小異功散 見虛熱 加黃連五味子烏梅肉　睡中汗出心有熱也其汗上至頭下至頸不過胸者乃六陽虛汗也不須治之上至頭下至臍者此胃虛也保元湯 見大法 加參耆飲 不止調敗蒲散同服自汗者血之所化於氣不能斂所以睡則汗出痘

家常以補血為主者當歸補血湯六味地黃丸八珍湯人參養榮湯之類皆可因證施治　自汗面赤作渴手足濈濈汗多者胃熱也瀉黃散（脾）人參白虎湯（發熱）加黃連主之所治退以小異功散加山梔仁麥門冬調之　有食積內熱自汗者四君子加麴糵　自汗發搐流涎者肝木侮土也小異功散加鈎藤搐減去鈎藤加柴胡主之　丹溪謂自汗不妨蓋指初出其汗之不甚者言耳若汗出過多最能虛人未靨之際恐致氣血虛而不能結痂既靨之後尤防血脫陰虛陽無所附矣　汗出如油髮潤如洗喘不休者為肺絕之候死不治

[illegible]散

浮麥不拘多少炒香每服三五錢水煎服治胃虛自汗

敗蒲散（一名止汗散）

用故蒲扇燒灰每服三錢溫酒調下無時服

溫粉撲法

黃連　牡蠣粉　貝母（各半兩）

粳米粉（一升）

右為細末綿裹撲於身上

失血

氣為陽血為陰陽主動陰主靜人身之血不可妄動也經曰陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血今痘疹之火薰灼於裏迫血妄行血亦隨火而動故[illegible]從上焦出或衄血或嘔血陰絡傷則血從下焦出或溺血或便血陰陽俱傷則血上下出也諸失血惟從鼻出者或有可治之理其餘皆死證也亦有痘瘡潰爛不能收靨出血不止者此陽瘡出血亦不可治　張所云血之妄行從口從大小便從陽瘡或痘毒而出者悉皆不治指出之多而不止者言之耳若初出之時苟詳推所而善為清理豈俱無生者耶　若痘瘡赤痛煩熱作渴或便血或衄血先用犀角地黃湯（失血）次用加減大紫草散（痘瘡）大黃者加木通主之　吳氏治諸失血始終用犀角地黃湯加山梔芩連白芍藥有初出時衄血不止用下藥而得効者　一小兒痘後非衄血即便血痘痕赤白雕定手指冷熱無常余謂此元氣虛而無根之火倏往忽來也朝用補中益氣湯夕用五味異功散各二十餘劑而愈後因勞心復發乃用前二藥為主佐以十全大補湯而愈

犀角地黃湯　治痘疹傷寒疹與衄血便血者可服
牡丹皮　犀角　赤芍藥
生地黃
熱盛者加酒炒黃連　若有瘀血停胸加醋製大黃　若口鼻出血加大薊茅根　若小便去血去大黃加小薊水煎服

二寶散　治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂語
犀角　玳瑁
二味磨汁頓服即愈

衄血吐血辯　痘疹方云若痘發之際正宜微見與發汗同體然血與汗雖殊其源則一蓋痘疹乃臟血所發非結肺胃毒氣自然上越也若見此證不可妄投以藥恐治失其宜發毒者不出而已出者復傷反生變證也若作渴飲冷手足並熱此毒氣熾盛而血上流也宜用聖濟犀角地黃湯若肺經熱毒而鼻衄用地黃清肺飲胃經熱毒而吐血亦用聖濟犀角地黃湯若腸胃熱毒而便血亦用之作渴飲湯手足不熱者脾肺氣虛不能攝血而妄行也宜用五味異功散若出血作渴煩躁面赤色者血脫也宜用當歸補血湯　一小兒衄血右寸脈數此肺金有火也用瀉白散而血止但四肢倦怠用益氣湯而愈　一小兒痘痘赤色吐血發熱此胃經熱毒也先用聖濟犀角地黃湯諸證漸愈又用五味異功散而痊　凡痘疹發熱失血皆非佳候但從鼻出者此火刑於肺鼻爲肺之竅宜瀉火涼血清肺以玄參地黃湯調鬱金末加茅根汁磨京墨汁飲之衄止者佳一向不止者不治

玄參地黃湯
玄參　生地黃　牡丹皮
梔子仁各壹錢半　甘草　升麻各半錢
白芍藥壹錢
右剉細加炒蒲黃半錢水一盞煎七分去査溫服

斬關散　治痘紫發熱鼻紅不止
生地黃　牡丹皮　黃芩各伍分
升麻叁分　藕節　茅根各壹錢
綠豆肆拾玖粒
右水煎服

便血　凡痘子大便出血者看其血來何如又看是何時如痘子正壯大便數日未行血從糞出者此肛門傷血出也如痘已收大便膿血者此倒靨之血症非比二類但溺血便血者乃臟腑敗壞陰血妄行必死

之候　閩閩人氏云痘疹大便下血或紫黑者睡而不醒是爲惡候乃內熱盛也用犀角地黃湯抱龍丸小柴胡湯加生地黃十之竊謂前證若寒熱作渴小柴胡加生地黃發熱體倦用六味丸加當歸口乾作渴用人參白朮散大凡作渴引飲發熱者爲實熱作渴飲湯手足不熱者爲虛熱手足逆冷者爲虛寒治者審之　一小兒痘瘡下血且不起發先君謂氣血不足用紫草快癍湯加參芪歸朮血頓止瘡頓起用八珍湯而愈　一小兒痘瘡下血小便赤色瘡色如赭發熱飲冷二便不利先君謂心小腸實熱用八痘疹方見　幼科五　入先正散後用解毒防風湯入痘疹方及飲芹菜汁而痊　一小兒痘將愈而便血面白惡寒大便欲去而不去余謂此元氣虛而下陷也用補氣湯不信服凉血之劑發吐瀉腹痛而歿　一小兒痘將愈患便血面白惡寒手足並冷脈沉細如無余謂陽氣虛寒欲用人參當歸桂不從翌日而死手足青黑惜哉　一小兒出痘三四日大便下血日有數滴至八日不能起御醫錢春林謂其脾氣虛寒用木香散二劑加丁香十一粒人參五錢次日痘起有膿見血止二十餘日而愈

溺血　尿痘兩三日而小便溺血者名爲沉砂紅蓋因巢毒輳於心心失其主而血隨毒激故奔散而妄馳心通小腸注於膀胱而溺血也或如黑豆汁或如蘇木水痛者易治不痛者難治

主方

木通　生地黃　黃芩

赤藥　犀角　地榆

升麻　紫草　車前葉多用

燈草

水煎服　痛加甘草梢滑石山梔

痘疹方見　幼科五　九十

余治此痘要在於清心解毒使陰血總歸於榮升府黃者貴宜詳察而救不可執方以害人也若便如黑豆汁者毒已衝心而榮亡已離十亡八九致有小便澀滯結血條如絲縷寸長欲尿則號哭痛不可忍者急用炒山梔木香龍鬚草汁調服再以木通湯飲之可也

破裂出血　閩閩人氏云痘瘡大便不通小便如血或結癰赤身痘破裂乃內火熾盛失於解利急用犀角地黃湯小柴胡湯加生地黃而順飲之類治之竊謂前證若心脾熱盛用犀角地黃湯心肝熱盛用小柴

胡湯加生地黄若大便不通先用四順飲次用犀角湯若色赤焮痛二便不通急用活命飲加硝黄若色赤焮痛惡寒發熱用活命飲加麻黄若因乳母怒火用加味逍遥散加味歸脾湯

不能食

凡痘家能食者不問稠密皆吉不能食者痘雖疎亦難發難靨瘥痂者危蓋人絕水穀則死表裏皆病則困也有欲食而不能食者必喉舌有瘡作痛艱於吞嚥也以爛粥米飲頻頻與之以助脾胃之氣更以甘桔湯加牛蒡子以解咽喉利胸膈也 翁夫痘瘡之出也固賴元氣以發之而元氣之壯也必滋乳食以養之自四五日以至痂落之後飲食不減二便如常雖八九之發不紅綻或陷塌用藥得宜可保無虞使乳食減少兼以泄瀉則元氣自此而日衰雖無前證日

後必至藥亦難効去生遠矣故四五日前而不食者此毒盛於裏猶可治也至六七日後而不能食者雜證百出行漿不實雖藥之亦何益哉有稟受壯實又發於五歲之外者又不可以例論也有痘已痂起而不食宜調脾胃若痘起而能食乃胃中宿熱消穀能食而大便秘宜四順飲之類微解之恐胃熱不去爲口瘡又有脾胃兆實能食大便如常不必服藥此治痘者可不知所審耶 愚按不食有虚實之異其人怯弱精神慢而不食或因犯胃氣臟腑自利而不食者爲虚當溫養之益黄脾理中吐逆當附輩主之身

熱中滿而不食者為實熱宜利之白虎湯加□□
散（驚搐）主之　如腹脹不食口角流涎者小異功散
主之（吐瀉）
初出胸前稠密而減食者此毒氣脾弱也宜消毒飲
加酒洗紫草山查人參葉　已出或因煩渴飲冷過
多或誤投涼劑傷冷腹脹大小便利腹中虛鳴不能
食者當以溫中藥疎逐冷氣治法見腹脹條有內實
之人皮厚肉密而毒氣難於發越者又當服解毒匀
氣之藥　凡痘出而飲食少進者多因虛而毒發不
透或兼有積滯故也以秘傳大透肌散（見出不快）加枳實

服之　飲食不化手足逆冷者脾氣虛寒也四
君子湯加乾薑甚則附子　痘痂既起則中氣衰虛
多不能食只宜四君子輩徐徐調養之或有痘痂起
而能食者乃胃中宿有穢熱也蓋胃熱則消穀故能
食更兼大便秘結者宜三黃丸利之庶不生他變也
然亦有一等脾胃素壯實者亦自能食大便亦不至
有秘結之患則不必用此藥也
靨後大小便如常而食少者宜胃愛散小異功散雙
和散之類調補　痂落潮熱唇紅口渴不食者四君
子湯加陳皮山查黃連渴甚白朮散不解以大連翹

飲去黃芩主之
脾胃傷於飲食者枳實丸（傷食）主之大便酸臭不消
化是食或吐者枳朮丸（方見上）傷冷飲食者宜溫之神
應丸（傷食）主之然神應丸大有巴豆當斟酌臨證須
量虛實斟酌少與之庶不壞事
道氏治痘瘡不進乳食用白朮苦參湯宿食不消者
陳皮枳實湯如因泄瀉不食者二和湯加黃芩胃虛
弱不調而不能食者人參養胃湯參苓參朮散七珍
散俱可選用或有雜證者去其雜證氣和自能食矣
或大小便秘者利之

四君子湯
人參　白茯苓　白朮
甘草（各等分）（炙）
右㕮咀用水一盞生薑三片煎四分溫服每貼三
錢
六神散　治脾胃虛弱津液燥少內虛不食身發虛
熱
人參　白朮　茯苓
甘草（炙）　白扁豆（炒）　黃耆（蜜炙）
右等分為細末每服一二錢用水一盞生薑一片

取一枚同煎至七分去滓溫服之不拘時候小熱
甚者加烏梅少許同煎服
七珍散　調胃進食
山藥　人參　茯苓
黃耆　白扁豆各壹錢　白朮貳錢
甘草柒分
右剉爲麤散加粟米一撮薑二片棗三枚水煎不
拘時溫服
人參養胃湯　補脾進食之劑
白朮　陳皮　神麯各壹錢伍分

人參　茯苓　梔子
黃芩各壹錢　甘草捌分
右剉散分爲二服水煎不拘時服
麥冬參朮散　調胃進食兼消積之藥
麥門冬　白朮各貳錢　陳皮壹錢半
人參　甘草各壹錢　厚朴柒分
右剉散分爲二服水煎無時
二和湯　消食扶氣之劑
藿香　香附各等分
右爲極細末茶水或白湯下二三錢

白朮芍藥湯　治小兒患痘不進乳食
白朮　白芍藥　檳榔
訶子　柴胡　青皮各壹錢
苦參壹錢貳分　鼠粘子　厚朴
陳皮　砂仁　烏藥
紫草各壹錢
右剉散每服四五錢水煎食遠服
陳皮枳實湯　治患痘宿食不消
陳皮壹錢貳分　鼠粘子　厚朴各壹錢壹分
枳實　青皮　烏藥

紫草茸　砂仁　神麯
檳榔　草菓　桔梗各壹錢
升麻捌分
右剉散每服四五錢水煎食遠服
凡痘瘡飲食之間毋令太饑毋令太飽毋太寒太熱
以損脾胃但與糜粥爛飯淡滑滋味以養之切忌肥
甘煎炒五辛一切動風動火之物

咳嗽

肺主氣其變動爲咳嗽者肺證也瘡疹發熱之初便
有咳嗽者肺爲五臟之蓋瘡疹之火挾君相二火之
勢上熏乎肺肺葉焦舉故氣逆而咳也瘡疹既出其
咳更增者此喉嚨有瘡淫淫如癢習習如梗故咳也
瘡疹收後而咳者此衛氣虛弱腠理疎開風寒外襲
肺氣逆而不收故亦咳也　薛痘疹未出欲出之際
乃熱毒上熏清道肺氣不寧宜用惺惺散若已出之
後則屬元氣虛弱不能固衛腠理風邪乘虛而襲宜
用五味異功散加桔梗五味子以補脾肺

痘疹方云痘瘡未出之先咳嗽升麻湯初熱　頭疼身
寒咳嗽參蘇飲初熱　嘔吐痰涎咳嗽白朮湯
頭痛身熱咳嗽惺惺散初熱　鬧如初發熱咳嗽
甚者先以參蘇飲發之次以甘桔湯發熱合瀉白散
肺　加牛蒡子治之
凡痘子出盛咳嗽者此肺中有火或咽喉有瘡作癢
也只用甘桔湯加牛蒡子多服良如涎唾帶血此咽
中瘡或齒縫中出也不須安治　瘡不起發悶亂喘
嗽手足寒飲冷者木香散瀉　嗽此別無他證五味
子湯　如瘡光壯收靨時熱咳甚者人參清膈散主
之　如瘡已靨咳嗽者不因形寒飲冷所致並宜人
參清膈散主之
若涕唾稠粘鼻塞不利者乃風邪傷肺也亦惺惺散
參蘇飲主之俱初熱
若痰盛煩躁瘡亦壯熱飲冷者乃脾肺實熱也人參
清膈散主之并飲芹菜汁
若痰唾稠粘大便黑色乃胃經熱毒也用犀角湯失
并飲芹菜汁以解之
病後餘毒咳嗽者升麻湯初熱　感寒頭痛身熱惡寒
而嗽者參蘇飲　煩熱而嗽者生地黃散　風熱咳

嗽咽膈不利甘桔防風湯咽喉　兼喘五味子湯　病
後咳嗽腸疼者蓋腸居一身之左右陰陽二氣之所
行也餘毒在中二氣不能升降故腸痛用赤茯苓湯
柴胡湯發熱　加五味子桔梗枳殼等解去毒氣則
其氣行而所苦自平矣
衰若痘交七八之間而身發火熱惡嗽連聲鼻竅衝
出鮮血金虛則鳴是毒激蕩於太陰之絡故耳以杏
仁伍錢冬花伍錢門冬伍錢瓜蔞仁伍錢與梨汁共
煎爲膏時取起再加白蜜入乳緊煎數沸納於磁器
內[illegible]　一痘中惡嗽衝出

血要論令病人以款冬花杏仁貝母麥門梨汁瓜蔞之
最切熬膏投和白蜜中量數匙加人乳提去火緊封
磁器內旋旋進服嗽聲收　痘中咳嗽極為內險但
有感冒風邪於肺絡而嗽者不在此例論易治易痊
若元虛氣衰甚宜調養而男子時過十七八歲破陽
損精猶犯於此實宜按分法服治斯免夭亡矣

白朮湯　治咳嗽嘔吐痰涎氣喘通用

白朮 一兩　陳皮　白茯苓
五味子　半夏　杏仁 各壹錢
甘草 二錢

水一盞半生薑三片煎六分分二服

五味子湯　喘促咳嗽通用

五味子 貳錢　人參　麥門冬
杏仁　陳皮 各壹錢

右剉散水一盞煎六分空肚溫服兒小者分二服

人參清肺散

人參　柴胡　當歸
芍藥　知母　桑白皮
白朮　黃耆　紫菀
地骨皮　茯苓　甘草

桔梗 炒　前胡　石膏
滑石 各[illegible]

右為末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至
六分去滓溫服不拘時候兒大小加減服

生地黃散　治小兒痘疹身熱口乾咳嗽心煩等證

生地黃 半兩　麥門冬 去心　杏仁
款冬花　陳皮　甘草 [illegible]

右每服三五錢水煎徐徐服兒大加之若痰氣壅熱
肉上宜用桔梗甘草防風湯若痰上壅者佐以抱
龍丸

赤茯苓湯

赤茯苓　甘草　大青
升麻　枳殼　梔子 各壹錢

右用水一小盞生竹葉七片豆豉三十粒煎五分
分為三服看兒大小加減

桔梗湯　治久嗽肺氣傷而吐痰有血痰或腥穢或
咳吐膿血肺癰等證

桔梗 炒　貝母 去心　知母
桑白皮　枳殼 各壹錢　地骨皮
瓜蔞仁　[illegible]　杏仁 各伍分

喘論　葶藶　防巳各壹錢

五味子　百合炒各壹錢伍分　葶藶炒伍分

右每服三五錢水煎服

諸喘皆屬於火肺者藏之長也爲心華蓋心火炎上則肺焦葉擧氣逆不利而喘也有因風寒而喘者有因傷食而喘者惟瘡疹之喘獨屬於火若加洩利腹脹煩躁則不可治　如初發熱便喘者前胡枳殼湯主之大便秘者可用服此不止以葶藶丸治之　如喘而大便自利者黃芩湯加五味子人參主之

痘出後喘急痰盛宜杏仁湯人參清膈散嗽　痘瘡已出未靨之間喘渴白朮散爲甚者木香散痘瘡寒之證方河間之　如瘡正盛忽然喘急者此惡候也當詳審

之如因傷食穀氣蒸而爲熱上乘於肺作喘者宜利之丁香脾積丸傷食主之食去熱除喘自定也　如因感冒風寒而喘者麻黃湯主之　如泄瀉內虛腹脹而喘者陳氏木香散瀉主之利止喘定者生滑利不禁喘滿增減者此氣脫候也　收靨後腹脹喘渴大便利小便濇葶藶木香散　喘而嗽五味子湯　喘渴靨後餘毒不除大便堅實前胡枳殼散

錢氏法喘而腹滿大小便濇者利小便不痊者宣風散盛熱發下之　海藏法瘡疹而不利紫草甘草枳殼湯　陳氏法痘出之間或氣促者木香散主之　華

治脾胃虛弱白术散[illegible] 脾胃虛寒木香散[illegible]
并內蘊紫草甘草枳殼湯[illegible] 風邪外感參蘇飲[illegible]
內外壅滯人參消脾散[illegible] 大便自利小便澀滯
葶藶木香散 大便堅實前胡枳殼湯
杏甘湯 治瘡疹煩喘燥
麻黃 桑白皮 杏仁
甘草
右等分爲麁末每服二錢水一盞煎食後服
麻黃湯
麻黃 杏仁 甘草各等分
石膏倍用

右剉細加臘茶葉一錢水一盞煎七分去查服無
時一方無石膏有桑白皮
前胡枳殼湯 治痰實壯熱胸中煩悶則喘急
前胡 枳殼 赤茯苓
甘草各伍錢 大黃[illegible]
右㕮咀每服三錢水一盞煎六分放服
葶藶丸
甜葶藶 黑牽牛炒 杏仁另研
漢防己各[illegible]

右爲末入杏仁泥取蒸棗肉和搗爲丸如麻子大
每服五丸至七丸淡生薑湯下
葶藶木香散 治大便自利小便澀滯喘嗽腹脹不
能食宜多服爲妙
豬苓 澤瀉 茯苓
白术 官桂 葶藶
木通 木香 甘草各半錢
滑石貳錢
右剉散水一盞煎半盞空肚溫服忌油膩分爲二
服

紫草甘草枳殼湯
紫草 甘草 枳殼各等分
右每服一二錢水煎
葛根黃芩湯 治喘有汗發熱咳嗽
乾葛 黃芩各貳錢 黃連
芍藥 石膏各壹錢 五味子拾壹粒
甘草伍分
水煎服
五味子湯 治喘促而厥
五味子壹錢 人參貳錢 麥門冬

杏仁錢

右薑三片棗二枚水煎服

六味涼血消毒散

犀角升麻如無用　北丹皮　當歸

生地黃　赤芍藥　生甘草各等分

右每服三五錢水煎

涕唾稠粘

薛陳文宿先生云瘡痘涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤用人參清膈散如痰實壯熱胸中煩悶大便堅實臥則喘急用前胡枳殼散竊謂前證若肺胃實熱氣鬱痰滯或大便秘結小便赤澀煩渴飲冷宜用人參清膈散表散外邪疏通內熱使邪不壅滯若毒蘊臟腑大便秘結用前胡枳殼散疏導其裏調和榮衛使邪自解散若痰嗽涕唾鼻塞不利宜用惺惺散或參蘇飲發散外邪庶元氣不傷痘瘡輕而易

愈

人參清膈散痘欬

前胡枳殼湯痘喘

惺惺散

參蘇飲俱痘初熱

海藏云痘疹初出後聲音洪亮形病而氣不病也痘疹未發聲音不出形不病而氣病也痘疹既發聲音不出形氣俱病也氣病宜補肺散加黄耆形氣俱病宜用八風湯或涼膈散去硝黄主之小兒稟賦素弱者宜預服十奇散

補肺散

阿膠壹錢半炒成珠 牛蒡子炒叁分 馬兜鈴半錢

甘草貳分半 杏仁叁粒去皮尖 糯米壹錢炒

加生黄耆伍分

右爲末分二服水一小盞煎六分食後時時與之

八風散即八風湯

藿香半兩去土 白芷 前胡去蘆各壹兩

黄耆 甘草炙 人參各貳兩

羌活 防風各叁兩

右爲末每服壹錢用薄荷少許煎湯調服

涼膈散發熱 十奇散即十宣散見起發

有心火刑肺而失音者肺屬金主聲中有二十四空凡發諸語言者皆其空中之氣鼓動也五行金空則鳴實則啞痘疹之火起於心上熏於肺肺氣脹鬱故竅塞而無聲也以瀉白散合甘桔湯俱見喘加炒牛蒡子主之或用人參平肺散 若津液不足虛火熏蒸者宜用地黄丸腎

有毒歸腎而失聲者經曰足之少陰上繫於舌絡於横骨終於會厭會厭者音聲之戶也舌者音聲之機也横骨者神氣所使主發舌者也瘡毒伏則毒入腎邪氣上客於厭則厭不能發發不能出開闔不利故猝啞也 有喉舌潰爛而失聲者咽喉者所以司呼吸納飲食發音聲稱管籥也毒火上熏咽喉先受賁門會厭舌腭之位皆瘡所聚初出之時失於調治

以致咽喉腫塞管籥窄狹舌本強硬呼吸不能飲食不入音聲不出矣此上二證治之則難

若七日後痘瘡成漿之際而失音者乃氣喉有痘初出細小不覺及至肌表之痘成漿喉中之痘亦成漿其痘壅盛則氣出管籥窄狹故所出之聲不清而爲咽啞也大率七日前失音者爲逆躐七日後而有者不治自愈蓋外痘結痂則喉之痘自痊故也當用甘桔湯服於已發未發之前所以清其氣道使毒不犯此預治之法不可不知

若痘瘡靨後而失音者餘毒[illegible]

痛乾澀聲音不出宜甘露飲方見咳嗽 甘桔防風湯方見咽喉

天花散玄參升麻湯方見咽喉主之

天花散 治痘疹後失音

天花粉　桔梗　茯苓

訶子　石菖蒲　甘草各伍錢

右為極細末用水調在碗內小竹七莖小荆芥七莖縛作一束點火就碗內煎臨睡服每服一錢

清肺散 治患痘咽乾聲啞

麻黃壹錢伍分　麥門冬　桔梗各貳錢

知母　荆芥　天花粉各壹錢

訶子　菖蒲各捌分

右剉分為二服入竹瀝薑汁水煎服

梔子菖蒲湯 治小兒痘瘡因熱毒生風瘖啞不語

梔子壹錢叁分　石菖蒲　紫草茸各壹錢貳分

山豆根　生犀　黃連各壹錢壹分

羌活　木通　白殭蠶

杏仁　韭子　鼠粘子各壹錢

升麻　蟬蛻　薄荷柒分

右剉散每服五錢水煎食遠服

紫河車散 治小兒痘疹餘毒風不解[illegible]

不出舌頰生瘡過逆煩悶潮熱面赤

紫河車即金線重樓　茜根　貫衆各叁錢

白芍藥　甘草炙各伍錢

右每服三錢生薑一片水煎服 一方有牛蒡子

噙化丸

薄荷葉貳兩　訶子肉柒錢　桔梗壹兩

甘草柒錢　瓜蔞皮穰壹兩　白殭蠶炒柒錢

風化硝伍錢　黍粘子炒壹兩

右為極細末煉蜜丸如芡實大噙化嚥津兒小不能噙則調化頻抹其口中

嗆水

難經云會厭爲吸門胃爲賁門病症之人毒火上熏於肺灼於胃肺與胃之上口皆有瘡而傷矣水入則嗆者賁門傷則水不得入嗌入會厭會厭掩而不內故氣逆噴出而嗆也食入則叫者賁門傷則門戶隘塞食物不能直奔於胃緩則洄洑而下急則阻而吐出矣此此惡候鮮有生者其或舌上有瘡爛破如蜂窠之狀舌痛強硬不能爲用延納水穀亦使水入則嗆食入則吐待舌瘡平則安矣　咽以嚥物喉以候氣咽居後而通於胃喉居前而通於肺肺無下竅如

橐籥然能受清虛之氣而不受有形之物喉上有物若懸乳名曰會厭凡物入口則舌抵上齶舌抵上齶則會厭必掩其喉故水穀但入咽而不入喉若瘡生會厭則木強不利開闔矣飲物可入咽而水飲或漏入喉所以嗆也嗆者猶云錯喉氣須藥補湯藥不入則無補法故不可治　竊七日以前痘色紅紫而兼此證者乃火氣炎上熱毒鬱塞故也痘色灰白不起而兼此證者乃氣血虛弱肺胃受傷故也二者俱是逆證七日以後外痘蒸長光潤而有此證者是內證亦長故致如此外痘結痂則內證亦愈矣不治自

愈若治者當察毒盛之痘於其咽喉乾燥之先而用甘桔湯解毒湯加麥冬瓜蔞皮硬牛蒡子玄參荊芥之類以清氣道不使熱毒有犯則自能免此患矣

袁氏治嗆逆歌曰痘中嗆逆最凶危沉香濃汁杏仁推還把蜂糖多和水撥經煎透濾香隨欲服莫時加好乳湯中溫熱漸調之　余每詳察痘嗆者乃元氣耗鑠鼻炎上升故致嗆逆準恪後方

人乳壹鍾人參壹錢桔梗壹錢枇杷葉叁片共煎

溫查服乳或用沉香磨人乳服者雖效總不若此之屢見捷也

痘瘡疹吐利常候也經曰諸嘔吐暴注皆屬於熱盖三焦爲水穀傳化之道路熱火內迫則傳化失常而吐利併作火性燥動迅疾故也邪在上焦但吐而不利邪在下焦但利而不吐邪在中焦則上吐下利又裏氣上逆而不下則吐氣下而不上則利瘡疹初發熱時有吐利者不可遽止令邪氣上下得出也吐利久不止方可治之更宜消息前痘疹方云痘疹吐瀉蓋因脾胃不和飲食不調煩渴嘔吐泄瀉並用白朮散見渴然痘疹皆賴脾土脾土實則易出易靨萬物

得土氣溫煖而生吐瀉則傷脾土遂有更變之證夏月中暑煩渴瀉或腹痛或欠筋用五苓散見渴加藿香傷食吐瀉用小異功散見吐手足逆冷者用益黃散脾虛荳蔻丸泄利頂陷灰白用木香散痛瘡正出而吐瀉者或兒血者俱爲逆證難治窃謂前證雖因脾胃不和然邪實上焦則宜吐邪實下焦則宜瀉如吐瀉噯腐吞酸皆宜宜發但微甚不同耳張翼之云若痘疹吐瀉少食爲裏虛陷伏倒靨灰白爲表虛二者俱見爲表裏俱虛合用十二味異功散救之見形甚至寒戰咬牙亦可用若止裏虛去官桂止表虛減肉豆蔻者能食便祕倒靨爲裏實而補之則錢氏及丹溪法下之皆爲能食爲裏實裏實而補則結癰毒紅活綻凸爲表實表實而補則潰爛不結痂凡痘見痂便忌葛根湯恐發表虛也如有更變當隨證治之張

吐瀉有冷熱二證吐而不渴瀉而手足冷面色青白此冷證也益黃見脾理中湯主之或四君子加木香豆蔻亦妙既吐且渴雖瀉而手足心熱面赤唇燥喜冷此熱證也五苓散見渴竹葉石膏湯見渴加橘皮等主之大吐而身熱煩渴腹滿而喘大小便澀而赤悶亂錢氏云此當利小便不瘥者宜宣風散見發熱下之百問

方用香蘇飲吐加半夏茯苓白芍瀉加白朮茯苓煩躁嘔吐渴瀉者亦熱也白朮散見渴最當紫草木香湯亦可

理中湯

人參　白朮　乾薑

茯苓　甘草節各等分

右㕮咀用水一盞煎伍分不拘時服如惡寒加附子名附子理中湯每服二錢下

香蘇飲　治小兒痘疹作瀉

香附子　陳皮　紫蘇

川芎　甘草　白芷各等分

右剉散每服二錢水一盞煎或白水煎瀉加白
朮茯苓嘔加茯苓白芍藥

紫草木香湯　治痘出不快大便泄利

紫草　木香　茯苓
白朮各等分　甘草減半　一方無甘草

右剉散入糯米百粒水煎服每服二錢紫草能利
大便白朮木香佐之　脾氣虛者加人參

人參胃愛散　治痘瘡已發未發吐瀉不止不思飲
食或吐逆等證

人參　藿香　紫蘇
甘草炒　丁香　茯苓
木瓜各等分　糯米

右每服二錢薑棗水煎

初發熱自利而吐者黃芩加半夏湯主之　更詳審
吐利所出之物如吐酸水者利色黃或青綠者其氣
臭者皆熱也若吐清痰之水利下清白不臭未可作
熱治之乃內虛也四君子湯加訶子肉及益黃散　脾
一云痘欲出未出而吐利者是中焦停寒或挾宿
食也四君子湯加砂仁橘紅或中和散有宿食者用

紫霜丸　發熱吐瀉不止身熱口渴者四苓散
加黃連淡竹葉煎服

黃芩加半夏湯

黃芩半兩　甘草炙　白芍藥
半夏泡七次　生薑　大棗

右剉細水一盞煎七分溫服　渴去半夏加枇杷
葉去毛炙貳錢蘆根茅根各叁錢

中和散　治中焦停寒或夾宿食

厚朴壹錢　白朮　乾薑
甘草炙分

右剉細作一服加生薑一片水煎稍熱服
起脹灌膿時吐利並作宜急治之胃寒者益黃散理
中湯胃熱者黃芩半夏湯調四苓散
膿後吐瀉亦分冷熱冷者亦宜益黃理中輩熱者四
苓散竹葉石膏湯痘瘡加橘皮或竹茹湯亦可

竹茹湯

橘紅　半夏　白茯苓
黃連薑炒各壹錢　甘草伍分　竹茹壹團
葛根伍分

右水一鍾生薑三片煎五分不拘時溫服分二三服

和中湯 虛吐不止即鎮胃止吐湯加人參

人參　茯苓　甘草各伍分

白朮　半夏各捌分

藿香　砂仁各壹錢　陳皮

右用生薑水煎服

藿香正氣散 治初熱乾嘔

藿香　紫蘇　大腹皮

陳皮　桔梗　甘草

茯苓　半夏　厚朴

白芷

右當薑煎服

凡痘疹也經大吐大瀉之後口下俱脫即當用大補之劑縱有他證皆以虛論痛脾腎每不顧人元氣用藥過削而致夭枉者滔滔皆是又可慨也

吐逆

胃為水穀之海上通乎咽內而不出如初發熱有吐逆之證此火邪犯胃其氣上逆治之則易若自出現以至收靨有是證者乃痰集於咽門攻於胃脘吞嚥不利治之則難由於不知預解咽喉之法漸變為失音嗆水而不可救矣　初虛世六痘瘡吐逆無痰益黃散胃寒者宜之有痰二陳湯大利飲或橘皮半夏湯不止者加丁香藿根枳根橐黃連胃熱宜加若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香散異功散吐而身熱煩渴腹滿喘大小便澁而赤者當利小便不瘥者宜屈散下之虛證勿用

醫通 前證若手足並冷渴飲熱湯或腹作痛中氣虛寒也宜用益黃散手足不冷吐逆痰涎中氣虛弱也宜用橘皮半夏湯手足並熱煩熱赤澁滯也宜用導赤散口乾飲乳不徹胃經氣熱也宜用竹茹湯吐逆不乳或吐乳酸穢此脾氣虛而乳食停滯也宜枳朮丸　如初發熱吐不止此火氣上逆也茱連散主之

茱連散

黃連半兩　吳茱萸貳錢

右二味同炒研細末每服半錢作薑湯調服

橘皮湯

橘皮　半夏　白茯苓半錢

右㕮細加生薑五分水一盞煎七分去查溫服

橘皮湯　治嘔吐不止飲食不入

陳皮　人參伍分

右水煎作三四次服之

橘皮半夏湯

橘皮　半夏等分

右每服三錢薑棗水煎

因飲水過多而嘔吐者此水逆也五苓散主之

傷食而嘔吐者以丁香脾積丸微利之

無上證而嘔噦者人以胃氣爲本胃者土也土敗則木來侮之今木挾相火之勢上乘乎胃其氣自臍下直犯清道上出於賁門胃上口也微則乾嘔甚則噦土敗之象也太素曰絃絕者其聲嘶敗木陳者其葉落病深者其聲噦知鍼無取以藥無攻謂不治也

附方

丁香煮散　治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香不見火　紅豆　甘草

乾薑　青皮　川烏去皮

陳皮　良薑　胡椒

益智各等分

右㕮散每服三錢用水一盞生薑三片煎六分加鹽一捏不拘時服

加味鼠粘子散　治咽中有痰作嘔

桔梗　射干　山豆根

防風　乾葛　陳皮

荊芥　連翹

水煎細細呷之

燈心竹葉湯　治乾嘔

竹葉叁拾片　燈心叁拾根

水煎服

治嘔吐并叫瀉不止水穀不納者速効

多年竈心赤色土爲細末每服二錢米飲調下小兒只一錢

瀉利

凡瘡未出而利者邪氣併於裏腸胃熱甚而傳化失常也黃芩湯主之　如自利清白色者爲裏寒理中湯主之

黃芩湯

黃芩壹錢半　甘草炙壹錢　白芍藥陸錢

右剉細加大棗二枚水一盞煎七分溫服食前

瘡已出而利者邪氣併於表正氣方逐邪氣主乎表而不主裏則裏氣虛不能停納水穀故亦自利也宜從氣虛而治九味理中湯倍人參加黃耆白芍藥

九味理中湯

人參貳錢　白朮　乾薑炮

訶子肉　茯苓　木香

藿香葉　肉豆蔻煨　甘草炙各壹錢

水煎食前通口服

瘡疹所忌內虛泄瀉凡覺腹疼或漉漉響趨小腹者皆欲作利宜先以法治之九味理中湯治之不止此開腸洞泄惟澀劑可以收之宜豆蔻丸不止則用赤石脂蓮肉散止之庸醫每不敢用澀藥恐澀住邪氣不知邪氣之熾莫如傷寒而張仲景治挾熱自利每用石脂蓋澀劑之大者猶寒劑之大熱熱劑之大寒是謂對證之藥今既滑泄不已自當收澀又何疑焉如服澀劑而又不止則根本已撥無能爲矣經曰倉廩不藏者是門戶不要也金匱要略曰六腑氣絕於外者手足寒五臟氣絕於內者利不止五奪之中此爲最甚但正氣內脫者淹延而死邪氣內陷者煩渴而死此爲異耳

陳氏豆蔻丸　治瘡疹泄瀉

木香　砂仁　白龍骨

訶子肉　肉荳蔻煨各半兩　赤石脂

枯白礬各柒錢半

右爲末糊丸如黍米大一歲三十丸三歲百丸溫米飲下瀉止勿服

自起發以至收靨大便常宜堅實忽然自利者理中湯丸主之

理中湯丸

人參　白朮　甘草

乾薑各等分

右剉碎水二盞煎一盞去滓溫服若欲爲丸研細末煉蜜丸如彈子大每用一丸白湯化下

參朮丸　治小兒脾胃傷冷外熱裏寒不思飲食身

當此熱大便或泄色白或起發疹身作大熱飲食
冷物或冷藥過度或瀉或腹脹或已出發疹瘢白
無血色此由表寒脾胃伏冷榮衛不行致令毒氣
內伏不出宜服之其發瘢白無血色者皆從瘢白
四圍紅暈再起作膿結痂而愈

人參　白朮　乾薑炮

甘草炙各壹分

右為細末米糕泡糊為丸如麻子大每服百餘丸溫水呑下或米飲亦得乳食前服前世之書如仲景諸論治傷寒云輕者用理中湯重者用四逆湯此乃胃足陽明經而感寒邪脾胃乃為中州之府故用理中湯曰辛甘發散為陽以退寒邪也理中湯煉蜜丸而嚥下曰理中丸蓋添蜜甘以入脾胃嚼而便化於中焦今參朮丸以粳米糕為丸取其難化服在脾胃滲泄漸得消化則中焦得煖脾土乾燥其熱自歸此所以能治熱也

胃主腐熟水穀大腸主傳送已化之物故食多少可以知人穀氣之虛實大便滑澀可以知人臟腑之冷熱大便如常是亦發疹之一順也如起發之時忽然泄瀉此宜急止之恐腸胃虛損氣脫也須辨冷熱虛實如瀉而手足冷面色青白發不紅綻者冷瀉也理中湯丸豆蔻丸益黃散脾甚則陳氏木香散異攻散決出不快皆可用也瀉下之物黃又酸臭渴手足心熱面赤瘡紅綻燃發者熱瀉也黃芩湯五苓散驚主之脾胃怯弱精神慢而不食者為虛當溫養之益黃散身熱中滿渴而不食者為實當清利之五苓散其人或藏氣自脫或因服凉藥致令瘡疹陷入大腸瀉下如豆汁或便膿血或便黑汁口內臭氣唇焦目閉加腹脹者必死之證

如因飲冷水自利者所謂濕勝則濡泄也宜溫中利小便以理中丸溫中以五苓散利小便去水

如因傷食自利者所由酸臭所謂飲食自倍腸胃乃傷也宜先去其積丁香脾積丸傷食後補脾胃益黃散脾

如結痂之時暴泄不止者消息所出之物痂皮膿血者順水穀不分者逆如利膿血不止者此熱毒下流也香連丸主之

香連丸一名香橘丸

黃連淨去鬚以吳茱萸同炒去吳不用伍錢　木香半兩

石蓮子去殼取肉　陳皮半兩

右爲末醋調神麴糊爲丸如麻子大每服二三十丸
丸陳倉米湯下

丹陳牙兒十九歲出痘有紅斑吐瀉而渴

蒼朮壹錢　白朮　陳皮貳錢
黃耆　茯苓　甘草炙
硇砂　當歸各五分錢半

薑三片同煎服

從子六七歲時患痘瘡發熱微渴自利一小方脈視
之用木香散每貼又增丁香十粒予切疑焉觀其出
遲因問自利而氣弱察其所下皆臭滯陳積因腸胃
熱蒸而下也恐非有寒而虛遂急止之已投一貼矣
繼以黃連解毒湯加白朮與十貼以解丁香之熱利
止瘡亦出其後肌常有微熱而手足生癰癤與涼劑
調補踰月而安　一男子十七歲出痘熱時出根腳
密嘔吐不食腰背骨節痛大渴飲痛腹亦痛全不食
者半月餘脈浮弦洪而數與參芪歸朮炙甘草陳皮
半夏生薑煎服之至五日色淡又加桂此少歸者俱
用酒製至七日癢甚加丁香數粒附子些少癢止至
八日九日渴大作而腹泄瀉癢甚至十日寒戰遂用
白朮爲君芍陳參炙甘草歸爲臣至十一日不厝或

瘥或譫語但守前藥半月後有吐出痰多而安

陳氏十一味木香散　治痘瘡腹脹渴其效如神

木香　大腹皮　人參
官桂　赤茯苓　青皮去白
前胡　訶子皮　半夏
丁香　甘草炙

右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片煎空心溫服
魏氏功散集驗方瘡痘頭溫足冷腹脹泄瀉
痘疹不渴惡寒下利四君子加乾薑湯主之
痘疹大便不固瘡漸黑陷小兒乳母同服

人參　白茯苓　肉豆蔻
黃耆各半兩　甘草炙

右㕮咀每服一錢水半盞薑五片棗一枚煎三分
乳母倍服若大瀉手足厥冷加附子用驗

治中散　虛寒瀉利不進飲食

黃耆　人參　茯苓
白朮　川芎　當歸
肉桂各伍錢　肉豆蔻麵包煨去油
丁香壹錢　木香各一錢

右爲末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋煖少
頃痘變紅活而起

大小便閟

劉提點云疹痘最要大小腑分曉所以錢氏四聖散用木通枳殼極妙若大小腑门流利則不必苦泥

蓋凡痘疹小便欲長大便欲實經曰小便數者大便必鞕雖二三日不更衣無苦也如小水少則病進蓋心主痘而屬火心移熱於小腸小腸移熱於膀胱膀胱爲津液之府氣化則出氣爲火食不能傳化而津液不出故小便閟也痘疹發熱大便欲潤若二三日不行宜急利之恐腸胃不通榮衛不行痘出轉密也惟痘起發之後大便却宜堅實如能食而大便當行者不須忌之若過四五日不行則熱盛生癰其痘難靨亦宜微利之設使大小便俱不通則邪毒內畜三焦阻絕經曰一息不運則機緘窮故大小便不通者死

凡痘子要大小便自調則表裏和無留邪也故小便宜長而清如小便赤濇導赤散主之小便短少八正散痘出太密小便不通者連翹湯主之蓋痘子發熱不可驟去惟利小便以折其熱如[illegible]小便少者此氣血衰少津液虛耗[illegible]也不可利之反損真陽之氣十全大補湯主之能食者大便宜潤有入必有出也

不能食者大便宜實行其穀氣以養血氣也如四五
日不行大便結燥者川芎湯導之不通以三黃丸
[illegible]微利之如大結腹脹者以三乙承氣湯下之如大
便泄瀉則止之蓋痘瘡要裏氣實泄瀉得脾胃虛也
輕則理中湯丸[illegible]益黃散[illegible]豆蔻丸[illegible]陳氏木
香散[illegible]異功散[illegible]
聞人氏云痘出正盛喘促腹滿[illegible]肝臟[illegible]有汗
或[illegible]不安[illegible]小便赤而大便不通者小承氣湯[illegible]
之類下之若色赤黃大便秘澀小便少而或喘者宜
小柴胡湯[illegible]熱甚而榮衛閉塞則血氣凝澀如裏

毒盛者大便不通小便如血如表熱盛者或為癰瘡
身上破裂此皆因不什解利之故俱宜犀角地黃湯
[illegible]小柴胡湯加生地黃四順飲[illegible]牛黃散[illegible]
紫雪[illegible]若救之若毒凝血聚搐成黑色大小便秘
喘急煩躁者治法見險色條
治大小便俱不通以[illegible]燒灰存性為末米飲調下
葵子末[illegible]合水一盞煮[illegible]下師入豬脂半兩空心
服

小便不利 痘疹[illegible]未出之先小便不利熱盛
者恐欲起[illegible]川導赤散[illegible]熱入膀胱如有
血淋犀角地黃湯[illegible]初出不快小便赤澀四聖散
見形[illegible]已出而赤澀白术散[illegible]加木通五苓散加
木香[illegible]收靨之後小便不利煩熱而
渴豬苓散[illegible]靨前[illegible]若小腸熱結用導
赤散 肝經熱用柴胡麥門冬湯[illegible] 脾經熱用犀
角地黃湯 肺經熱用生地黃湯[illegible] 腎經熱地
黃丸[illegible] 靨後氣血虛弱用八珍湯[illegible] 中氣虛弱
用五味異功散[illegible] 凡痘疹小便少者熱微導赤
散加山梔仁熱甚八正散主之

八正散 治下焦積熱大小便不通或小便淋澀脈
證俱實者

大黃酒炒 車前子炒 瞿麥
萹蓄 山梔炒 木通各壹錢
滑石貳錢 甘草五分

右每服二錢水煎

滋腎丸

黃蘗炒黑 知母炒黑各貳兩 肉桂貳錢

右為末水糊丸

黃芩清肺飲

黃芩炒 山梔炒各等分

右每服二錢水煎

紫草木通湯 治痘瘡出不快小便不利

紫草 人參 木通

茯苓 糯米各等分 甘草減半

右水煎服

通關散 此藥通心經利小便

山梔仁 大黃各壹分 木通

甘草炙 車前子炒 赤茯苓

瞿麥 人參 滑石各叁分

萹蓄炒伍分

右剉細用水一盞燈心十根煎半盞溫服

連翹湯

連翹 防風 瞿麥

荊芥穗 木通 車前子

當歸 柴胡 赤芍藥

白滑石 蟬蛻 黃芩

山梔子 甘草炙各伍分

右剉細加紫草五分水一盞半煎一盞大小兒食前溫服

紫草冬葵湯 治小便不通夾氣閉塞

紫草茸 山梔子 黃芩各壹錢

秦艽 苦參各柒分 冬葵子壹錢半

露蜂房 白茯苓 木通

白芍藥 澤瀉 車前子各壹錢

蟬蛻捌分

右剉散每服四五錢水煎食遠溫服 如急數莖中痛者加甘草梢捌分苦楝子壹錢如痛甚欲死者加川牛膝壹錢叁分如有赤如血色者加胡黃連壹錢叁分如溺血者加當歸壹錢川芎壹錢蒲黃火煅兎絲子各壹錢紅甚者加生地黃白濁者加使君子各壹錢叁分黃連壹錢壹分韭子研壹錢貳分濁甚者加桑螵蛸壹錢

大便祕 附陳文宿先生云痘疹四五日不大便以肥豬肤白水煮熟切豆大五七塊與食之滋潤臟腑瘡痂易落切不可妄投宣利之藥恐真氣內虛瘡毒入裏如六七日身壯熱不大便其脈緊盛與三味消毒飲見形微利之稍間前證若毒在肌肉而未能盡發脉浮而緊者宜用此藥疏解其毒若脉沉而緊者宜用前胡枳殼散 疏通其氣以絕其源若口舌咽喉腫痛瘡毒甚也用射干鼠粘子湯 若大便既通

作渴飲湯則胃氣虛也用人參白术散方見前凡煩熱在
直腸不能下者宜用豬膽汁導之忌用疎利之劑恐
復傷胃氣則瘡未出者不能發出已出者不能灌膿
大抵分辨虛實當以手足冷熱或飲水飲湯驗之
煩如發熱時大便不行熱微者一黃丸方見上甚則承
氣湯主之　如起發至收靨大便不行者用膽導法
不可攙用利藥　但瘡乾黑而大便秘煩躁者以百
祥丸牛李膏方見上主之如無此藥以承氣代之

當歸丸

當歸半兩　甘草壹分　黃連[illegible]
[illegible]
大黃各貳錢半
先將當歸熬膏子入藥末三味為丸加服之以利
為度

棗變百祥丸　治斑疹大便秘結

紅芽大戟去蘆　青州棗去核貳拾枚
右用水二盞同煎至水盡為度去大戟將棗焙乾
可和作劑旋丸從少至多以利為度

洗心散　治瘡疹壯熱大小便不利狂言多渴

大黃　甘草　當歸
麻黃去節　白术　芍藥
荊芥各等分
右㕮咀量病輕重多少[illegible]煎溫服則半熱服
則溏

三乙承氣湯

大黃　芒硝　厚朴
枳實各壹錢　甘草二分
右剉細水一盞加生薑一片煎至七分去滓食前
熱服

膽導法

用大豬膽一枚以葦筒兩頭截齊一頭入膽中[illegible]
線牙札定吹令氣滿納入穀道中直待氣通取去

加味四君子湯

人參　白术　黃耆
白茯苓　甘草　瓜蔞根
桔梗
各等分水煎服　海藏以此治瘡疹已出未出大
便秘澁或因發渴者有病者或因稟受不足或因
吐瀉之後或因汗多或利小便亡氣既虛津液乾
涸不得潤滑而致大便秘澁者若妄行疎利何異
操刀必須此藥治之醫家切宜詳審勿令誤也

潤腸湯　治虛秘

當歸梢　甘草　生地黃

火麻仁　桃仁泥

水煎服

紫草麻仁湯　治痘疹大便不通致毒氣閉塞

山豆根　紫草各壹錢　鼠粘子

露蜂房　生犀壹分　青皮

桃仁　麻仁　側柏葉

黃芩各壹錢　杏仁壹錢貳分

右剉散每服四五錢水煎食遠服秘甚者加烏梢

肉叁分不已再加冬葵子壹錢伍分

金壇王肯堂宇泰甫輯

痘瘡下

寒戰咬牙

寒戰者森然若寒振振然搖動也咬牙者上下片牙相磨而鳴也經曰諸風掉眩皆屬肝木寒戰而振振搖動風之象也火氣衝物亦然錢氏曰肝主風虛則咬牙多欠又曰上竄咬牙心熱也然則寒戰咬牙總屬一證上之或以寒戰為氣虛咬牙為血虛或以咬牙為齒槁謂津液不足者皆不知此症痘瘡所惡者寒戰咬牙或單見一證或二證並見若瘡已壞加之喘促悶亂者死無日矣　凡痘瘡者瘡本稠密轉動之間身體振搖者此一身被瘡所困不能支持轉動艱辛之故不可使作寒戰及投熱藥也有只咬牙者此心肝二經火旺也蓋肝主筋心熱者亦咬牙勿便作不治論

如瘡初出而寒戰者此邪氣將出外與正爭故振振搖動火之象也瘡出乃定柴葛桂枝湯主之　瘡已出或已成漿而寒戰者表氣虛而不勝邪氣之戰也

養衛化毒湯主之　如瘡本稠密焮發肺痛經脈動
搖時時振動者不可謂之寒戰待膿成痛去而解
收靨之時痂皮隱痒但或時戰慄者此正氣將復不
能自持之兆不必服藥須臾自定　有筋惕肉瞤者
經絡之血爲膿所耗不能榮養肌肉主持筋脈故惕
惕然而手足自跳瞤瞤然而膚肉自動也不可謂之
寒戰但養其氣血十全大補湯主之　醫一小兒
十四歲痘將愈忽寒戰手足並冷脈微細而不及兩
寸乃脾氣虛熱用五味異功散獨參湯十全大補湯
而愈　一婦人愈後寒戰脈浮大按之微細此血氣

益虛用十全大補湯二十餘劑而愈後因勞寒熱往
來寒時手足如冰熱時手足如炙脈浮大重按則細
此陽氣虛甚也朝用補中益氣湯加桂附各一錢夕
用八味丸料倍加桂附各五十餘劑而安

柴葛桂枝湯

柴胡　葛根　甘草
桂枝　防風　人參
白芍藥各等分

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去滓溫服不
拘時

養衛化毒湯

人參　黃耆炙　桂枝
甘草　當歸

右水煎服

初虞世云瘡疹寒閑傳或發寒戰能令痘子縮伏宜用
陳文中異功散方見治出不快條　楊氏云實治痘瘡寒
戰用白朮耆歸加芩治之愈

袁氏獨附湯治寒戰

大附子去皮臍伍錢　麪

用水一鍾煨薑七根煎服

右方加人參貳錢肉桂伍分黃耆貳錢橘紅壹錢
甘草伍分當歸壹錢則爲附子振陰陽治寒戰咬
牙捷效方也但紫黑伏陷者不用

咬牙呵欠者肝虛也肝屬木臨官於寅寅爲相火火
盜木之氣故肝虛之證形焉陽引而上陰引而下則
開而欠也陽上極而下陰下極而上則合而齧也十
全大補湯主之　如發熱之初便咬牙者此與瘛瘲
吐瀉脾胃弱者不同須辨形證分治之若多欠咬牙
頓悶者肝藏風熱也羌活湯主之痘發目上竄咬牙者心
藏熱也導赤散心不可妄用陳氏辛熱之劑　上竄

咬牙亦熱也，諸瘡皆屬心火，火主疏，若火炎上之象
也。咬牙者，火氣動搖之象也，導赤散加酒炒黃連、牛
蒡子主之。 咬牙兼面赤作渴，至夜為甚者，宜地黃
丸。 癥一小兒痘瘡咬牙，面黃飲湯，此陽氣虛弱也，
用五味異功散加木香而愈。後仍咬牙，面赤作渴，至
夜後甚，此脾腎陰虛也，用地黃丸、大補湯而愈。 一
小兒咬牙作渴，面色忽白，此陰虛。脈洪數，按之無力，左
關尺脈，此肝腎虛也，用地黃丸、補中益氣湯尋愈。
後因驚，面青目赤，呵欠咬牙，手尋衣領，此肝經虛熱，
用加減八味丸料煎與恣飲，頓安。又用補中益氣湯

而痊。 一小兒咬牙作渴，飲冷，大便微秘，寒戰，痘赤
多在身側，此屬膽經虛熱也，用小柴胡湯、柴胡麥門
散各一劑，又用加味四物湯而痊。
清神化毒湯 治心肝火旺，其牙相戛而鳴者。
升麻 生地黃 木通
甘草 防風 麥門冬
右用水煎服
人參蟬蛻散 治咬牙喘滿，煩躁作渴。方見痘煩躁
錢氏白神丸 治咬齒甚妙
如寒戰咬牙併作者，則少陰專主之，觀其瘡本

瘡不潰，與寒戰咬牙者，此手少陰心火也。經曰：熱勝
則肉腐。寒戰咬牙，火氣動搖之象也。 如瘡本焦黑
寒戰咬牙者，此足少陰腎水也。腎主蟄，為封藏
之本，乾黑者，其色也見也，腎氣實，在變動為慄，寒戰
者腎本病也，腎主骨，牙為骨餘，寒戰則鼓頷而兩牙
相軋，咬牙者，腎實所發也。此二證者，在心熱則清之，
在腎實則溫之，其病已壞，治之何益。 或因陽氣虧
損，咬牙寒戰者，獨參湯、參附湯，甚効。 若血氣不榮
而不能應兼以悶亂不寧，卧則噯氣泄瀉，寒戰咬牙
者，陳氏異功散見形不快條加木香、當歸以救之。 錢氏

法寒戰咬牙，黑陷者，百祥丸下之。方見黑陷 謹按前證，若
手足並冷，渴飲熱湯，大便泄瀉者，陽氣虛寒也，宜熱
補之。手足不冷，大便不利，渴飲溫湯者，脾氣虛熱也，
宜調補之。手足不熱，大便不利，渴飲熱湯者，脾胃虛
弱也，宜溫補之。 一小兒出痘寒戰咬牙，四肢倦怠，
大便自利，手足并冷，飲熱湯，此陽氣虛寒也，用十
二味異功散，寒戰咬牙頓退，次用人參白朮散，參
賞四聖散而靨。 一小兒十四歲，面色忽赤，忽黑，出
痘寒戰咬牙，作渴煩熱，喜飲熱湯，此陽氣虛寒也，用
十全大補湯，煩渴頓止，乃以八珍倍加參耆至靨

漿入後潰爛面赤此膿成而血氣虛也用當歸補血湯
面爛全身徐徐而赤此湯或時發慣瘡狀如猪
或時靨時浸大被之如無此血脫也用大補當歸
補血湯而安　一小兒膿不灌漿寒戰咬牙脈虛弱
此胃虛弱用四君肉桂歸耆肉豆蔻又用參耆四聖
散而痊後用托裏散四君子湯而靨　一小兒發熱
寒戰咬牙喜飲溫湯手足不熱屬陽氣虛弱也用參
耆托裏散諸證已退用參耆托裏散其漿漸灌用十
全大補湯其痂頭靨　一小兒出痘寒戰咬牙腹脹
足冷身熱此脾胃內虛寒外假熱也大補湯加
附子　　八
去附子乾薑二三劑仍用參耆四聖散
異功散加歸耆治之而痊　諸書多以寒戰
咬牙併作為不治之證然能治之多有生者蓋熱
不借盡發內與正氣相搏則筋脈因之而動搖人
之一身惟手足能運動口能開闔皆虛境也相搏之
咬手足戰搖而口齒相戛矣

四聖散　治臨危痘瘡寒戰咬牙

人牙自落者不拘多少火煅存性入韭菜汁內淬牙一二次火牙二次研極細末
雄黃　珍珠各伍分

右俱研為末每服三五分多則一錢用荔枝煎湯

下　一方有牛黃二分

透骨解毒湯　治寒戰咬牙

紫草　甘草　當歸
防風　陳皮　赤芍藥

右各等分水煎服

催漿丹　痘疹入九朝膿漿雖不充裕倏然寒戰咬
牙以此治之

虎牙　人牙各壹枚煅灸研細和人參□□
和服

滴滴金　治寒戰咬牙

狗頭上肉留服燒酥炙脆細研為末酒煎酒下　　七

厥逆

逆者四肢逆而不温也厥者冷也又甚於逆四肢者諸陽之本常宜和煖如指頭微寒者陽氣衰也（陽氣起於十指之端）足心冷者陰氣勝也（陰脈集於足下而聚於足心）如瘡本焦黑煩渴躁悶喘促而厥逆者此陽毒内陷熱氣逆伏手足爲之冷所謂熱深厥亦深火極似水者如瘡本灰白泄利而厥逆者此元氣虛憊陰陽不相順接而手足爲之冷也瘡疹之証頭常欲凉足常欲温故頭温足冷者不治厥逆乃瘡家惡証也

如因熱深而厥者大便不通三乙承氣湯（便實）主之

[illegible]

瘡黑者百祥丸牛李膏主之（[illegible]）如因泄利氣虛而厥者陳氏木香散（見前）異功散（俱出[illegible]）主之　但十指頭微寒者四君子湯（不食）理中湯（吐利）並加桂主之

瘡疹發熱手足却宜和煖雖云足屬腎要凉凉非冷也只與常人同遍身皆熱而此同常人故稱凉亦和煖之意非真冷也若手足冷由其人脅多吐瀉脾胃虛怯脾主四肢所以冷冷爲惡候不可單用發表反損脾胃宜和中發表兼用痘由以脾胃爲主又宜急與术作湯以飲之不可因循坐誤發中也先以黃耆建中湯（腹痛）加防風羌活或四君子湯加黃耆桂枝防風以發之發後以四君子湯加黃耆白芍藥當歸桂心以補脾胃養氣血而助痘瘡之成就也

如瘡始出手足便冷者其人先有吐利四肢冷皆由氣虛脾胃氣弱不得至經理中湯加桂主之

參附湯　治痘瘡陽氣虛寒咬牙寒戰手足逆冷或吐瀉不食飲沸湯不知熱用獨參湯加好熟附炮如法者研粉先加一錢未應多加之追不應加至四五錢或等分亦無妨但用之以追其陽氣如已脱者不治

二神散　治傷冷體寒肢冷腹痛口氣冷難發斑疹

[illegible]　　　　九

[illegible]

丁香（去粗）　乾薑（炮）一[illegible]

右爲末每服五分白湯送下蓋被片時令脾胃溫煖陰反爲陽但則元變順合還見大小恇宜用之

眼目

蓋目者心之使也凡痘疹發熱之初觀其兩目倦不欲開者痘也目中汪汪若水者疹也諸證皆發於心故候見於目也目赤者熱甚也心惡熱急解之經曰肝通竅於目痘疹發熱目連劄者肝有風也風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也目直視者肝有熱也熱入於目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉眄故目直也得心熱則搐者風火相凡痘疹發搐此其常候但爲心肝上之火搐止則[illegible]不止則凶經曰五臟六腑之氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡氣之精爲白睛肉之精爲約束裹擷痘瘡之毒發於五臟六腑毒之甚者眼必受之古人有護眼之法其意深矣凡痘出太甚兩眼常出淚者肝熱也此時眼中無瘡但內服瀉肝火之藥蓋眼中之瘡常在收靨之後有之如瘡入目成膚翳者切不可用點藥恐損睛破也成瘢久矣痘瘡收後目不可開者肝熱則目澀不敢開明暗皆然心熱見明則合睛皮閉而不明此有餘熱在心肝也如痘未收之際先目閉者痘已過期收靨不齊目閉不開者

瘡壞欲變目上竄者心絕也直視不轉者肝絕也悲泣而淚自出者肝絕也微瞋者氣脫也血貫瞳子者火際水竭皆死候也　護眼法見見形證治

痘毒入眼而虛弱者不宜涼劑俟靨後治之雖有目翳切不可用點藥只宜活血解毒俟五臟和平翳當自去若誤用點藥則非徒無益而反害之

凡痘傷眼必用山梔赤芍決明蒺藜連翹防風桔梗升麻木賊末之調服如眼無光過百日後血氣完復則自明矣

張炯治痘疹後生翳　以眼或生翳膜赤黑之類宜用四物湯加荊芥防風煎服兼用黑豆皮穀精草海蛤粉等分爲末用熟豬肝切片蘸服神妙

又痘後生翳數服効　穀精草等分洗淨[illegible]見火焙日爲細末每[illegible]次米下

錢氏[illegible]　[illegible]　瀉肝散治痘疹太盛服之不久[illegible]

蟬蛻散　治痘瘡入目[illegible]者月取効

豬羊蹄甲[illegible]　蟬蛻末各一兩

右二味研入羚羊角細末一分拌勻每服一字百

月外周一二分三歲二三四分泉水或新水調下
三四夜二一食後一年已上者不治
治瘡疹入眼
馬屁勃　蛇皮各半　皂莢子十四
右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細温酒調下
三錢食後
治瘡疹入眼或翳
栝蔞根半兩　蛇皮二錢
右為細末用羊肝一箇批開入藥末二錢麻線纏
定米泔煮熟頻與食之兒未能食肝乳母多食之

又方
用蟬蛻末以水煮羊肝湯調服二三錢
海藏地黃散　治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤翳
或白膜遮睛四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者
多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼
熟地黃　當歸各一分　黃連
大黃煨　防風　羌活
生犀末　蟬蛻去土　木賊
穀精草　白蒺藜　沙苑蒺藜各半
生地黃　木通　甘草炙各一

玄參伍分
右為細末每服壹字或五分量兒大小加減煎
肝湯食後調下日三夜一忌口將息大人亦治
東垣云治瘡瘡風熱毒翳膜氣遮睛以瀉青丸治之
大効初覺易治
實服用竹葉湯和沙糖水化下瀉青丸二丸漸至微
利神効
癍入眼用決明撥雲密蒙花通聖蛤粉散之類然無
出此書海藏云莫若病時臨證而取不使毒氣轉入眼中矣尤妙然眼有五輪亦當求責此言為
失治者說也

決明散　治瘡疹入眼海藏云此少陽太陰之劑
決明子　瓜蔞仁各半兩　赤芍藥
甘草炙各一分
右為細末入麝香少許令勻每服[illegible]錢生米泔調
下臨卧服
[illegible]散　治瘡疹入眼及生翳
用桑螵蛸真者壹兩炙令焦細研搗為末入麝香
少許每服二錢米泔調下
密蒙花散　治小兒瘡疹入眼及無辜疳氣入眼
密蒙花三兩　青葙子　決明子

車前子各一兩

右末拌勻用羊肝一大片薄批糝上濕紙裹煨熟[illegible]
量多少空心服之 李氏[illegible]藏一云即羊肝散

通聖散 治瘡痘入眼及生翳

白菊花如無以甘菊代之不如白菊好 菉豆皮

穀精草一兩[illegible]

右爲細末每服一大錢柿乾一箇米泔水一盞同
煎候米泔盡只將柿乾去核食之不拘時日三枚
日近者五七日遠者半月取効

蛤粉散 治小兒瘡子入眼

穀精草 蛤粉各等分

右爲細末每一錢七猪肝一兩許批開糝藥捲了
用竹箬裹麻線縛定水一碗煮令熟入收口甕瓶
熏眼候溫取食之日作不過十日退

眼閉[illegible]開者肝經熱也用消毒救苦湯[illegible]子母同
服或先用柴胡麥冬散[illegible] 次用四物湯[illegible] 加山
梔[illegible]目赤腫痛者亦柴胡麥冬散并穀精散治之
倪氏維德啓微集治[illegible]瘡餘毒不解未滿二十一日
上攻眼目生翳膜淚侵多紅赤腫閉者亦川消毒救
苦湯治効 如痘稠密面腫目閉未收靨而眼忽先

開者[illegible]
元氣盛有[illegible]致令目晴上吊而露白者[illegible]
時人[illegible]
[illegible]之七日之後有此十生六七七日之前
[illegible]百無一生無魂失志者不治不省人事者不治

明目散

當歸 川芎 防風

山梔仁 龍膽草 柴胡

木賊 羌活 密蒙花各等分

右剉爲末每服一錢淡沙糖水調服

[illegible]明目散 治眼目風腫及生翳膜等疾

[illegible]殼[illegible] 地骨皮 黃連[illegible]

牡丹皮 白朮 蒼朮[illegible]

[illegible]花[illegible] 龍膽草[illegible] 甜瓜子[illegible]

右爲細末每服一錢半荊芥煎湯調下食後[illegible]
各一服[illegible]時疾後[illegible]毒上攻眼目甚効忌熱[illegible]
豆腐醬等物

蟬蛻散

蟬蛻 密蒙花 黑豆殼

菉豆殼 明月砂各等分

共為末每用二錢以豬羊肝一片批開入藥末
在內麻扎定米泔煮熟與食肝飲湯

密蒙花散 治痘入目翳膜遮睛

密蒙花 菊花 石決明
白蒺藜 木賊 羌活

右為末每服二三錢茶清調下

兔糞散 治痘入眼

兔糞焙黃為末用蟬退木通甘草煎湯調服亦可
煉蜜為丸酒送下三五十丸

兔糞丸 治痘入眼或生翳障

兔糞 石決明 草決明
木賊 白芍藥 防風 各一
當歸 穀精草 二錢

右為末蜜丸菉豆大每服三五十丸荊芥湯送下

吹耳丹

[illegible] 飛丹

為細末左眼翳吹右耳右眼翳吹左耳只吹一二
次

又方 加蒼耳[illegible]麝香少許 外用石燕子一對[illegible]
壹聖二味磨水常服

洗肝散

大黃 梔子 防風
薄荷葉 當歸 川芎
羌活 各等分

右剉散每用三錢水一盞煎六分不得煎熱空肚
涼服

防風散 痘疹後風熱上攻目赤腫流血及痘風瘡

荊芥穗 當歸 川芎
防風 赤芍藥 防巳
[illegible]

右各等分為細末每服一錢茶清調下作湯煎服
亦可

加味四物湯 痘毒入目血熱不散兩眥昏赤兼治
痘瘡

當歸 川芎 白芍藥
防風 生地黃 荊芥 各等分

右剉散每服五錢水一盞半煎一盞分作二三次
服

羌活防風散 日三服一切翳障皆可磨去

羌活 防風 川芎

甘草　木賊　菉豆皮
荆芥各三分　蟬蜕　穀精草
蛇蜕　雞子殼各二分（用內膜皮）
右為極細末茶清調下每服一錢食後服
秦皮散　治大人小兒風毒赤眼痛癢澀淚昏暗羞明
秦皮　滑石　黄連各等分
右每用半錢湯泡乘熱洗
仙靈脾散　治痘疹入眼
仙靈脾　威靈仙各等分
右為末每服半錢米湯調食後下
蒺藜散　治痘疹入眼
蒺藜　甘草　羌活
防風各等分
右為細末每服二錢米湯調服如撥雲見日之効
蟬菊散　治痘疹入目或病後生翳障
蟬蜕淨洗　白菊花各等分
每服二錢入蜜少許水煎食後服
菊花散　治瘡疹入眼諸證
白菊花　菉豆皮　密蒙花

旋覆花　穀精草　甘草
每服二錢用柿餅一枚粟米泔一盞煎水乾為度
取柿餅食之五七日即効
丹溪治瘡後目翳穀精草蛇蜕菉豆殼天花粉為末粟米泔浸煮乾為度食之
浮萍散　治瘡疹入眼痛楚不可忍
浮萍草陰乾為末每服一二錢用羊肝半片入盃內以竹杖刺碎投水半盞絞汁調藥食　服之已傷者十服九効
羚羊角丸　治小兒腎虛宜肝腎明目
羚羊角取末　酸棗仁去皮　肉桂不見火各一
虎脛骨醋炙　防風　當歸
黄耆各一分
右為末煉蜜丸如皂子大每服一丸食前溫水化下日進三服
羚羊角散　治肝熱實熱眼目昏暗時多熱淚
羚羊角鎊　羌活去蘆　玄參
車前子　黃芩去黑　山梔仁
瓜蔞根各　胡黄連　菊花各三分
細辛去苗一分

右為細末每服一錢食後竹葉煎湯調服

羚羊角飲子 治黑翳如珠外障

羚羊角 五味子 大黃

知母(兩各一) 芒硝 防風(兩各二)

右剉每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服此方宜斟酌用之不可輕率

撥雲散 治小兒痘疹後眼中生翳膜

兎糞(二兩如乾色者佳) 蟬退

木通 白蒺藜(各一兩) 甘草(一兩)

右四味為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十丸食後白湯送下日進三服或用菉豆湯服亦可頻頻服之以翳退盡為度此方經驗極効

兎糞檳榔方

向東西地方上一去不許回顧尋取兎糞拾肆粒檳榔用雌雄同磨取不落地井花水調服甚効

咽喉

咽者胃之系主內而不出所以司飲食也喉者肺之系主出而不內所以司呼吸也人之咽喉乃緊要樞籥門戶也經曰一陰一陽結謂之喉痹一陰者手少陰君火心主之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也二脈並絡於喉痘瘡之毒乃君相二火主之其火上熏咽喉最[illegible]故發熱[illegible]之初必問其咽喉痛與不痛先與發散解毒之令毒得出不留連於咽喉間也若不知此或以解利於先則咽喉腫塞飲食不入呼吸不能死在旦夕矣如痘出太甚審察咽喉若內無痘又不痛者此毒已盡出不須慮之如內多痘又加痛者必防收靨之時變水吐食失聲之變如痛益甚喉中氣響汩汩如木聲者死

初覺發熱煩躁咽痛者宜升麻湯(初熱)活人如聖餅子消毒散(出大全) 咽痛發熱者涼膈散赤飲冷者胃經實熱也射干鼠粘子湯主之

既出而咽喉疼者乃心胃有熱上攻如咽乾澀而疼兼口舌生瘡渴而咽喉痛者甘桔湯或用鼠粘子湯(出[illegible]) 水漿不入者紫雪(大全) 鼓如抱龍丸[illegible]皆可用盡以咽喉口舌生瘡不能吮乳

若如聖餅子主之已上劑須能食臟腑實方可用如
上焦鬱熱却小便清大便溏薄飲食不進者當以消
上溫下藥調之如甘桔湯加參朮陳皮訶子之類更
驗手足如不熱者白朮散調之
痘後咽痛治法先痘後……係風熱咳嗽咽膈不利
者陳氏用桔梗甘草防風湯玄參升麻湯亦得　身
壯熱口舌生瘡咽喉腫痛大便堅實者射干鼠粘子
湯　膿後壯熱咽痛瘡痕色紅手微熱者餘毒未解
也柴胡麥門冬散主之餘毒　手指似熱而冷者脾氣
虛也錢氏異功散主之

二十三

痘瘡咽喉　八　初卅八

裏訣云喉者氣之出入之戶也熱毒之氣至此亦然
極拂故痘瘡喉病獨多而且慘烈或痛或燥或破或
咽食或嗆食或流涎變證多端固難定治俱以退火
為急用甘桔湯合解毒湯……加麥門冬薄荷調
如後兒茶為極細末煉蜜丸如大豆大時時噙化噤
喉垂下或腫大以玉鑰匙點之發喉六日以前宜急
治之喉痛喉燥喉啞不能飲食者亦玉鑰匙吹之
如喉痛作渴上……足俱冷瘡不起發者
乃……虛熱也不可專用清涼之劑宜以地黃丸料
……飲兼用八物湯補之

活人如聖餅子　治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛
經此一方即是隨經
牛蒡子炒　甘草各一兩　麥門冬去心
桔梗一兩
右為末加竹葉同煎細細服之海藏云減門冬竹葉甘桔鼠粘子湯治咽喉不利
小兒痘出欲透皮膚身熱咽喉不利甘草桔梗升麻
湯
甘草半兩　桔梗一兩　升麻半兩
右剉細每服一大錢水煎服

二十三

甘露飲子　治心熱咽喉痛口舌生瘡并瘡疹已發
未發並可服之治熱上攻牙根腫痛動搖
生地黃　熟地黃　天門冬去心
麥門冬去心　枇杷葉去毛　枳殼炒
黃芩去心　石斛去苗　甘草炙
山茵蔯
右各等分為細末每服二錢水一盞煎食後溫服
牙齒腫痛則含嗽并服……
地黃丸　治小兒瘡疹口瘡咽喉腫痛牙疳臭爛
天門冬　麥門冬　玄參各三兩

甘草　薄荷葉各一
右為細末生熟地黃汁和丸櫻桃大每服一丸
滾水化服
甘桔防風湯　痘疹後餘毒咽喉痛
桔梗　甘草　防風各等分
右剉散每服三錢水一盞煎至六分空肚溫服忌
辛辣熱物
玄參升麻湯　治痘疹後餘毒咽喉腫痛
升麻　玄參　甘草各半
右剉散水一盞煎六分去渣溫服斑疹出者去滓服

加味鼠粘子湯　治痘疹後癰疽瘡毒
鼠粘子二錢　升麻　甘草
射干各五分
右剉散水一盞煎六分空肚服忌魚腥發熱
玉鑰匙　點纏喉風或痘下久喉舌強硬等證
硼砂一錢　朴硝五分　殭蠶一條
片腦半分
右為極細末咽喉腫痛每用少許以竹管吹之
加減射干鼠粘湯　治痘瘡熱毒上衝咽喉腫痛
射干　山豆根　白殭蠶各一分

鼠粘子　紫草茸　紫菀各二分
桔梗　石膏　訶子
木通各一　升麻　蟬蛻各八分
甘草五分
右剉為粗散每服四五錢水煎食遠服
甘桔解毒湯　治痘咽喉痛首尾皆可用
山豆根　麥門冬各　牛蒡子炒
玄參　桔梗各七分　甘草二分
防風五分　綠豆四十九粒
右水煎服

三黃熟艾湯　痘後咽塞喉痺
黃連　黃芩　黃蘗
艾葉

痘疹發熱先腰痛者最忌經曰腰者腎之府也又曰太陽所至爲腰痛盖足太陽膀胱經爲十二經之首貫脉夾脊入循膂絡腎瘡疹之毒起於右腎之下循足太陽膀胱散於諸經乃邪由裏傳表也如初發熱其腰即痛此邪由膀胱道入於腎故關節不利而腰痛亟解毒以瀉少陰少邪發表以通太陽之經使邪氣不得以深入雖偶有之亦可無虞治若少緩則太陽之邪由表以傳於陽少陰之邪由裏以傳於陰表裏受病陰陽俱傷榮衞之脉不行臟腑之氣皆絕或爲黑陷或爲癢塌終莫能救矣

凡發熱便腰痛者先服人參敗毒散初熱次服五苓散加獨活細辛主之

發痘而見腰痛證者皆因腎經虚怯相火內爍真陰不能勝邪故腰作痛也急服地黃丸以防變黑歸腎乃克有濟大抵此證因禀賦腎家精氣不足故目睛多白俗謂之折腰痘是也若平素面白眼白睛多行遲語遲者出痘必歸腎經預爲調補腎氣庶免此患　一小兒十三歲眼睛多白或時面赤常患頭痛其脉洪數先君謂禀腎氣虚用地黃丸料煎服而愈後十五歲出痘先君云須多服前藥仍用地黃丸益氣湯更加倍愈乃以地黃丸大劑煎與恣飲又用大劑八珍湯痘漸出如式恪服前藥至痘成三漿計十七斤餘而痊先君每見嬰兒白睛多面色白或色赤令其預補脾腎以防出痘但信者少耳　一小兒出痘腰痛足熱發渴此禀腎虚火動也先君用大劑加減八味丸料煎與恣飲諸證漸退佐以大劑八珍加紫草糯米數劑膿漸灌仍用前藥而結痂用八珍湯而愈　一小兒出痘將愈因傷食泄瀉作渴腰痛此脾腎虚弱也先君用加減八味丸料及五味異功散

渴瀉頓止又與六味丸料及八珍湯而愈　一小兒面色常白目睛多白時常腰痛兩足時熱冬不衣綿年九歲先君謂禀腎虚令每日服地黃丸至十歲出痘腰痛發渴面赤飲冷用地黃丸每劑加肉桂半錢煎與恣飲數劑之後熱渴頓止腰痛頓愈却去肉桂仍與服之至五十餘日而靨

加味地黃丸

熟地黃（[illegible]）　山茱萸肉

乾山藥　五味子（炒各四兩）　澤瀉

白茯苓　牡丹皮　鹿茸（炙各三兩）

肉桂(厚者去皮取肉一兩 發熱者以此加之引虛火歸腎也而熱自止也)
右各另爲末入地黄和勻量入米糊丸服煎服與
奶

羌活當歸湯　治腰背痛初發熱時便宜服之
羌活　當歸　獨活
防風　川芎　黄蘗各一錢
柴胡一錢五分　桂枝柒分　桃仁一
紅花各五分
酒水各半煎服　〔又方治腰痛有若不寐卧已〕

如神湯　治腰痛
當歸　桂皮　玄胡索
一各等分爲末酒下二三錢

腹痛

鑑 腹痛多是積聚當論證消息　國 內經腹痛皆
屬於寒惟有一條發熱痧疹腹痛皆屬熱也訣云
發熱肚中痛痧疹內攻終多傷不透發必更防痢
是以或有兼食積者　痧痘疹腹痛者由毒鬱於三
陰屬以上屬太陰當臍屬少陰小腹屬厥陰須分別
之又服者毒氣內攻腸胃也治法但當升發解利痘毒
兼分利小便使毒氣上下分消則痛與脹自止故曰
痛隨利減服以利消俗醫以厚朴行滯氣而不知升
發解利非其治矣亦有乳食停滯不消化而腹脹者
當以升發解利藥中加消食之劑所傷之物當審其
寒熱又有數日大便者大便行而痛脹自止亦未可
驟用硝黄也

定痛散　傷寒肚痛及冷氣痛
神麯　香附各一錢　山査一錢
良薑　當歸　甘草各伍
右用薑三片棗一枚水煎服　手足逆冷加大附
子貳分

桂枝芍藥湯　治腹痛
桂枝　炙甘草各一　白芍藥(酒炒)

生薑三片棗一枚水煎服
黄連湯　治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升降
陰陽
黄連　炙甘草　乾薑
桂枝各二　半夏　人參各一分
棗二枚水煎服
一味異功散　治小兒諸般釣證角弓反張胸膈
凸以透明沒藥為末薑湯調下
總定論云病有似是而非若同而異者蓋肢體厥冷
而腹痛者此是陰氣在裏也若不審諦必作極冷治之

仍與熱藥為害愈深未冷極者不問有無寒熱皆冷
腹痛必大便自利蹊臥惡寒今身熱肢冷腹痛大便
不通乃熱毒在裏熱甚則發厥仲景所謂熱深厥亦
深也伏熱深而瘡疹不出者宜以蟬蛻末水煎服之
已出者亦可服毒氣得泄則四肢溫暖腹痛自止矣
前人論腹痛有虛實腸鳴自利而腹痛者為虛痛是
冷也腹滿而不大便者為實痛是熱也今腹中痛而
不大便又身熱耳尖冷脚冷為瘡疹證明矣又有瘡
疹始發腹中有宿塊而痛者醫不能辨認作食積下
之多矣横突丶疏前證瘡未出而發熱煩躁或作渴

飲冷大便堅實此熱毒鬱滯也用疏利之藥
發熱腹中便痛者此毒氣內攻也急宜發表疏裏桂
枝大黄湯主之亦有外邪與毒相併致未盡出而腹
疼脹滿者宜參蘇飲去參苓加硇砂陳皮溫而出之
若原無腹痛發熱二三日後大便不通而痛者此燥
屎與毒相併而痛也三黄丸熱七物升麻丸仿熱宜
風熱痞發擇而用之有譫妄狂亂者三乙承氣湯主
之瘀秘原無腹痛或因飲冷水而痛者此冷痛也理
中湯此劑加桂心或因多食而痛者此食積痛也微
則木香大安丸傷食甚則備急丸傷食丁香脾積丸
傷食原物湯下　原無腹痛自利後痛者此虛痛也

黄者建中湯加木香青皮　發熱門利又腹痛者此
亦毒也黄芩湯引丸加木香青皮或化毒湯主之如
瘡乍出乍隱此伏也七物升麻丸發出盡者再以紫
草飲出不大發之瘡不出者勿治　張瘡未出有先
作腹疼或腹中有塊者乃腹中氣出也不可投疏利
之藥以戕賊胃氣但與和平勾氣藥發散藥如升麻
湯參蘇飲之類
蟬蛻一物湯
用蟬蛻貳拾壹箇洗去泥為末水一盞慢火煎至

半盞去滓量兒大小溫服之如覺痘疹已出便依
前服三五次不是痘疹亦無害小兒痘疹欲發出
加甘草壹錢伍分煎一盞旋旋與服累効小兒伏
隔潰積熱者蟬蛻味鹹寒可以制況有驚感風作
熱各於表者蟬蛻亦治風毒充於皮膚瘙痒不止
驚搐夜啼癲疾寒熱驚癇皆宜服之

桂枝大黃湯

桂枝 白芍藥各二錢半 甘草伍分
大黃壹錢

右剉碎加生薑一片水一盞半煎至一盞去査溫
服食前

桂枝芍藥湯

桂枝 白芍藥 防風
黃芪炙 甘草各等分

右剉細加棗子一枚水一盞煎七分去査溫服

黃芪建中湯

黃芪 人參 桂枝
白芍藥 甘草各等分

右剉細加生薑三片棗一枚水一盞煎五分去査
溫服

化毒湯

肉桂伍分 白芍藥 甘草各一錢
青皮 木香 枳殼各七分
山查肉 連翹各伍分

右剉細水一盞煎七分去査溫服不拘時

〇一女傷寒但腹痛甚日夜啼哭手足厥冷漸至危
殆此時天時痘疹疫痘初出者痘疹遂取生豬血急用
腦麝和灌一服得睡須臾痘出而安若非此方則夭
橫矣

痘瘡已出而腹痛亦有邪毒在裏未曾出透亦宜桂枝
大黃湯 起發不透腹痛者隱伏也亦宜三乙承氣
湯便秘 及宣風散熱毒發 〇痘瘡已出而不熱躁不飲
冷大便不實此元氣虛弱也用白朮散之類補之
〇出不快而腹痛者活血散即一味白芍藥出不快以蜜湯調
下 若痘氣瀰漫陽毒入胃便血日夜無度腹痛啼
哭者牛黃散主之 又有一等將成內潰之證而發
痛者當預防之七日前內潰蓋因風寒所中於裡閉
塞陰陽二分壅塞不通其毒內攻臟腑之間毒火炮
燎以致咽喉潰而成膿口舌皆白是其驗也此證極
為要緊凡痘瘡者如痘毒未出之時或有風寒頭痛氣急

然後身必戰動腹肚疼痛是欲成膿血也宜以和
解湯升麻湯初熱逐散寒邪開泄腠理縱毒而出庶
無此證若證已成而治之亦無及矣
牛黃散　治痘疹陽毒入胃便血日夜無度腹痛啼
哭
牛黃一分　鬱金一兩
右為細末每服半錢以漿水半盞煎至三分和滓
溫服量兒大小以此增減日二服
和解湯　三日前後用
升麻　芍藥　葛根

人參　川芎　甘草
防風　羌活各四兩
右用水一鍾半生薑三片煎至五分溫服
[illegible]店子出痘瘡腹痛
丁香二十枚　官桂　芍藥各一
白朮　當歸各五分
右作一貼服
幼身不甚熱或時發寒或嘔吐六脈虛細四肢逆冷
而腹痛者陳氏木香散主之　腹痛面青而手
足冷者脾胃虛寒宜與益黃理中輩主之　理中

湯加白芍藥佳
右三條以溫藥治寒痛例 口渴飲湯手足並冷者
宜之
劉寄治痘始出腹痛或身痛陳氏異功散者解表涼藥加
芍藥甘草漸安
按涼表涼藥即升麻湯連翹升麻湯雙解散之類
加者倍而用之也
右一條以涼藥治熱痛例作渴飲冷手足並熱者
宜之

如痘已出至收靨時原無腹痛忽然作痛此必有飲
食也不思當問曾因飲冷水者五苓散主之或用黃
連理中湯加白朮乾薑人參曾傷食者問傷何食予
香脾積丸主之用原物湯送下　張傷食腹痛不可
用巴豆大黃之只宜平胃助氣之劑如平胃散小異
功散橘皮湯皆可　錢吳傷將食夜酸大便氣臭乳
食停滯也用保和丸消之　傷食
若痘後傷食食蒸發熱而嘔吐腹痛者治於見前
條　靨後熱多大便難聚腹痛者宜血也宜
黃湯主之
血發熱時心腹絞痛煩悶叫呼或昏悶伏膿滿成痛

瘡促者此毒惡之氣攻刺腸胃爛壞臟腑必不可治

腹脹

凡痘子病中常宜節飲食禁戒無犯否則腹脹滿須審其傷食否及大小便何如如曾傷食微滿者木香大安丸脹滿腹痛者丁香脾積丸俱傷食小便不通者肝丸黑附大便不通者宣風散方見後下之此上諸證皆實脹者也故宜利之若自利腹脹乃虛脹也陳氏木香散方見前主之

腹脹分虛實寒熱　錢氏云身熱煩躁腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐者當利小便不瘥者宣風散下之此實熱治例也　陳氏十一味木香散治痘瘡腹脹泄瀉此虛寒治例也　薛氏撮要云腹脹瀉渴脾胃虛寒也用大異功散出不快　參耆內托散即十補散出不快治之若前證而兼氣促體倦乃脾氣虛也用白朮散發渴加木香煎送四神丸泄瀉　如腹脹作喘大便利小便秘手足並冷乃脾氣虛也先用前藥次用木香散喘　次用小異功散吐瀉　一二劑自愈此平補例也

痘初熱時腹脹痛者由毒氣與外邪相搏欲出而不得出也用參蘇飲加縮砂陳皮方參苓服之本方見發熱宜此

身熱脈數大便秘而腹脹此熱毒壅遏也當微下之或痘半未出而喘息腹脹其人大便不通煩躁作

渴譫語大便者當急下之俱用紫草承氣湯[illegible]

此 丹溪用桔梗枳殼湯二陳加枳殼湯 若吐瀉[illegible]
自利四肢厥冷腹脹發喘者裏氣虛也萬氏附理中湯
急救之

紫草承氣湯

厚朴二兩　大黃四兩　枳實一兩
紫草一兩

右為麤末每服五錢水半盞煎一二三分溫服以利
為度如未利加芒硝壹字

桔梗枳殼湯 [illegible]　三十八

枳殼　桔梗各二　甘草各分

右剉每服三錢薑一片水煎服

二陳加枳殼湯

枳殼　半夏　茯苓
甘草　陳皮各等

右剉每用三錢薑一片水煎服

若痘既出而腹脹者[illegible]一則陰陽不和或因作
渴煩渴飲冷過多或誤投涼劑熱為冷所激欲出不
能毒不能發越故令腹脹其人必不能食二便利膈
中虛寒甚者氣喘發厥瘡白無血色者多致不救急

當以溫中藥疏逐冷氣不可久用宣瀉之藥以重其
困如小異功散 吐瀉 木香散 [illegible] 俱可用王中陽云
木香散性溫平能和表裏治腹脹瀉渴有如神之效
一則毒氣陷伏入裏必有他證相雜或煩躁大渴或
大小便秘或啼哭不止但用溫平解毒快氣之劑如
人參[illegible]瀉血散[illegible]之類　又有小便赤澀而
心腹脹滿別無他證者此伏熱在胃則中有所隔上
焦心氣不降故小便澀少而赤下焦陰氣不升故腹
中脹滿董氏用四聖散[illegible]以發出其毒則胃熱自
散矣　若出太密而色黃大便黑煩躁喘渴腹脹者
[illegible]　三十九
此有痰血在裏也治法見渴條若出太盛至當結靨
其痂而不結能食而喘腹脹譫語不大便者及靨
後腹脹喘渴大便利小便澀者治法俱見喘條
痘瘡起發而腹脹者[illegible]一證同前陰陽不和者痘瘡正
發熱毒方盛必作渴宜以葛根解毒湯人參麥門
冬散人參白朮散[illegible]之類與之不知此理或飲冷
過多或誤投涼劑熱為冷所激欲出而不能冷熱相
搏毒不發起故令腹脹且傷於冷者急當以溫中藥
疏逐冷氣冷氣散則腹脹自消益黃散 [illegible] 去甘草加
當歸厚朴甚者氣喘發厥瘡白而無血色多致不救

陳氏木香散細刊聖方也昧者反用峻下之藥致令
重困而死其毒氣陷伏入裏者但用溫平解毒快氣
之劑紫草飲子主之 起發 若腹脹而目閉口中如爛
肉臭者其證為大惡
一兒痘後瀉肚急小便少發熱
芍藥 白朮 陳皮各四分
川芎 乾葛各三分 甘草炙一分半
木通二分
右用水煎服
一子五歲痘後肚急

白朮一錢 陳皮 木通各五分
犀角 川芎 白芷各三分
甘草炙三分
右水煎服
加味透肌散
人參 黃耆 白朮
芍藥 川芎 甘草
茯苓 木通 陳皮
糯米 厚朴 大腹皮
等分為麤散量兒煎服

紫草厚朴湯 治痘瘡煩悶瘀滿或喘急或結聚不
散
紫草茸一錢二分 枳實 黃芩
黃連 厚朴各一錢一分 露蜂房
白茯苓 山豆根 麥門冬
桃仁 石膏 旋覆花各三分
蟬蛻 升麻各四分 白朮五分
右剉散每服四五錢水煎食遠溫服
紫草枳實湯 治痘瘡腹脹或熱毒或因傷冷所致
紫草茸 鼠粘子各一錢二分 厚朴

苦參各一錢一分 白芍藥 貝母
枳實 訶子 肉豆蔻各一錢
蟬蛻 桔梗 白朮各錢
升麻七分 甘草六分
右剉散每服四五錢水煎食遠服
厚朴木香散 [illegible]
木通芍藥湯 治痘瘡作瀉腹脹小便不利
木通 芍藥 白朮各五分
川芎 陳皮 乾葛各三分
甘草一分

右水煎服

薑附湯　治痘疹半出而半不出或出盛時却下利支厥嘔逆腹脹吃噫須急與理中丸四逆薑附湯之類不須疑也試之驗也大便自利腹脹者是熱毒被冷所搐不能出冷甚則爲下利其毒小得出則爲腹脹當此以理中丸四逆薑附湯等服之裏復温則利止熱毒得復出則腹脹自消痘疹亦自出矣又有痘疹半出半未出或出盛時却大便不通小便赤澀喘急腹脹而唇齒乾口燥渴者多譫語者當急下之此證是毒氣壅滯欲出而出不辨若腹脹下之陰陽散榮衛伸則裏氣消外瘡出令濕合下皆得其宜不可不述之若下臟虛而腹脹者又非此證宜服甘金散乳香豬血膏理中丸薑附湯

痛癢

諸痛爲實諸癢爲虛實謂之實者邪氣實也謂之虛者正氣虛也又痘疹爲火火成則痛火微則癢故常作痛者此邪氣之實也蓋痘瘡之毒發於皮膚肌肉之間氣以束之血以潤之醞釀其毒以抵於化正氣周旋而不舍毒氣變化而未成熟而作痛此其常也毒化膿成其痛自止若肉如刀割膚如錐刺一向痛而不止大叫多哭此則皮傷肉敗不勝其毒又痛之變也常作癢者此正氣之虛也經曰胃者水穀之海六腑之大原也五味入口藏於胃以養五臟胃氣既虛則水穀不化津液內竭不能輸精於皮毛氣失其衛血失其榮不能驅逐毒氣以至於收使毒氣浮沉隱伏聚散倏忽灼於皮毛所以癢也此其爲虛補其氣血和中托裏其癢自止若一向癢甚其一時爬抓破壞皮膚肉損者此毒氣內陷正氣何衰不能運而告變矣如先痛後癢者此常候也蓋先則毒未解化其火正盛實留作痛歇後膿成則解火氣漸緩宜爾

痛

活人書治痘瘡痛用溫鬱丸水化下　海藏治瘡出煩痛用五物木香散　脾下若身後痛屬膀胱經也用羌活荊芥甘草湯手前痛屬肺金也用升麻葛根紫草湯身側痛屬膽經也用柴胡山梔連翹防風湯即此四味等分四肢痛屬脾胃也用防風芍藥甘草湯即此三味等分以急止之蓋恐叫號傷氣忍痛傷血而變證也若熱毒盛者用涼血解毒散大法或仙方活命飲餘病後毒食雞魚葷物酒物者用米塤清胃散生犀汁若發熱飲冷大便調和用四物連翹牡丹皮若發熱飲冷大便秘結脾胃實熱也用清涼飲發熱若發熱作渴飲湯者脾胃虛熱也用七味白木散渴大凡瘡切不可食毒物恐作痛致傷元氣輕者反重重者難治大人亦然

痘發也

瘡痛起發痛者有二一則毒邪欲出須血隨之肌肉潮急而痛九味順氣散起發合活血散灌漿不主之一則皮膚厚肉理密為外寒相搏而痛桂枝葛根湯主之研散

五物木香散　治痘出煩痛

青木香二兩　丁香　零陵香　麝香一分　白礬一兩

每服四錢水一小盞半煎服之熱盛者加犀角汁兩加側柏以升麻代之輕者　服大効

又方以羌活和豬脂塗瘡上令動痂落無瘢仍用黃土抹之凡貼瘡小便澁有血者中焦熱甚其瘡不出膿者死不治

青黛散　治痘未及灌漿身熱心煩躁睡臥不安並宜服之

真青黛如棗核大水調服之即安

翻瘡將結靨乾硬而痛宜塗酥潤之靨可揭去則去之如無酥用豬脂煎汁代之此痛非服藥可絕也

身痛

經云諸寒爲痛又云痛則爲實内快外痛爲外實内虛外快内痛爲内實外虛今痘瘡身痛者是皮膚肉胔瘡或爲外寒相搏或熱毒内作或血虛不能榮宜審而治之　陳淵翁云凡痘瘡身痛不爲外寒所折則肉勝瘡宜分而治之若紅點方見爲寒所折而内體有熱宜木香參蘇飲輕者消毒飲或葛根升麻加芍藥湯内熱盛者宜活血　合匀氣散　外寒搏者必兼有表證如和解湯攻毒散去柴胡前胡用若兼發熱頭痛惡寒咳嗽者參蘇飲主之

四六

痘内作血瘀而痛者先用活命飲痘瘡　次用消毒散苦湯法痘大　血虛而瘀因作痛者四物湯之類痘身如黯色黑者毒氣壅滯而血凝也乃是危證若二便秘結喘急煩躁用梔子仁湯或豬尾膏血調片腦治之自利不食者不治

消毒飲

牛蒡子三兩炒　荊芥一兩　甘草半兩生用

防風半兩去蘆

右細切作一服水煎加生犀角尤妙

葛根升麻加芍藥湯即升麻葛根湯加芍藥是也

活血散

匀氣散即清氣散加木香也

白朮　白茯苓　青皮

白芷　陳皮　烏藥

人參各伍錢　甘草炙　木香各壹分

右細切作一服水一盞煎七分服或細末沸湯調亦可

癢門

經云虛則癢實則痛此大槩言之痘瘡之癢其候有三有初出時便身癢爬搔不停者此邪氣欲出未得出故其火游移往來故癢也與傷寒太陽病身癢汗不出者同論可發之使其毒邪從腠理開通邪氣得出故痘出而癢去所謂火木則發之者是也有將收靨而發癢者其膿已成其瘡將回邪氣欲出而正氣復榮衛和暢故癢也與雜病將痊而癢者同論不須服藥但謹護之勿令爪搔以致破損潰爛誤矣欲癢者是也有起壯泡漿而癢者當血已衰水未成膿之時其毒未化渾身發癢爬搔不寧此惡候也與傷寒陽明經病皮中如蟲行者同論所謂虛風外搏邪氣內溢發而不止為泄風者是也此觀瘡之乾濕以風藥佐之必令癢去方為佳兆若癢甚不休瘡壞皮脫其毒復陷謂之癢塌必不能治矣大抵出形而皮肉紅豔起發而皮嫩多水者其後必多發癢塌也　凡痘子癢塌者須於形色上詳審如痘一向起發紅活光壯肥滿忽然發癢者此氣血內消也宜內服十全大補湯外用茵蔯熏法 起發 其破者以白龍散敷之如痘本乾又添瘡癢者火甚也如瘡原帶水皮肉嫩薄以瘡

不透溫熱也擺頭扭項手足動作昏悶者死證　初出以癢者可發之桂枝葛根湯 初熱 加制麻黃牛蒡子主之　如起發養漿而癢者通用十全大補湯加防風牛蒡子主之　如已發身癢者有二證一則血氣不足其瘡為虛十全大補湯主之一則不能食淡以致發癢蟬蛻散主之　如瘡破血而癢者宜養血潤燥以四物湯 大血 消風化毒湯奪命丹 起發 主之外用茵蔯熏法　如瘡濕而癢者宜養氣去濕以四君子湯 不能食 合消風化毒湯奪命丹主之外用茵蔯熏法　凡痘子已熟忽作瘡癢抓破者此脾胃虛弱不能榮養肌肉也內服四君子湯加黃耆官桂外以敗草散 百痘 主之如因自利脾胃虛致癢塌者陳氏木香散 泄利 異功散 不出 主之　如瘡將收而作癢誤化破損不肯乾靨者用白龍散貼傳　丹溪法於形色上分虛實實則脉有力氣壯虛則脉無力氣倦虛癢則以實表之劑加涼血藥實癢以大黃寒涼之藥少與之下其結糞　滄洲翁法主血氣不足用十補托裏散及木香散加丁香官桂胃主肌肉尤宜四君子湯加芎歸木香紫草煎服或患者不能忌口因食毒物而作癢者宜

物湯百花膏或四君子湯加解毒藥　陳氏法灰痂作癢抓破成瘡膿水淋漓者由血氣衰肌肉虛也宜用木香散溫加丁香肉桂及敗草散收斂切忌用牛蒡灰　聞人氏法痘有二證一則氣血不足其痘爲虛活血散決出不或四君子湯加黃耆枳殼主之忌中用十全大補湯參芪內托散一則不能食淡以致癢塌煩燥一物湯主之痛痘腹　魏氏法以保元湯倍加黃耆少加芍藥或芎首尾癢塌保元加牛蒡子白芍藥何首烏何首烏有紅白二種名爲雌雄必須兼而有効惡　王汝言云痘瘡虛怯淡白色癢塌此屬虛寒宜用陳氏

幼科　五十

法若發熱壯盛痘瘡紅紫色燥癢此屬熱毒宜用涼血解毒之劑　薛氏云前證皆因氣血虛弱所致宜爲調護使氣血和平庶無此患又必察其外證色白者用四君之類色赤者用四物之類　袁氏云癢者半漿而作癢者可以癢甚者皆用參芪芍藥升麻子之屬不可投次癢之藥若未出皮膚作癢者不治空殼遍身作癢者不治

參耆內托散　治痘瘡發癢不潰倒靨

人參　黃耆炒　當歸

川芎　厚朴薑製　防風各伍分

桔梗　官桂各二分

木通　紫草伍分

右入糯米一撮水煎熱服之　寒戰咬牙飲水瀉渴亦宜服

紫草木香散　治痘瘡裏虛痒塌黑陷發熱

紫草　茯苓　甘草

白朮　木香　人參各等分

糯米

右每服三錢水煎

消風化毒湯　治痘瘡癢者

幼科　五十一

防風　黃耆　白芍藥

荊芥穗　桂枝　牛蒡子

升麻各等分　甘草減半

右剉碎加薄荷葉七片水一盞煎七分去查溫服無時

又方　治痘瘡癢塌不搔

白朮一錢　黃耆蜜炙　當歸

陳皮各伍分　甘草炙些

水煎溫服

一治一子七歲痘將出未出之際腹泄數行其瘡

黑不發根窠三日後痒塌抓卽黑色口渴…
水疥狀不紅潤不起發食少脉浮數有力按之虛…
用參耆歸术陳皮肉豆蔻爲君炙甘草訶子桂爲佐
使水煎熟好酒些少咽下痒立止食立進根窠紅潤
而起發一二服全愈

蟬花散　治痘疹不拘前後始終遍身作痒抓破皆
治之

蟬退去翅足洗去泥土各一兩　地骨皮炒黑各一兩

共爲末每服一茶匙水酒送下一二服神効

二物湯（痒塌）

蟬蛻洗淨二十一枚　甘草炙一兩

右爲末水煎時時服之

金脾散　痘至八九日期條然身中臭痒此痘證之
最急者以此治之

炒术	芍藥	生地黃
甘草	升麻	荊芥
防風	陳皮	大腹皮
殭蠶	蟬蛻	

水煎服

渾湯

人參	黃耆	芍藥
生地黃	防風	甘草

水煎服

天元二仙丹

渾天湯　人參兒灸　黃耆

生附子一兩各

四味另研細方和合一處白蜜調勻量兒大小加
減十歲以上一錢十五歲以上二錢服後隨以振
元湯連進痒遂止矣

七星散（治痒）

黃耆　芍藥各二錢　人參

桂心各一錢　黑魚一個

右前四味共研爲末留黑魚肚內升麻酒煮熟與
痘痒者連藥食之凡上焦痒吃頭中焦痒吃身下
焦痒吃尾亦驗方也

白龍散

用乾黃牛糞在風露中多久者火煆成灰取中心
白者爲末薄絹囊貯於痒上撲之

浴法

經驗良方卷上　蘇梗中　升麻上

荆芥穗中　防風中

水煎十數沸候温拭嚥

發甚欲瘥者以鳥羽輕拂之以細茶當歸黄耆玄參
痘瘡煩燥之或以鐵器燒紅留礶中於室中熏之
又若有用淡蜜水調滑石末以雞羽刷瘡上
發瘡癢難任搔之成瘡或膿或血出者敗草散治之
切不可用牛糞灰貼則臭穢難瘳多矣

小兒痘瘡癢難任恨搔爬瘡及痂欲落不落用上
好白蜜一味塗於瘡上其痂易落可無瘢痕
退痂痘瘡落後痘痕不黑變成瘢癬其癢難任用陳
牛脂賜油傅神妙

又方用羊髓骨髓塗瘡功

論曰凡痘子膿成漿熟或癢誤犯破者只復灌爛
不能成痂者膿漿未成之時不可犯破半漿必然癢
塌而死　袁敢問有爬破囊房膿血淋漓而死者有
爬破囊房乾枯脱皮而死者其故何與曰木枯則自
折土燥則自裂痘之囊房空虛則痒癢自作欲其不
搔爬也難矣但爬破於不關緊之處猶可以全活若
險難氣窩命之要害也於兹爬爛死在旦夕彼爬破
而出血淋漓似乎氣血交發未宜死也而有死者
豈痘之不分美惡乎要知魚得水而肥鳥得林而棲
痘囊既破膿血淋漓既竭則元氣耗絶矣元氣既竭
鳥得不至死耶評云膿血流來症可生只因漿破走
黄金任教爐火工夫到療了黄金惱殺人喻言似是
謝坤實説女媧煉五色石以補天皮膚可藥紙以封
之斯言謬矣

治痘瘡抓破出血黑陷丹歌曰絲瓜聯蒂與囊皮孔
東烏金統用之慢火置於新瓦炙燒時存性効真奇
痘經抓破惡臭攻須識王真一笑翁荊芥防風煎湯
並搗羅調服建奇功　按古方有用敗草散抹者有
用蕎麥粉抹者有用蛤粉摻者有用文蛤末摻者總
不如黑虎丹之妙也

陷伏倒靨

伏者毒畜於裏而不出也陷者毒出而復陷入也此皆惡候伏惟一證陷有數種伏候於見形之時其人壯熱不少減煩渴悶躁此有伏毒未得盡出也陷則見形之後其血漸乾而變黑者謂之黑陷漿水未成破損瘙塌者謂之倒陷膿成復化為水不肯結痂者謂之倒靨亦陷類也其變黑色皆謂之黑陷凡痲疹黑色皆不治之以腎為水其黑色乃腎之真臟色見也粗工不知變黑歸腎之理妄謂腎不可實欲瀉腎而使之虛不知人之一身大言陰與陽小言心與腎即方家所謂真水真火也瘡疹之火發於中賴此一點真水以制其亢苟欲瀉之則火無所制本先撥矣豈治之要哉然謂歸腎者以腎主骨髓又主閉藏也蓋瘡疹穢毒由骨髓達於筋肉皮毛之間乃自內而外其毒得洩今既陷伏則自外而復入於內藏於骨髓謂之歸腎也又初出形之時春氣發生之令也出形而黑是春行冬令又起發之時夏氣長養之令也起發而黑是夏行冬令又養漿之時秋氣成實之令也收靨乾而黑是秋行冬令矣故皆謂之逆結痂之時冬氣閉藏之令也此腎之正候若不著痂收靨而變黑此冬行春夏之令亦謂之逆惟知造化之理可以語歸腎之說其色黑者火化也觀物之乾者其色黑出於火者色亦黑豈可謂之水乎經曰火發而曛昧知此可以語黑陷矣

凡瘡伏而不出者雙解散主之 痲點色白或黑色其人必不能食乳大便自利或嘔或厥此胃虛弱而不能調榮衛故也宜用理中之劑令其胃煖榮衛復行則瘡自出矣宜理中湯 丁香煮散之類

凡倒陷者看其大勢何如大小便秘因順清涼飲熱合奪命丹主之 泄利氣弱者十全大補湯并合奪命丹主之 痘外用胡荽酒水楊湯

丹溪先生云痘瘡倒陷因真氣虛而毒氣不能盡出者用黃耆人參紫草酒製治之若將成就之際却淡色者屬血虛用當歸川芎之類或加紅花紫草屬熱毒者用升麻芩連桔梗翹之類甚者用犀角大解痘毒

閩福謂前證若熱毒方出忽被風寒閉塞肌竅血脉不行身體作痛或四肢微厥瘢點不長或變青紫黑色者此為倒靨若胃氣虛弱不能補接榮衛出而復沒者謂之陷伏宜用解毒之藥必致陷塌若

泄熱飲食手足並冷者乃脾胃虧損陽氣虛寒之證宜用辛熱之劑補之爲冷飲食手足並熱乃陽氣實熱之證宜用苦寒之劑寫之 外感風寒者溫散之毒入腹者分利之陽氣虛者溫補之外寒觸犯者熏解之 自昔謂白陷不可救蓋瘡色白者必變爲灰慘灰慘者必至於平伏倒塌故謂之白陷此固由氣虛所致然血不華色血亦不虛治法須兼氣血爲當血活氣行白可變而爲紅自不至於陷塌矣若單補氣則氣旺燥熱勢必陷伏故白陷抓破皮薄乾燥而起瘡者由先於補血致氣盛極而燥也愈用補氣之藥

速死之兆也故凡見痘色白者無分先後皆以補中益氣湯合四物湯治之內有熱者加解毒藥或利小便若待白陷已成而後治之難爲力矣 痘有紫黑陷灰白陷紫黑陷者乃血熱氣滯而氣亦不能以運行有餘之證也急治之循兮而活灰白之陷乃元氣衰敗故不能起發而血亦不得通貫不足之證也多難救治

如痘起發遲亦有不但色黑陷者以十全大補湯汗調無價散主之或以必痘湯見形 奪命丹見形 合面服之一

如但少者亦視其大便何如 大便秘宜利之三黃丸四順清涼飲俱發 泄利者宜補之輕則十全大補湯甚則陳氏木香散 外用敗草散 主之

順安化毒金散 痘瘡始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫煩亂者

鬱金一枚　甘草一分

水半碗煮乾去甘草切片焙乾爲細末入腦子半錢同研壹錢七用生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃差此是五死一生候也

四聖散　黑陷倒靨不起發不紅活小便不利

紫草　黃耆　甘草

木通

右水煎服 熱甚色紫倍加紫草黃連紅花大便秘加枳殼如常加糯米

參耆內托散見痘

無價散

用人貓豬犬糞臘月內燒爲灰末蜜水調服

南金散　治痘已出而復倒靨其他諸藥不效者

臙脂一尖

紫河車 蟾酥 冰片 白殭蠶 一

右爲末等分每服看人小大者一錢小者五分研芫荽汁和酒下米飲亦可 治此證多有用龍腦人牙者卒難措辦惟此無毒而效且速但紫草者其難得可於藥鋪內尋之

橄欖飲 治倒靨

橄欖從中截斷水服少許服之立效

白花蛇散 治痘疹黑陷倒靨

白花蛇連骨一兩火炙乾勿焦 丁香二錢半

共爲末每服五分或二三分熱酒送下如黑陷者移時轉紅甚效

羅淨方治塌陷痘歌曰烏蛇全蝎與殭蠶穿山甲與纏四樣淨該均壹兩紹着官桂倍加焉白酒煮濃隨意服兒多陷痘得迴全 愚每用此全活甚衆但殭蠶須要去絲滴水丸去石灰再曬乾烏蛇須用尾極好穿山甲先酒洗焙乾用

袁氏治倒靨 倒靨原爲痘後觸只因氣血兩相殘麥者歸地併蟬蛻連綿進服靨自還 又曰倒靨血不止名爲迴陽泉若把胸膈地十來丸不全速蛋暗脈血陽加壹錢燒之俱存性點上血收效

夫痘後倒靨人多妄用治法枉殺人男女若痘後痘痂厚疊不能脫起或半脫而半在或四圍脫而中不雖痛者準用後方

生蜜 蘇合油

二味調勻用銀簪敷於靨痂上處其痂即止而靨自速脫並無勞血餘肉之患如無蘇合油只以綠雞油代之甚妙

離水[illegible]者水火之位也心腎者
坎離之配耳故火[illegible]中之陰乃真水
也火[illegible]也而[illegible]陽乃真火也陰根於陽
陽根於陰乃爲其根所以能[illegible]而生萬物也孔子
贊易以坎爲血卦[illegible]離爲[illegible]
[illegible]可見以人身言之血陰也氣陽也心配離而生
[illegible]中有陰乃真陰也腎配坎而生氣陰中有陽乃
真[illegible]也故心[illegible]之血即腎中之真水也灌溉滋濡水
之德也腎中之氣即心中之真火也喣嘘鼓動火之

[illegible] 幼科[illegible] 六三

象也然水善而火惡老子曰上善若水下愚如火善
惡之分也況人之兩腎左爲水右爲火經曰七節之
旁中有小心小心者命門相火也以其爲君之相故
云小心行君之令故云命門也夫以一水立乎二火
之間其不勝也明矣[illegible]之於中[illegible]使火不赫曦水不
涸流者有神以[illegible]之也所謂神[illegible]何物也太虛之中
神之棲也然[illegible]不能立名有[illegible]勝[illegible]之變此其
常也故盛則[illegible]所不勝而乘所勝也命曰氣淫衰則
所勝妄行而所生受病所不勝薄之也命曰氣迫虐
疹之火起於命門之下二火相合所謂得助者強也

相火從[illegible]君火之勢[illegible]其[illegible]燎焫無所不至
可恃者心中之真水尚有以制之奈何陽道常饒陰
[illegible]之赫曦者其氣淫涸流者其氣迫其真水亦亡
[illegible]已矣經曰成敗倚伏生乎動動而不已則變作焉
[illegible]既亡津液[illegible]其[illegible]燥不能潤乎皮
毛孩乎腠理而腎中之血亦乾而黑矣是則變黑者
血也不亦[illegible]乾則[illegible]黑也[illegible]血本腎中之
[illegible]血乾則[illegible]亦[illegible]此腎虛之證豈有腎實爲邪
之理乎　邵子觀物篇曰東赤南白西黃北黑此正
色也驗之於[illegible]夜之時可見之矣由是推之嬰

[illegible] 幼科[illegible] 六三

兒始生而赤長稍變而白病則黃老死而黑物生地
下而赤稍長而白[illegible]落則黃稍槁而黑凡物皆有一
陽之氣以生此四色者乃一陽之氣色遞變者也夫
痘瘡由出現而起發而成漿成漿而結痂亦人
身中一陽之氣[illegible]行也其出現而赤起發稍變而
白成漿則黃[illegible]赤[illegible]遞變自然者乃證
之順[illegible]不可令以[illegible]不正之色也夫以變黑爲逆
者以四時言之春主生夏主長秋主收冬主藏此自
然之序遞相成功者也痘瘡之出猶春之生也起發
猶夏之長也成漿猶秋之收也結痂猶冬之藏也亦

自然之序苟由現而黑則是發行冬令矣起發而黑是顯行冬令矣或灌漿而黑也是秋行冬令矣不循天之次故謂之逆黑者腎之色也為起發封藏之令故以其色黑為歸腎也又肺主皮毛心主血脈脾主肌肉肝主筋腎主骨髓痘疹之毒由內而外為順內伏不出曰伏已出復入曰陷不能成漿謂之倒陷不能結痂謂之倒靨曰伏曰陷曰倒皆由外而內入於骨髓故曰歸腎為逆也　按錢仲陽為萬世幼醫之祖而獨以變黑歸腎為腎實之證其失不小夫痘之最為詳明後備引之蓋耳骫者腎之部也諸痘發

熱皆屬於火腎本屬水水不畏火故痘疹之初腎獨無證耳五藏之部之色之證見者皆為惡候故曰善則不可見惡則可見也倘若小兒腎水本虧則火毒愈熾水不足以制之而火反侮其所不勝及其既久火盛水熱於是腎之所部始病而惡證見焉錢氏以百祥丸下之者大有至理蓋大戟者瀉小腸之藥也心與小腸為表裏不直瀉其心而瀉其合使心火下降而腎水上升得陰陽交媾之道有起骨加肉之功然不救者尚十有九水火豈易抽添哉蓋非百祥丸則無治也毒氣去而真氣不絕者猶活潑人用百祥

能瀉膀胱之水令脾土復旺是不讀本草而且大失仲陽之旨也又導赤散亦仲陽所製亦瀉小腸但與百祥丸之功效有寬猛耳四聖散用木通亦妙也以木通為猛而易以其他淡滲之藥反瀉膀胱與腎者同不知而殺之矣萬氏以百祥丸下腎中毒氣是猶以為實而瀉其子也毫釐之差千里之謬不可以不辨

按痘黑陷分四證詳見起發證治陷伏條　薛云喜熱飲食手足並冷者乃脾胃虧損陽氣虛寒之證宜用辛熱之劑補之若喜冷飲食手足並熱乃陽氣實熱

之證宜用苦寒之劑瀉之外感風寒者溫散之毒入腹者分利之陽氣虛者溫補之外寒觸犯者薰解之陳宿州先生用十二味異功散以預保脾土於未敗之先實發前人之未發開萬世之聾聵也

治人牙散治痘瘡方出風寒外襲或變黑或青紫宜溫肌發散使熱氣復行而瘡自出用人齒脫落者不拘多少瓦罐固濟火煅出火毒研末出不快而黑陷者豬血調下一錢因服涼藥血澀倒陷者入麝香溫酒服之

初虞世名回生散用人牙灰入麝香少許每服半

錢氏者白芍藥煎湯調下　錢氏方中用溫酒調
下　雲岐方中用升麻紫草煎湯調下　海藏云
若平昔油膩腸垢者通膈丸下之朱砂為衣與宣
風散相表裏　一方用雞冠血調成膏好酒半盞
入乳半盞入葱白當歸煎湯送下　彭氏云只用
紫草湯自好治瘡最怕麝香與酒氣觸禁不可用
凡服牙齒不可過多每服止叁分多則陽氣盡
出於表恐瘡斑爛無血色陰氣內盛必變寒而瀉
泄急以四君子加芎歸服之
治痘瘡黑陷不能發者有驗用穿山甲一味燒
存性為細末入麝香當門子少許一歲伍分三歲
壹錢溫酒調下一服取效雖半身黑陷欲絕者亦
能蘇醒再發紅色但有目閉無魂者不復生矣
麻黃[illegible]麻黃剪去根節伍錢用蜜壹匙同炒良
久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一不
用查病瘡疱倒靨黑者乘熱盡服之避風候其瘡
復出　法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者
難服以此藥入表也世傳此法累用有效
凡痘子黑陷古方用穿山甲者取其穿腸透膜
而善走也用人牙者取牙齒乃骨之餘腎主骨可
以人牙出之[illegible]
施治則可若小中用之何濟於事哉有用此人屎者
蓋屎大解痘毒乃時疫所發故宜用之若加入
發表和中解毒湯內尤良
右方皆通表發肌之藥首一證感風寒肌竅閉塞
血凝不行而黑陷者宜之
活人瘡黑倒靨豬尾湯無比散龍腦膏子無不驗[illegible]
[illegible]若用草藥[illegible]之[illegible]勝[illegible]不得已而後用之可也
豬尾膏治瘡倒靨用小豬尾尖刺血兩點入生腦子
少許同研新汲水調下食後立效
龍腦膏子治時[illegible]痘瘡及出瘡子未透心煩狂躁
氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不
治則毒入臟必死用生龍腦壹錢研細滴豬心血
和丸如豆子大每服一丸心煩狂躁者用紫草湯
化下若瘡子陷伏者用溫酒化下少時心神便定
得睡瘡疹發透依常將息取安[illegible]
不得已也
無比散治斑瘡倒靨黑陷[illegible]　歌曰人牙豬貓犬
臘辰燒每服五錢蜜水調還甚倒靨并黑陷真可
黃金也合消[illegible]

和入中黃臘月…者…過風處以火煆成炭水調
下叁伍錢陷者自出丹溪云子和黑陷甚者用燒
人屎即此方也
治疹痘不透或乾黑危困用山查肉一味爲末每服
貳錢紫草酒送下量兒大小加減徐徐進三四服
即紅活
劉守真涼膈散治小兒斑疹…時亦妙然止能治
大便結硬小便赤澀爲當若大便小便已通不宜用
此惟以易老去大黃消者最爲穩當
錢氏凡瘡疹逆者猶可治四五日黑者黑陷何如十難救

痘疹　幼科　六十六

一其候或寒戰咬牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下
之復惡寒不已身冷出汗耳尻反熱者死何以然腎
氣大旺脾虛不能治救也下後身熱氣溫欲飲水者
可治以脾氣生勝腎寒去而溫熱也治之宜解毒不
可妄下妄下則內虛多歸於腎若能食而痂頭焦起
或未焦而喘實者可下之宜四順飲療未陷而耳尻
反熱者爲逆用百祥丸牛李膏各三服不愈者死
百祥丸一名南陽丸　治瘡疹黑陷寒戰咬牙或齒
一身黃紫腫
紅牙大戟不以多少陰乾漿水煮軟去骨日中晒乾復納汁煮汁盡焙乾爲末

右水丸如黍米大每服一二十丸研芝麻湯下吐
利同無時此方治戛齒其妙
牛李膏
用牛李子不以多少取汁石器內熬成膏牛李子
生野道邊至秋結實黑子成穗如無生者以乾者
爲末水熬代用每服皂子大煎杏膠湯化下此藥
須於九月中收之
錢氏宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留
抱龍丸三服李以藥下之其疹稠密錢氏見大驚
曰若非轉下則爲逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡

痘疹　幼科　六十七

瘡始出未有他證不可下也但當用平和藥頻與乳
食不受風冷可也瘡痂若起能食者大黃丸瀉一二
行即止今先下之瘡疹未能出盡而稠密其則難治
此誤也縱得安其病有三一者疥二者癰三者目赤
李氏不能治經三日黑陷復召錢曰幸不發寒病
未困也遂用百祥丸牛李膏爲助各一大服至
五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者歸腎水也腎旺
勝脾土不勝水故脾虛寒戰則難治所用百祥丸者
以瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎
曰腎主虛不受瀉如二服不效即加寒而死矣

子和治瘡疹黑陷鐵脚威靈仙炒爲末炒壹錢腦子一
分用温水調服取下瘡痂爲效

活人無比散　治小兒瘡疹惡候

硃砂一兩先研　牛黄

龍腦　膩粉各一分細研　麝香

右同研細如有患者小兒壹字大人伍分入水銀
少許用小豬尾上血三兩點新水同調服寧稳得
睡者然後取轉下如爛魚腸葡萄穗之類涎臭惡
物便安小兒用乳汁調妙

小兒瘡疹黑陷方

乾臙脂三分　胡桃一箇燒存性

右爲細末煎胡荽酒調下藥壹錢立效

右治死血黑陷凡諸方用穿山甲及麝香等藥治
黑陷皆爲氣滯者設也

右方皆襃集第二證所謂毒氣太盛內外蒸爍毒
復入裏必心煩狂亂氣喘妄言如見鬼神大小便
秘澀而腹脹者所宜選而用之者也

紫草散　治瘡疹黑陷皆服此方愈元錢皆云有

枳殼雕服

紫草　甘草　糯米

黄耆各等分

右水煎服

瘡疹黑陷一種因元氣虚而毒氣不能盡出者用黄
耆人參酒炒紫草治之顏色正者如上治法
翻變黑歸腎乃氣弱不能貢血血亦不榮故致枯萎
而黑只用保元湯加芎桂補提其氣氣旺則黑者轉
而爲黄矣

右補虛例第三證所謂內虛而不能使陽氣以副
一云云者之所宜也

魏氏云瘡色初深紅者必變紫紫必變黑紫黑必至
於乾枯此血熱漸變理勢之一定不移者也故初見
深紅失於解散至於乾枯黑陷危殆極矣治法當以
涼血退熱爲主看其微甚或利大便或利小便或用
解散之劑須識不陷不可専以氣虛例之而惟用參
耆補劑補則氣旺而血愈熱涸矣　翁氏治血熱
證七八日間有紫黑乾枯及青灰乾黑陷者有奪命
大造誤笑散金一字金或百祥丸牛李膏豬尾膏等方然皆
能涼血解毒必無此患此而後用此藥得全者少

究者服凉解之藥過多以致泄瀉冰脫而成黑陷者
仍從陳氏法以木香異功治之又不得以血熱為拘
也

奪命五毒丹　治痘黑陷倒靨乾枯不起者神驗

月蜆 蟾酥少許　吐月草 二分 牛黃一分　銀紅 硃砂一分
男王 雄黃三分　梅精 冰片一分

右五味用豬猪尾血為丸如麻子大薄荷湯下
起死移時活動

歡笑博金丹　治同上

取用寅亥戌未四時四靈丹加麝香下

太造保童丸　治同上兼治痘毒亦妙

一鸞子 人胎骨炙過 一二　狼子 狗胎骨炙過 一三　猫子 猫胎骨炙過

右加麝香下

一字金丹　治同上

紫花地丁　金線重樓　山慈菇

至寶丹　治同上

戌腹糧 即將大未事至飢與大食飽取其糞洗淨焙乾研細每一兩麝香一二分

一粒金丹　治同上痘紫黑死者可立活

膃肭臍 二　猶片 三　冰片 二
麝香 一　原蠶蛾 二

已上七方治危急痘證有起死回生之妙

猶神散

天真膏　治黑陷乾枯紅紫及斑不退用此救之十全四五

初生小兒解下黑糞用磁罐收貯加水銀貳兩密合蓋鉛黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久則化而為水每遇前證者兒大小熱毒盛者量與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之立時紅潤活澤真秘方也勝天靈蓋枯臭無益之物萬萬矣緣此糞原係母之真血所化盡以血補血且入土日久又得陰氣多故能解毒　百日內小兒熱而煩躁啼哭不止用少許點入眼角二三次便能神安氣和而睡萎又能清心熱也

大成散　治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切不起發之證俱可用之

穿山甲 一兩炒　甘草末 二分　雄黃
硃砂 各一分半　紫草 二分　麝香 一分

右每五歲兒用一分　冷證熱酒調下　熱證紫草湯下　寒者加入治中散內用　熱證加入六無比散內

無價散 治黑陷欲死者
用無病小兒糞臘月將傾銀罐一箇上下合定鹽
泥固濟火煅通紅取出爲末蜜水調服壹錢
方加麝香氷片少許

灰白
丹溪灰白色靜者怯者作寒看躁者勇者焮發者作
熱看 此痘疹白色將靨如豆殼者蓋因初起時飲
水多其靨不齊俗呼倒靨不妨但服實表之劑如壽
氣稍虛有息但大小便如大便閉通大便小便閉通
小便無妨
痘前證不起發不紅活者非內虛即氣虛用參耆四
聖散發起 頂陷灰白瀉渴者非血虛實用木香散異
功散出不 張氏痘初出時色白者氣血虛也便宜大
補氣血參朮耆芎升麻乾薑甘草木香丁香酒洗當
歸白芍藥煮大便瀉加訶子肉果 丹溪治吳店一小
兒因歲痘瘡色白其痘瘡中每加參耆半兩白朮柴
分丁香兩錢當歸壹錢官桂各三分水煎服
右治虛寒例
劉子族姪女弁年出痘灰白色身熱喘嗽渴脉洪有
力與八物湯加連翹桔梗扇前倒後攻不通紫草乾
葛石膏杏枳連芩前胡瓜蔞仁服之干 後色紅活
喘嗽稍減漸微但熱不除遂於前方減膏杏胡枳連
芩蔞十味服三十餘貼而安安後髮皆落月餘方起
床虛之極也 又一男子二十餘歲出痘已破未破

若灰白色又雜出以黑陷倒靨者發熱寒戰咬牙
泄瀉時咳亦與八物加木通紅花紫草陳皮連翹
十餘貼而安
右治虛熱例
此血氣不足灰白頂陷不起者宜內托散鄉汁若宜散
紫草并乳汁調補　痘色灰白漿不滿足欲成倒
皮薄易破者保元湯大劑加當歸芍藥升麻人乳
好酒進之
右補虛例
有一等白痘似粉醫人所不識有盤有頂而軟肥者
痘疹大旨　幼科其六　之六
以加減大紫草散主之
加減大紫草散　治白痘似粉人所不識者
紫草　人參　茯苓
黃耆　白朮　芍藥
川芎　當歸　甘草
糯米
右各等分為粗散每服四五錢水煎服　一方有
木通無黃耆一方加減快斑散　又一方去甘草加
木通防風名參耆四聖散治表裏俱虛
補元湯　治痘頂充滿而根盤不紫色不紅活乃氣

有餘而血不足也
川芎　當歸　白芍藥酒炒
熟地黃各　紫草　紅花各酒洗
陳皮　甘草各三分　白朮七分炒一
右水各半盞糯米五十粒棗二枚煎服
活血散　治痘色淡白
當歸　赤芍藥酒炒　紫草
川芎　紅花各伍分　血竭一分
木香二分
右為末每五歲者服一錢十歲已上者服二三錢好
痘疹大旨　幼科其六　卷七
酒調下　若極血熱不紅活者消前紫草湯調下
保生散　治氣血俱虛灰白色不起膿回漿者
紫河車一具焙為末　龜板酥炙伍分
一方有鹿茸伍錢
右為末每服五七分或一錢氣虛者保元湯下血
虛當歸紫草煎湯下
混元散　治同上
紫河車一具分作五七塊
用白糯米湯合水洗淨入無油銚內同炒以米黃
色為度同為末每用五七分兒大者一錢極補氣

痘出助漿如神緑糯米性温得紫河車之氣而
化為河車故其補功最速譬之造酒米從麴化
乳

助陽丹

黄耆酒炒　人參酒炒　白术
茯苓　當歸　陳皮
半夏　厚朴　肉桂
山查

薑三片棗一枚糯米五十粒水煎服　如不食加
人乳一盞　痘起加大附子　寒戰不止加附子
防風　渴加麥門冬　瀉加澤瀉豬苓不止加訶
子肉果

助陽丹　痘塌不起根窠不紅

黄耆　人參　白芍藥各酒炒一錢
甘草三分　川芎　當歸各一錢
紅花五分　陳皮八分　官桂二分
薑棗水煎服

回生起死丹　治痘灰白寒氣逆上不食腹脹嘔吐
肌冷泄瀉清水手足俱冷
丁香九枚　乾薑一錢

水煎熱服被蓋片時令脾胃温煖陰退陽回痘自
紅活

夾疹（世俗如錦紋其中有小粒疹如粟米為夾疹不等皆為疹）

謂疹一名麻子，所謂也。經曰：少陰所至為瘍疹。在人則心火上之，心火亢甚則制己所勝，火灼肺金。肺主皮毛，故疹出見於皮膚之間，如蚊蚤所咬之狀。痘瘡只出一般者，皆與疹毒同出，謂之夾疹。其候極惡，惟痘本稀疎而夾疹者或乎可治。痘本稠密與疹併出，彼此相混，須作熱毒，急用辛涼之發而解之，如疹毒漸消，痘本稀疏者亦可治也。疹痘相併，毒不少減，此危惡之疾，孰能料其生乎。夾出夾疹者，荊防敗毒散主之。疹毒消者可治。如痘收痘後復出疹者，此餘毒解散之兆，不須治之

夫疹乃風邪外感，痘為胎毒內發，二證並作，臟腑俱病也。二者相雜，亦當發散。痘疹愈盛，誤謂痘出太密，多不可救。然此乃夾疹痘也，當治以人參羌活散，疹毒即解，痘勢亦退。其元氣虧損不能結痂，當補脾胃為急也。　痘內夾出疹者，不必治之，當以托痘為主，痘出而疹自消矣

荊防敗毒散

柴胡　甘草　人參

桔梗　川芎　茯苓

枳殼　前胡　羌活

獨活　荊芥穗　防風各等分

右剉細，加薄荷五葉，水一盞煎七分，去渣溫服

人參羌活散　治時氣痘疹兼於發表

人參　羌活　獨活

柴胡　前胡　桔梗

茯苓　枳殼　川芎

天麻　甘草　地骨皮各三

右入薄荷五葉，水煎服

在表證多者宜之

清和飲

地骨皮鮮者　麥門冬去心各二分　生地黃

知母　貝母　橘紅

茯苓　甘草　荊芥穗各半分

牛蒡子炒研　桔梗各分　金瓜蔞一分

此證多者宜之　虛者加人參黃耆

活人書云傷寒下之太早熱氣乘虛入胃故發斑[illegible]
下之太遲熱留胃中發斑胃爛亦發斑爛者以[illegible]
斑疹熱發血血得熱而不解浮於肌肉為斑是陽明
之症疹初出皮肉紅點片片如錦紋者此夾斑
辛涼之藥解之其斑漸退擦本堅實者吉否則
斑爛潰易擦癢所謂皮嫩易破者是也如赤斑
頂其隱浮薄結硬者又名門瘡其毒最酷瘡未成
此先潰爛工不能治　夾斑症亦川荊防敗毒散
主之斑退可治　隱疹出而夾斑者症毒隨臟而出
其毒發之勢最為迅疾或血太過而氣不及則衛氣
歸缺不能密護脈絡而致太過之血夾毒上浮亦乘
毒出之勢而發為斑也故前夾疹者稍為易治如痘
起齊其內必虛病多從內斑如不解以升麻湯加歸
芍主之以有或結痂後而發者除毒[illegible]熱肉分
其斑必爛以消毒飲加歸芍防風盛則用連翹
湯[illegible]爛處以生肌散[illegible]傅之若夾毒初出色
赤如火乃毒滯不能宣發之故以四順飲[illegible]利之
如大便利一二次而斑或退則血附氣位急用四君
子湯[illegible]加[illegible]服以防其損防如不止加芍

[illegible]毒必止　宜用玄參升麻湯[illegible]白芍
歸芍在初多用表散在後多用解利紅斑以退紫斑
[illegible]斑不可治矣　與用白虎湯　表症中夾斑
[illegible]然丁桂之藥纖毫莫可投也
[illegible]黃連解毒湯以治夾斑之症則失之太寒
氏用檳榔大黃以療症中之斑則失之太峻總不
若犀角地黃湯以徹內陽明之熱毒兼能化斑湯以
消外蚊咬之血紋內外夾攻表裏調和斯能復全矣
且治痘裏夾斑者極多但見形就是斑不見痘樣
者熱毒[illegible]者十止三四兩日而斑見者連清
逐為尚患此者必煩躁譫語利飲不學劉禪師用地
龍汁和犀角水投服亦必得治斑之法者矣

山梔子湯　治痘兒及斑毒狀如蚊蚤所齧毒盛黑
色者

山梔子仁　白蘚皮　赤芍藥
升麻各一兩　寒水石　甘草各伍

右為細末每服一錢水八分紫草薄荷各少許同
煎至五分去滓放溫服

袁氏方

紫草　紅花　犀角

木通　芍藥　生地黄
茯苓　甘草　蟬蛻
燈草金銀煎服　外加荆芥紫蘇木通葱枝發風
壓除升麻楊枝濃煎少許冷之
陽毒升麻湯　面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮喉
痛
升麻伍分　犀角　射干
黄芩　人參　甘草各二分
右水煎服
陰毒升麻湯　治陰斑

升麻　當歸　川椒
鱉甲　雄黄　甘草
右水煎服
痰癭　丟夾癭痘為痰毒凝結而成也或結於項頸或結
於耳後或結於腋下大者如桃小者似李長者似瓜
短者似棗身熱煩渴勢若不因痘三四日而癭作則
毒隨痘洩膿隨痘泄自可挽全而無害倘癭紅腫消
膿而痘隨標焉吾恐毒膿一潰元氣虚而痘焉能表
裏充灌乎七八之期痘已貫漿而癭作焉保無元氣
消毒袪邪竟獲綏全之慶雖潰無妨治法在乎審目

期之先後視元氣之厚薄紀男女之大小務精全之
寒者痰發絶然錯之從矣癭已紅腫而痘標為法宜
托裏毒解消其毒元虚補其元木通桔梗解毒而散
關鍵惡實生地除熱而茯苓炎甘草治理諸邪蟬蛻
祛風辟毒芍藥洩諸經之鬱火荆芥散陽明之風邪
諸藥缺一不可也　痘起遂發癭治以補托為本逆
之藥不可用耗爍之劑不宜投消毒解毒藥為問　痘
標而癭破流膿出血自致元氣虚虧大用黄芪衛元
湯可也人參黄芪川芎紅花桔梗芍藥甘草防風煎
服　痘兩三日而癭毒仍作急用三消散半夏川歸

茯苓甘草木通紅花生地芍藥牛蒡子天花粉蟬蛻
燈草煎服　痘七八日充灌而癭作宜服沖和飲子
人參黄芪麥門柴胡防風荆芥芍藥茯苓炒白术桔
梗連翹當歸瓜蔞根煎服自愈矣　歌曰木通
生地併黄芪桔梗當歸芍藥併人參蟬蛻兼甘草
茯殭蠶功實尚上焦加味升麻引其升門冬不可遺
下焦牛膝相從助腎氣自始信用之無多荆芥慣多
必疼極連翹白芷醫　愚按方治證須驗時日若頭
面盡腫向變腫則諸痘決不能鼎峻多致損傷
痰癭　或自發丹內熱之候而然也不宜遽用極涼

透裏之劑若標兩三日竟以化斑湯徐徐浴之[illegible]服
生地牛蒡子芍藥甘草木通荆芥穗其毒自消矣若
用豬膽京墨冰片塗之竟[illegible]其害慎之頭面頂顋偏
卵蛇纏腋腫火燒疼痛[illegible]者[illegible]於上宜用[illegible]黃連紫
草車前子梔子等藥　余治[illegible]丹準前藥加減單用
蠶桃花貳錢卽丹收痘朗若[illegible]疼須加柴胡羗活生
地丹[illegible]苦之有用鳳尾草獨煎湯飲豈知山[illegible]即鳳
尾草之名也性極寒而沉走恐傷於虛不可輕用
發疹湯　夜痘裏夾疹痘迎疹見隙而盤據愈加多寄
痘也氣虛氣壅宜作宜用紫蘇荆芥湯浴之隨用
[illegible]藥生地防風黃芩白朮殭蠶甘草蟬蛻等藥服之
可[illegible]若男女種患楊梅惡瘡痛不可忍而痘瘡[illegible]其
間李少陽用蝸牛丹以治但香油皂子仁不可輕用
若患肥瘡瘡如松香樣[illegible]飛丹[illegible]黃皆不可塗也
歌曰黃芩芍藥白殭蠶生地防風白朮聯甘草紅花
牛蒡子酒煎[illegible]服[illegible]破爛牛黃土
茯苓加馬[illegible]乳香些少[illegible]可痘安痊　余
歷驗小兒痘種於[illegible]瘍中痘雖美麗[illegible]必[illegible]若不
肯[illegible]湯以治[illegible]於痰[illegible]矣克鼎嵺尹頭陀與
牧[illegible]蘇煎湯浴[illegible]上[illegible]之痘[illegible]之少

香馬蘭有三種分別青紅白根洋[illegible]紅者[illegible]佳[illegible]
則可治[illegible]丹[illegible]為[illegible]藥牛地為臣羗活防風
為佐甘草蟬蛻為使此其格也
傷損湯　夜痘標二兩日或致撲跌或犯金石所傷則
用[illegible]損而血氣不散痘終受其[illegible]厄李少陽用孩
骨胡桃酒以治則失之峻利況胡桃又作瀉之物用
之不宜王近川用歸尾桃仁湯以治則失之狂妄痘
中豈宜破敗其血哉[illegible]準依劉半[illegible]拱元散人參黃
耆當歸紅花伏雞蟬蛻防風芍藥甘草以補托其
內用[illegible]以收斂其外可也若損而
不破者用蝦蟆皮[illegible]之徐徐以手摩撫若是湯潑火
烙者不宜敷以生冷之藥以凝滯其痘也　歌曰損
傷須覓伏雞[illegible]參耆蟬蛻[illegible]紅甘草當歸合
再入紅花防地俱　昔與[illegible]人次子十三歲患痘兩
朝上樓失足損傷頭額致血淋漓父母憂哭以為痘
中損傷必不能生矣請[illegible]治即[illegible]前方倍下參耆
歸地連進四服而痘遂[illegible]渾身帶不寧加茯神桂心
外[illegible]川[illegible]灰敷之不半月而自[illegible]全美但痛甚者
少加乳香若外傷重痕[illegible]克收斂用白芨白斂藥
皮末摻之[illegible]

痘疔 凡痘中有獨大者或黑□□□□□□□ ……

諸痘疔者熱毒鬱結氣血腐壞而成也狀有數種乃疫毒之氣最為惡候宜謹察之有肌肉微腫狀如粟粟不分顆粒者此氣滯血凝毒氣鬱結也有初出紅點漸變黑色其硬如石者此肌肉已敗氣血中虛不能載毒而出反致陷伏也有中心黑陷四畔突起戴漿者此血隨毒走氣不為用也有中心戴漿四畔乾陷焦黑者此氣附毒出血不為使也有頂戴白漿自破潰爛者此氣血不充皮膚敗壞也有為水泡溶溶易破者此火濕併行氣虛不能斂束也有為血泡色紫易破者此血熱妄行不能自附於氣也有痘頭微孔漿水自出者此衛氣已敗其皮外脫也此數證者於五六日間候之但見一……謂痘疔又謂之賊痘或……於諸痘之間其色紫黯作痛不……不能灌膿甚至不救乃熱毒勢……活命飲……如二便秘……加大黃……外必用綠鍼挑破出黑血或吮出毒血以泄其毒餘痘纔得灌膿否則其毒無從而解必致不起如未應急用隔蒜灸著灸氣殼者或不知痛者不用蒜隔就着肉灼艾灸之既灸後痛可……用鍼挑破出毒血灼艾尤妙雖此法未出……後用奪命丹之類亦不可恃……宜參攷

凡痘瘡起發之時但見乾燥其根焦黑者即內服奪命丹 見形 外用四聖散塗之 如痘……或灌瘡未愈或瘡將較瘢痕者……出之時其處痘不攢聚形色黑滯急以鍼刺破之吮去毒血外以四聖散塗之內服加味四聖湯 見形 調無價散 併奪命丹主之 如痘焦黑煩身……大便何如若大便秘者內服承氣湯 便閉 調無價散外用水楊湯浴法 ……大便利者內服十全大補湯 陳氏木香散 調無價散合奪命丹外用水楊湯浴法

四聖散

菉豆 四十九粒　豌豆 四十九粒 各燒存性　珍珠 一分

油頭髮 燒灰

右為細末……胭脂水調先以簪子撥開黑瘡以此塗之

二聖散 治痘疔挑破以此點之

雄黃 ……　紫草 三分

右研末用油臙脂調
敷方　痂後瘡疔潰爛成坑內見筋骨以此敷之
赤石脂　膩粉　黃蠟
枯粉　血竭　伏龍肝各一錢
飛丹　髮灰　乳香
沒藥各三分　冰片三厘　密陀僧二錢飛過
右臭氣加阿魏叁肆分
右為細末綿紙篩過敷之外用膏藥貼　內服人參敗毒散加穿山甲蟬退連翹
拔毒法　治痘疔
雄黃[illegible]
古用燕脂重浸水令濃調雄黃點疔痘上立時紅活[illegible]此蓋雄黃能拔毒臙脂能活血也
飛龍奪命丹　治痘疔[illegible]毒痘癰或麻木嘔吐重者
蟾酥乾者酒化　輕粉各一錢　枯白礬
寒水石　銅綠　乳香
沒藥　麝香各二錢　朱砂六錢
蝸牛[illegible]
右各為末入蝸牛研爛作丸或加酒少許糊丸綠豆大

每服一丸溫酒或葱湯送下重者外用隔蒜法灸
其詳見灸法[illegible]
捲簾疔　[illegible]舌上捲喉鎖煩渴緊痛飲食難進不知者妄用刀[illegible]致死豈知此疔毒結坐於舌根[illegible]以術鉤犯此證候要把銀鉤鉤破[illegible]惡血隨以苦茶漱口[illegible]吐其毒血而以後方技之　歌曰[illegible]龍宮冰片硼砂青黛[illegible]黃連法製雖按合研勻為細末慢吹喉內捲簾翻　按此疔天多不曉夭殺兒童者患此者症定經於心急宜清解若補助之藥不宜服也有方用蛤蜊汁和玉露調者亦可
燕窩疔　痘[illegible]六日而腋下硬痛兩手坦垂不能活動轉舒[illegible]臉赤惡滿吐沫不知者以為結癰而然豈知痘毒結坐於腋下名曰燕窩疔急用銀鍼挑[illegible]惡血隨將燕窩打水澄清者洗淨而以珍珠末和油臙脂塗其患處內服消毒飲
[illegible]歌曰燕窩疔欲燕窩除挑破須將澄去泥洗淨盡除[illegible]毒血由臙脂和末珍珠塗抹其中時刻候管教毒[illegible]　又曰消毒飲是鼠粘先甘草通茯生

蠟金紙花塵右避趨合烙堂上凝煎毒盡捐　余歷詳察此症左腋潛注則右體之症沉伏而失色右腋潛注則左體之症敗逆而無泛症準治並若曰疔左而右治寧則誤矣有方以蜈蚣和後枕內吊者經驗傳後効終之一無疑

火珠疔　症值六七月而發於中關寒噴火氣息甚難惡渴煩燥面赤壯熱殺痰食不養黑烙名曰火珠疔外要鉤破隨將藥點入服而再服瀉金湯則無矣　歌曰身中關寒火珠疔速要鈎穿服下行黃連膏和梅花片點滴其中左行瀉川服瀉金湯二劑自然而再得安寧　瀉金湯歌曰白芷桔梗風粘行芳藥甘稍伏火毒生地紅花通紫荊合煎服後自消丹

按此症疔患於小兒們人味以爲忌內閉塞不知挑剔侵致相死悔亦者允宜詳驗服劑氣急手足亂撒候則是其或以田螺水滴入者未善

忘漢疔　症值六七之期兩服治假然結壓疔毒封粘頂服燒極而面色紫煩渴則以治身疔法治之挑破處速以巫茲搗爛敷之蓋此處不可以鈎穿者也　歌曰服治生疔服必膨月不仙家神治法巫茲細搗敷圍牢貼待風自消作癒　昔穆修治此疔專用山慈菇和蜈蚣肉搗爛敷上取疔根亦捷法也

參虎疔　症則裏生炎命脈結凝而耳孔內結成疔毒蓋腎地宜無疔毒而疔獨聚結於此者則鼻炎熾而癸元已耗矣急宜錐破隨用發管石女貞子薄荷共研爲極細末吹於患處再用馬蘭根洗淨寸斷塞耳　歌曰參虎由來兩耳中水陽編發製吹筒發管石和女貞子薄荷三味併相攻再把馬蘭根洗淨隨滴寸斷塞其中不須時刻揩回從自然疔裏見奇功

按此方發管石宜改玄精石以玄精而寒發管此不傳異隱術之失也內還有氷片女貞子亦是女貞秋曰子者亦傳訛也

注命疔　症則裏兩足掌心症毒積結成疔硬腫惡痛或如錢樣或如大黑豆或如胡椒粒紫筋直注透足股盤處其毒甚矣速鉤破其根盡淨其血隨用田螺水調和氷片點三次把瓶火燒送浸服搗爛敷於患處內服化毒丹　歌曰症裏如生注命疔花欄決定不爲輕銀鍼挑破其中前尋箇田螺吐水清調和氷片臨貼點兩旁龍鱗草要擬名即蠟火草又脫皮草豆浸服其搗將來敷再內把化毒丹來服不從疔生足掌心　俗人多以足下疔不加意豈知疔

縱生於下而縮剝於十竟犯肺心二經時刻不可捱
故曰注命
蠼舍疔　症值五六朝身發惡熱躁譫語兩眼斷厥
壯腹膨脹小便閉塞惡心痛叫號不寧蓋因暴毒凝聚
於膀胱而於腸禁發東挨結熱方名蠼舍疔語云症
疔結此時刻要死急用銀硃水片蟾酥牛黃麝香研
勻極細末將黃連細茶濃煎候冷取半匙調藥把細
軟稻心蘸藥通納其竅中再用油菜子搽將其莖內
服木通敗毒散　歌曰蠼舍生疔疔如刀十箇疔來
九不饒胡僧仙授攻除法繼後蠼舍命始逃牛黃水

片蟾酥麝和合銀硃一樣細茶連數沸煎濃冷稻莖
心將蘸藥膏依方按法相爲用何畏疔雖日夜號
黃雲間一僧用細銀絲通竅內隨以清水漱口淨薈
之以藍茹其毒血外用珍珠片腦調服亦驗
透腸疔　病六七朝之內腹中飽悶絞痛難忍大便
閉結煩渴遂於糞門旁周生疔毒腫硬紫錐名曰
透腸疔毒徹於陽明故宜速鍼錐其毒大用金銀花
防風煎湯候冷洗淨隨將輕粉珍珠片腦白斂末搽
心蘸塗於上內服黃連解毒湯　歌曰透腸疔毒命
臨傾治得今時漏必成此方奇効人誰得惟是神仙

用白珍片腦珍珠與輕粉分兩般般無重輕要將白
斂先爲末澄過乾時後併行毒收還與時乾結潰爛
來時極可憎　此疔有剔後用竹根搗爛會者有用
条秒搗爛和麝敷者俱有明効總不如野菉豆末和
紅花末乾摻甚美

痘癩

與痘癩者熱毒拂鬱氣血虛弱肌肉敗壞經云熱勝則肉腐者是也正理論曰脈浮而大浮為風虛大為氣強風氣相傳必成癮疹身體瘙癢者名為泄風久久為人痼風氣血充實者外無瘡風內無強邪必無是病惟氣血素虛者不正之氣中於身易感天地肅殺之氣皮肉之內虛風乘之兼以痘疹殘毒疫癘惡氣擊搏播均流散四肢空而出所以瘡本稠寄身無完膚瘙癢難任肌肉潰爛而瘡癩成矣急用大補氣血清熱解毒之法庶可求全若待敗而攻其頹崩

痘癩 幼科其 九十六

日自破爛殘傷不守須命亦為廢人矣　凡瘡破成癩者用十全大補湯 於今用服之外用滅瘢救苦散 救丹塗之

苦參丸

苦參一兩　白蒺藜　胡麻

牛蒡子　甘草各半兩

共為末糊丸為丸竹葉湯下

痘腫

經曰熱勝則腫大抵毒之盛者必腫腫者首不腫亦痘出而頭面起發頭面以漸而腫者此毒之淺者也於三陽之分欲作膿血故其皮肉嫩腫也說當起發之時頭面不腫者必痘本稀密毒氣輕故難腫作膿根不占處所以不腫不必愈之如痘本稠密起發不腫者此毒伏於內不即發洩不可以痘輕論也如起發腫大皮肉如常瘡尖而圓粒粒分明者此佳兆也若皮色鮮紅瘡不成串粘聚平塌者若痛色灰白成餅如錫者痛者無水者皆凶兆也有先起發

痘腫 初發其 九十七

與面俱腫者此兼疫毒之氣名大頭瘟者是也腮頷俱腫者此名蝦蟆瘟也須兼疫氣而治多凶少吉大凡痘腫者直至乾收結痂之時毒化而腫消矣故應腫不腫應消不消者謹慎防之

凡痘腫脹面浮目閉者與解毒湯救咽喉桔梗治之內用消毒化斑湯外用胭脂膏見形謂

凡痘腫脹切防瘙癢此面之中不可少有破損者苟生瘙破汁崩之勢漸不可為邪氣內陷真氣外減腫消而死矣但得破者復灌消者復腫飲食如常大小便自調者變凶為吉用十全大補湯合苦參丸 痘

痲合而治之　如癰色灰白面腫如錫餅者[illegible]
人聽斷何如若能食大便調小便長無他苦者多吉
若不能食小腸併作或生壞瘡者多凶
如頭面頸項或腿頰預腫者此時行瘡毒也並用羌
活救苦湯主之
羌活救苦湯見[illegible]

潰爛救醫門參看

爲痘瘡所出者堅實不破圓淨成痂也其有潰爛者
火勝也[illegible]勝則肉腐火之爲用[illegible]近之
則[illegible]不能近之則焦[illegible]之則爛成瘡故
敗物者莫如火也火生於土[illegible]不燥乘之以風其
蘊益烈痘瘡潰爛由肌肉素虛邪風侵襲風者善行
數變行諸脉俞散於榮衛之間一日毒發於裏風應
於表風火相扇肌肉憤瞋皮膚決裂而瘡壞矣如膿
成而潰則毒已化[illegible]衣潰席不能乾較古方以敗
草散[illegible]之誠[illegible]其毒未化浸淫潰爛
者則衛氣[illegible]不榮諸瘡不斂削其皮恬萎
而死矣經曰根於中者命曰神機神去則機息根於
外者命曰氣立氣止則化絕此之謂也　醫開人氏
云痘瘡潰爛之證因[illegible]散血不[illegible]則毒氣閉塞以
致喘促悶亂不當發散而誤發散則毒隨陽氣暴出
於外遍身皮膚潰爛治宜調[illegible]飲食大便調和
榮衛健旺毒氣自解而無目赤咽痛口瘡吐衂等證
竊謂前證若發表過甚大便自利急用理中丸豆蔻
丸[illegible]以救其裏亦有[illegible]如蚊所齧而色黑乃危
證也若大小便秘結煩躁用[illegible]湯[illegible]猪尾

血調脾于治之門利不食者不可用並毒發於表也
宜汗之則腠理開泄榮衛益虛轉增瘡爛由是風邪
乘虛入之證者有之若毒損於裏而宜下之則內氣愈
虛毒不能出而反入由是土不勝水變黑歸腎身
體振寒耳尻冷脈合其瘡黑陷十無一生治
者審之
瘡出太盛膿汁淋漓不可著席痠痛者乾黃土羅末
傅之甚者白龍散倚蒙傅之或敗草散收靨貼
之丹溪云瘡濕者用瀉濕乃肌表間濕宜用風藥白
芷防風之類聞人氏用麥麩襯卧若用蕎麥粘之

以芭蕉葉為佳 或瘡已出定大便不通而膿汁不
乾者此熱毒在下證也宜牛黃丹利之 若瘡口濕
及膿血雜流者百花膏收靨 生肌散合華蓋綿繭散
收靨 魏氏白螺散乳香韶粉散俱可用若靨後復生
乃餘毒失於解利留滯於肌肉之間而然也宜消毒
散出痘 或結痂久而不落亦宜白花膏 若痘爛無
膿吐利不止或二便下血乳食不化者不治之證也

牛黃丹 治瘡子出定大便不通瘡中膿水不乾

牛黃 大黃末生用 珍珠末
粉霜各一錢

右研勻煉蜜丸如黍米大每服十粒人參湯下量
兒大小加減

生肌散 治疳蝕不斂并痘後膿血雜流不收等瘡

地骨皮 黃連 五倍子
甘草 黃檗各等分

右為細末乾摻瘡上

綿繭散 治痘證後肥瘡疳瘡疥癬能收水涼肌解
毒

黃丹水飛過火煅紅 黃檗 黃連各五錢
黃芩 大黃各三錢 輕粉一錢

麝香一分

右為細末瘡濕乾摻瘡用臘豬油熬化調搽

白螺散 專治瘡痂不收

白螺螄殼不拘多少

右去土洗淨火煉紅取出存性為極細末瘡口濕
處乾摻為妙

乳香韶粉散

即韶粉散加乳香末叁錢韶粉散方見落痂證治

又方

荔枝殼微燒 黃紙燒灰存性 敗茶多年者

二味共為細末或搽或摻自能收水結痂

又方

黃豆殼燒白灰為末摻之　如痘爛無以痘殼煎湯洗

祕傳茶葉方　痘爛遍身無皮膿水流出粘黏衣被

茶葉要多揀去梗使人滚水一湯即撈起再揀去梗濕鋪床上用草紙隔一層令兒睡上一夜則膿皆乾

蔘粉法見收靨論治

蟬花散　治爛痘生蛆蟲及夏月諸蟲咬傷臭惡不可近者服之蟲皆化為水蒼蠅亦不敢近

蟬退（去足淨）　青黛（淨）　大黄　北細辛（各二錢）

蛇退

右為細末每服三錢酒調下仍以生寒水石細末摻之

鼻瘡

表先將口鼻痘不死以其得化陽明之毒氣故也若臭而黑爛成窩者乃氣虧損亦死之證也患此者須服定金湯

定金湯方

綿黃耆　人參　炒朮

當歸　白芍藥　生地黃

白茯苓　甘草　白芷

防風　荊芥　升麻

入芫荽一握白銀一塊燈心廿莖同煎服

予每診臭痘膿血流溢者生臭不臭穢者生臭不延人者生臭不拡臟者生臭不黑爛者生犯此者以芫荽茶葉燒開其穢氣隨用升麻紫蘇湯揩挹其臭處淨潔其衣服床被即服前方無不獲全若頂陷腐黯氣竄處凹黯臭泛洞見筋骨者必死之痘也四明俞氏用寒水丹摻之亦可

寒水丹

雞骨灰（帶血肉燒過）　錄珠（各一錢）　冰片

赤石脂（各伍分）　棕衣灰（二分）

右研細末洗淨徐徐摻之

蚓瘡

夫凡瘡有形化者有氣化者形化者由於胎卵氣
化者忽焉成形瘡之有蚓形化氣化兼之也近有
[illegible]逢人隱吳山治瘡有一小兒患瘡時值十一月感
[illegible]經正脈[illegible]忽頭頂上忽發癢難忍手
[illegible]遂於潰破處將銀針挑之則見其蟲如絲細
[illegible]遂以香油取盡花椒湯洗之癢即止恩按
[illegible]蟲乎茲乃氣化然也又有一患瘡者
[illegible]經炎熱之際頭頂上如前作癢手視之見其蟲如
米粒[illegible]此乃蠅蚋聚搖[illegible]血形化
[illegible] 百四
然也先哲云[illegible]其蟲隱於外也

治瘡瘡生蟲方

經霜茶葉　野薄荷

煎湯洗之其蟲自出或先用艾條熏之後增紫蘇
甘草煎湯洗之禁[illegible]等藥

論瘡頭論 [illegible]

以諸陽之會任於頭心之使任於面瘡為陽毒而心
主之依瘡發頭面頂者由頭面頂腫者而頭面瘡
破爛腥臭者內欲毒[illegible]如頭面也
人之一身內則心為君主外則頭為元首故有真心
痛真頭痛以見不可輕[illegible]精明之府頭
傾視深精神奪矣故古人之生死者亦見如頭凡瘡
初出從他處先見漸發頭起發收歛皆然他皆有
瘡面頭獨稀此[illegible]頭額之間先出先戴漿
先乾收先破損其[illegible]肉下滑腫皮上發起
[illegible] 百五
[illegible]皆肉[illegible]頭上不收或裂自破
或臟出結如堆積者不須[illegible]大地之化孤陽不生
孤陰不長陽變陰合彼此相成頭者諸陽之會無陰
相濟所以難收也又痛[illegible]頭者死此陽脈不治
謂之心絕也

經曰十二經脈三百六十五絡其氣皆上於面而
走空竅又肝開竅於目肺開竅於鼻脾開竅於口心
腎開竅於耳又修真家云面有七竅內應乎心又相
術但觀人之面以知禍福可見面不可敗也凡瘡禍
竅七竅閉塞敗面者因以臟腑經絡之氣皆病也又

諸陽皆聚於面痘之陽毒初出之時必先於面然面
有部位其候不同□心離火之位火性急烈不可
經犯凡痘出現泡漿收先從額上起者凶左頰屬
肝震木之位右頰屬肺兌金之位□□不論先後但
痘欲稀落堅厚者橫糊成堆浮嫩易破潰爛潰膿者
凶□肝藏魂肺藏魄肝肺俱敗魂魄以離故凡病爾
痘於或太硬者死頦屬腎坎水之位此處先出先壯
先驗者吉蓋痘疹出於腎則吉入於腎則凶也鼻屬
脾坤土之位亦不論先後但不欲橫糊早乾收也若
未成漿鼻頭先乾黄色□此脾土將敗真臟色見也

魯聞人氏云痘疹屬火證其面色赤者爲順若青爲
逆若肝木尅制脾土致面色青者是爲逆也急用四
君子湯加柴胡調補脾胃色正纔治竊謂前證若食
而嘔吐搐搦脾氣受傷而爲利搐搦或厥逆皆慢脾
風之漸也用人參理中湯倍□附 加柴胡鈎藤鈎治之
或有少誤多致不起若痘瘡內外熱發出遲風
寒相搏凝滯於肌肉遍身皮膚面色者用透肌散若
傷則生風嘔吐脾傷則生風欲逆用五味異功散加
天麻若痘瘡熱盛便秘飲冷面赤者用犀角解毒散
灌漿之後發熱煩躁作渴面赤者用當歸補血湯足

熱腰痛口渴赤者地黄丸皆要法也 一小兒出痘
飲冷過多腹痛面青手足並冷此寒邪傷脾也先寒
也用附子理中湯一劑而痛止用人參□□□錢
二劑而膿灌又用人參煎湯代茶頻飲月餘而靨
一小兒出痘面色青手足冷此寒水侮土也非十二
味異功散不能救不信乃服疎通之藥殁而遍身皆
青

人中爲陰陽之分故道經以泰卦象之人中而上
分爲三部人中而下亦分爲三部髮際之上陽之上
也兩眉之間陽之中也山根已下陽之下也自口至

兩乳間陰之上也自心蔽骨至陰毛際陰之中也自
陰而下陰之下也凡痘之出現起發收靨自人中而
分上下循序陰陽和暢雖多且密亦可言吉若或參
差雖是稀少亦可言凶蓋有伏也

發熱之時面色明瑩者吉面赤若塗抹者重此邪氣
拂鬱於陽明胃與大腸也陽明經□循於面故赤也
宜以清涼解毒之藥少通利之面垢瘆戰者凶痘疹
之火發自少陽面垢者少陽候見也鍼經云少陽病
甚則面微塵宜表裏雙解蓋少陽從中治也

論耳目所 經曰腎通竅於耳耳者腎之外候也腎之

為藏水臟也天一生水受氣之初先生兩腎而[illegible]
[illegible]焉又有相火在於命門之中故痘疹發熱耳獨[illegible]
痘疹爲火腎不受邪在水之主以制陽光也如耳反
熱則水不勝火將有歸腎之變為痘之候先觀耳後
有紅纏者蓋手少陽三焦之脉從膻中上出缺盆繫
耳後直上出耳角紅者火色也此痘疹之火發自少
陽自見於其經也凡熱自耳先出未及成漿耳輪先
縮者漸薄歸腎之勢矣

目別見

經曰肺通竅於鼻痘疹發熱之初噴嚏者火邪上干
於肺外應於鼻而痛則嚏鼻乾黑燥者火刑於金金
體不燥得火反燥宜清金瀉火以解其毒鼻衄者
血得熱而妄行故衄出於鼻宜與涼血瀉火以解其
毒鼻流清涕者痘疹也疹發於心心肺相連以火爍金
熱極而反化為水也痘出之後鼻塞不通者熱也火
主腹脹痘已成漿收靨之時鼻塞不得息者此為內
有痰膿涕粘結可用金銀小簪子以通之如瘡痂成
漿鼻端先乾者內經曰鼻竅之高於肺以行榮衛陰陽
也邪火刑肺肺敗不能輸精於皮毛故皮毛焦枯先
見於鼻榮衛不行陰陽不續以漸遍身皆乾枯而死

矣凡痘變壞鼻中血出者有痘自流出者鼻孔開張喘
急者肺絕之候皆死證也

[illegible]脾之竅開於口其華在唇四白[illegible]
痘唇通口氣痘疹發熱之初口中和唇色紅潤者吉
如口燥唇裂其毒必甚急解之痘出稠密唇口瘡干
相粘諸痘未發此瘡先已截[illegible]諸痘未收此瘡先已
焦黑者因而痘痂灌唇上痘裂成塊乾臟者重如痘
出太密口中臭氣者臟府敗壞故臭出於口也痘欲
發壞唇上縮者脾絕也唇下白唧者魚口也口中涎
多唇搐者脾津竭也皆不可治痘疹家唇口生瘡名啞
者狐惑證也不急治之殺人

上片牙屬於坤土乃足陽明胃脉之貫絡也下片牙
隸於乾金乃手陽明大腸脉之貫絡也痘疹發熱之
初口開而板齒燥者裏熱也宜以清涼之劑微解之
咬牙者牙乃骨之餘腎主骨故咬牙毒歸於腎必
死如發熱咬牙者有欠則為肝熱有上氣則為心熱
此欲作搐也痘已收靨牙齦潰爛者此內痘未得平
復也勿作走馬疳痘治之疹後牙齦潰爛血出肉黑
氣臭者此方是走馬疳也

驗喉舌咽喉別異

舌者心之候脉訣曰外應舌將紫又脾之脉絡於舌舌之在人延納飲食主持聲音其用亦大矣痘疹之熱其舌紅潤者吉舌燥如芒刺者裏熱甚宜急解之鍼經曰熱病口乾舌黑者死吐舌者脾有熱也脾藏微熱則舌絡微緊時時舒舌少用冷藥及下之戒飲水者胃熱為熱而下之說也飲冷者胃中濕痰少故耳痘出之後舌上稠密出如芡實破如蜂窩者死更加飲水則痰食物則嗆聲啞不出者必死之證痘出太甚弄舌者凶

驗頸項經曰東風生於春病在肝俞在頸項頸項者生氣之本也又曰天氣通於肺地氣通於嗌天食人以五氣喉者氣之所由也故喉主天氣地食人以五味咽者味之所由也故咽主地氣頸項者咽喉之管束也又三陽之脉自頭而上三陰之脉自頸而還頸項者陰陽之道路也痘瘡之候頸項欲疎若纏項而出稠密太甚者謂之鎖項痘其勢凶其道路上不得降下不得升內者不出外者不入經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危此死之徵也凡病深項軟者死骨敗也

驗胷腹經曰凡刺胷腹者必避五藏胷腹者藏府之郭也又曰膈肓之上中有父母蓋言心肺也故痘瘡輕者胷前無留瘦出太甚者必重也其中於藏各有期日凡病深喘急胷骨扇動者肺焦脹也左乳下動脉突出者宗脉絕也皆不可治痘疹腹痛者毒未盡也更宜詳審

驗四肢四肢者諸陽之本痘出欲疎其發欲透其曆欲齊如應出不出應發不發應收不收此脾胃氣虛不能旁達四肢也痘熱手尋衣領亂捻物者肝熱也手指眥目鼻口者肺熱也手足搐搦者心肝風火相搏也各隨其臟而瀉之足涼者此常候也痘疹腎不受邪腎主足故足宜涼手足冷者肝臟怯也四肢皆禀氣於胃而不得至經必因於脾乃得禀也脾怯不能為胃行其津液故手足宜溫之痘已出現手足多水泡者此肝勝脾發為泡也宜急治之不久便生痒塌也如痘身皆發手足不發足不發者此脾胃虛弱津液耗竭榮衛少血故其痘亦當而不發也不能食者死能食者必然痘瘡勢大甚手足冷者不治若未成漿手足皮皺者必死痘已正潰惟足不收者是為純陰無陽相濟所以收遲玉函經曰孤陽寡陰即不中譬取鰥夫及寡婦如痘始成漿他處未收手足

心先瞬[illegible]其後必生惟疾也痞[illegible]之後手足顫[illegible]搖
[illegible]必發癇也虎發手足搐亂皆凶

不得眠 夫衛氣者晝則行陽夜則行陰行陽則寤行陰則寐人之常也凡疹熱便昏睡者心主熱也因心受氣於脾故發熱昏睡此常候也起臥不寧者內有熱也必多昏伏之變合而問者裏熱也大抵痘疹始終安寢者吉蓋氣血強盛榮衛流行邪出於表而不在裏則神安神安則志定是以得安寢也若氣血衰弱榮衛滯澀邪存於裏而熱心惡熱則神不安神不安則志不寧是以煩躁悶亂譫妄而不得眠也亦有毒伏於中神喪氣脫僵臥如尸呼之不應飲食不知者不可以嗜臥論乃死證也

不能食 經曰人以水穀為本故人絕水穀則死仲景曰水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行可見水穀之悍氣為衛精氣為榮水去則榮散穀消則衛亡然凡痘瘡能食者雖重亦吉不能食者雖輕亦危也然有不能食而生能食而死者何也蓋不能飲食者臟腑內實大便不行有半日之穀氣以為之主則成之後自消穀氣而思食矣其能飲食者邪熱殺穀即叔和所謂中消能飲水多食亦肌虛者也將不食而變生焉惟痘家多不能食以口中不和不思食也後詳不能食門

痘後餘毒證治

凡痘瘡輕者其本疎其毒微其證順自然易於收靨

餘[illegible]者其本密其毒盛其發也難用藥調治

餘毒也遇者或伏或倒陷或倒靨痒塌不遂調治

以致不至大困亦作餘毒錢氏云其病有二一者疥

二者癰三者目赤以證求之尚不止此亦有出已盡

發已透靨已齊者復作餘毒此由濕補之過飲食之

失而得之故治痘後餘毒或補或發散或解利要在

分表裏論虛實不可一槩妄投湯劑也

治痘瘡餘毒或肝虛入眼目或肺虛爲癖疥或爲癰

痘疹餘毒 ■ 幼科大 直指

癰發在骨節腎之虛也發在肌肉脾之虛也或在筋

或在頭或在面或牙齒或咽喉腫痛各隨經而

見皆毒不散蘊積而成或病人始不早治或醫者失

治遺於經絡其所由來蓋有自矣宜服解毒等劑

世痘毒攻脾則泄瀉身浮攻肝則眼生翳膜攻心則

煩躁啼哭攻腎則耳疚膿聾攻肺則咳嗽痰涎

潔若已發後有餘毒未散復有身熱瘡癤之類當茶

粉下解毒丸

卅六治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住熱氣

一本 糖下 六分　甘草伍分　犀角

白朮 荊芥 防風

右各等分

水煎溫服

治血解毒湯　治餘毒

防風　荊芥　生地黃

赤芍藥　當歸　連翹

牛蒡子　黃連　紫草

甘草　蒼朮　薄荷

川芎　木通

右等分水煎服 ■ 幼科大

痘癰此由毒氣留滯經絡故於肌肉虛處或關節

搖處紅腫而成癰又或既平之後失於解利餘毒

盛外不得洩於皮膚內不得入於臟腑緊而不去遂

爲之癰如毒氣淺者止生結核腫毒發癤而已甚者

至頭項胸背手足肢節其腫癰作痛但發一二處或

根淺者可治若流注延供根深毒引者小則潰筋腕

骨必致殘廢大者甚則綿延日久而死　用瘡癰多

是實毒血熱成癰分上下用藥一日不可緩成膿必

用清熱涼血爲主赤芍藥甘草節連翹桔梗之類上

用升麻葛根下則用檳榔牛膝更助以貝母忍冬

與白芷不潰便秘用大黃寒熱用芩檗此法累效
瘍前證初起未成膿者用活命飲隔蒜灸治而消
之欲成膿者用活命飲解而潰之氣血虛者八珍湯
實而潰之虛而不能斂者托裏散補而斂之大
凡發熱腫痛大便不結用仙方活命飲及隔蒜灸法
大便秘結用仙方活命飲加大黃大便已通腫痛未
退再用活命飲一服用托裏散補其元氣若發熱倦
怠大便調和用補中益氣湯未應亦用隔蒜灸
若潰而發熱口乾脈[illegible]用[illegible]水淋
漓不時發熱用四君參芪若因乳母肝經血虛發熱

用加味小柴胡湯肝脾鬱怒發熱用加味歸脾
湯膏粱厚味積熱用加味清胃散如專與
涼血用敗毒等藥復傷元氣必致成者不能潰潰者
不能斂矣　愚凡治瘡瘍先看在何經絡分氣血多
少用引經藥如太陽經羌活防風陽明經升麻白芷
少陽經柴胡少陰經獨活太陰經防風厥陰柴胡若
初紅腫硬痛者以銀針刺之口吮去惡血以拔毒貼數
貼氣實能食大便堅者用排毒散疏利之氣虛食少
者用十宣散或流氣飲若淺而小者只內服小柴胡
加生地黃湯外用拔毒膏貼之此治腫瘍之法也若

已成膿而未潰者以鍼決去其膿勿使內潰已
潰者用十全大補湯之此治潰瘍之法也

仙方活命飲　治瘡瘍一切腫毒未成即消已成即潰此消毒散膿止痛之聖藥

金銀花　陳皮各三錢　皂角刺炒
穿山甲用蛤粉炒　乳香　沒藥
白芷　防風　當歸各一錢
貝母　天花粉　甘草節各七分

右每服五錢酒煎嬰兒母同服或水酒調服亦可
若發熱甚而邪在表者加麻黃散之而毒在內者加
大黃下之當臨證制宜此解回生起死之劑但元

氣虛者不治

人參敗毒散　治餘毒瘡腫

人參　赤茯苓　羌活
獨活　前胡　薄荷
柴胡　枳殼　川芎
桔梗各等分　甘草減半　牛蒡子
防風　荊芥　連翹
金銀花

頭上加白芷升麻　上身倍加桔梗　手加薄桂

腰加杜仲 腿足加牛膝木瓜

樺皮散 治疳瘡及乳癰并一切腫毒 若治乳癰

樺皮木剉煎濃服此藥味苦平無毒

取樺皮燒存性爲末酒調服之立消

十三味敗毒散 治癰毒

當歸 白芷 穿山甲土炒一

金銀花 防風 乳香製

甘草 陳皮 赤芍藥

皂角刺 貝母 沒藥製

天花粉 芍藥

各等分酒水各半煎服

搽壽散 小兒長

保命集木香散 治小兒痘後生瘡如神

地骨皮一兩 木瓜半兩 穿山甲炙黃三錢

麝香一字

右爲末米飲下二錢

沉氣飲

川芎 當歸稍 白芍藥

防風 人參 紫蘇葉

木香

桂心 桔梗 雞心檳榔

白芷 厚朴 烏藥

枳殼各四分

右剉細水一盞煎七分服氣血壯而自利者加熟附子大便實加大黃

小柴胡加生地黃湯

柴胡 人參 黃芩各三兩

甘草炙 生地黃 半夏各二兩七錢

右爲麤末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至半盞去滓溫服

六味活血散 治痘瘡癰痛初起紅腫不散

當歸 川芎 赤芍藥

生地黃 紅花 蘇木各等分

右水酒煎服之

五福化毒丹 治痘瘡餘毒腫痛

生地黃 熟地黃 天門冬去心

麥門冬去心 玄參各二兩 甘草

甜硝各三 青黛一兩

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯化下

犀角消毒丸 治痘疹餘毒一切瘡毒

地黃　荊芥　當歸
犀角　防風　牛蒡子（炒）
赤芍藥　連翹　桔梗（各一錢）
薄荷　黃芩　甘草

右為末，蜜丸芡實大，每服一丸，白湯化下。

按化毒丹降火涼血解毒之劑消痘花清熱解毒敗血之劑，蓋小兒臟腑嬌嫩，元氣易傷，況痘後氣血皆虛，豈能勝當此劑？若胃氣一傷，則未成者不能消散，已成者不能腐潰，已潰者不能生肌。殊不知痘瘡乃臟腑所發，遍身之血皆化為膿，況此方愈而患此，乃脾胃虛怯，肌肉消弱，榮衛短濇所致，治者審之。

十宣散（見前）

托裏散　治痘毒元氣虛弱，不能潰散，未成用之自消，已成用之自潰。

人參　黃耆（炒各二錢）　當歸（酒洗）
白朮　陳皮　熟地黃
茯苓　芍藥（炒各一錢五分）　甘草（炙五分）

右三五錢，水煎服。

托裏消毒散　治痘毒氣血虛弱，不起發腐潰收斂，或發寒熱，肌肉不生。

人參　黃耆　當歸（酒洗）
川芎　芍藥（炒）　白朮
陳皮　茯苓（各一錢）　金銀花
連翹　白芷（各七分）　甘草（伍分）

右每服三五錢，水煎。

東垣聖愈湯　治膿潰心煩無寐，體倦少食。

熟地黃（自製）　生地黃（各二分）　人參
川芎（各三分）　當歸　黃耆（各伍分）

右水煎服。

加味歸脾湯　治脾血虛損，健忘驚悸，或心氣虛不能攝血歸源，以致妄行，或吐血下血，或因乳母心脾二經有熱，瘡不結痂，或瘡痕赤色，加柴胡、山梔，即加味歸脾湯。

人參　白茯苓　黃耆
白朮　龍眼肉　當歸
遠志　酸棗仁（炒各二錢）　木香（一錢）
甘草（伍分）　當歸身（一錢）

右薑棗水煎，母子同服。

丹溪治痘發癢藥用貝母南星殭蠶天花粉寒水石白

並前烏犬黃豬牙皂角醋調敷患處効

拔毒膏 一名必效膏

馬齒莧 杵汁　豬脂　石灰

右以三味共熬為膏塗腫處

神効隔蒜灸法　治癰疽大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火散用大蒜頭切三分厚安上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸痛不止尤宜多灸小兒須將蒜切片著肉一面略劄小空灼艾燃蒜先置大人臂上試其冷熱得宜然後著瘡上又別灼如前法試之以待相易勿令歇

拔鍼丸　治瘡癰膿已成不潰

陳壞米 一斗　碉砂 伍分　雄雀糞 四十九粒真雄 雀糞直者是雄

右為末米粥丸如麥粒大每用一粒粘瘡頭上以膏藥貼之半晌其膿自出若膿透而膿不出或出而愈痛或發熱血氣虛也用托裏散或作嘔吐痰食少體倦脾氣虛也用六君子湯

神効太乙膏　治一切瘡疽潰爛

玄參　白芷　當歸　肉桂　赤芍藥　大黃

生地黃 各一兩

右㕮咀用麻油二斤入銅鍋內煎至藥黑濾去渣徐入淨黃丹十二兩再煎滴水成珠捏軟硬得中即成膏矣

神効當歸膏　治瘡毒浸淫或湯火等證及瘡腐不能生肌收斂者

當歸　黃蠟　生地黃 各一兩

麻油 陸兩

先將當歸地黃入油煎黑去渣入蠟熔化候溫攪勻即成膏矣

豆豉餅　治瘡瘍腫硬或硬而不潰及潰而不斂並一切頑瘡惡瘡用江西豆豉為末唾津和成餅大如銅錢厚如三四文置患處以艾鋪餅上灸之未成即消已成者祛逐餘毒間有不効者乃氣血虛敗之證參[illegible]用之

如聖餅　治一切瘡瘍[illegible]腫不能消散或毒不能解散

乳香　沒藥　木香

血竭　當歸等分　麝香 減半

右各另爲末酒調和各敷於[illegible]
蠟酥等分
神功散 治痘瘡初起腫痛者用之可消加血竭更
効
黃蘗炒爲末二兩 草烏生爲末一兩
右用漱口水調敷常以漱水潤之
三豆散 痘後癰毒初起紅腫
黑豆 赤豆 菉豆
用醋浸研漿時時以鵝翎刷上隨手可消
銭箍散 治痘後癰毒

鳳凰退燒灰醋調刷四畔留頭出毒氣甚佳
疥癩 痘後遍身瘡癬如疥如癩膿血浸淫皮膚瘙痒
日久不愈此毒氣彌漫散於皮膚宜升麻葛根湯
防風解毒湯大法苦參丸疥瘡主之若因搔摘成
瘡者只以百花膏塗之
連翹散 治小兒瘡疹 疹餘毒作楚或生於頭
面耳瘡頰亦生瘡
連翹 黃芩 瞿麥
木通 滑石 柴胡
荊芥 牛蒡子 防風
羌活 赤芍藥 甘草各等分
每服三錢水一盞煎半盞又入生薄荷尤好
合化散見前
癰毒 痘後肝經含有熱毒肌肉内透筋骨外連皮膚
時痛出血日久不合亦惡候也内服十全大補湯
外以綿繭散貼之見後 更與收瘡口生肌蝕條參看
三黃散 治濕熱生瘡膿水浸淫澱流處便濕爛
木香 五倍子 黃連
黃丹 海螵蛸各一 輕粉
雄黃各[illegible]

右爲末用瑩肌散煎洗滲之乾者香油調
癮疹 癮疹者皮膚間隱隱成疙瘩瘙癢爬搔更多内服
消毒防風湯大法 外以單衣湯洗之 疹者或間熱
點狀如蚊蚤所咬之迹或如小芥子即麻子也升麻
葛根湯初熱 加防風荊芥穗主之熱甚渴者與人參
白虎湯相合服之
單衣湯
炊飯單衣煮水洗癮疙瘩者神効如無以炊飯
甑下水 治痘後發癮
煮湯亦好

蜞[illegible]活者以水養之七日旋取其小者

之

[illegible]赤火丹[illegible]此[illegible]流移紅腫或痛手不可近

從頭上起者[illegible]下起者[illegible]

[illegible]

[illegible]草[illegible]紅不腫不痛者[illegible]也人參[illegible]

[illegible]主之

當歸尾　赤芍藥

[illegible]　生地黃

[illegible]花　防風

淡竹葉　木通

[illegible]散　[illegible]疹等證

牛蒡子　甘草　荊芥

防風各五分　犀角鎊二　金銀花三分

右水煎熟入犀角[illegible]服

加味解毒散　治痘疹[illegible]

痘[illegible]乾

[illegible]

薄荷[illegible]　甘草各[illegible]

右為末每服一二錢滾湯調下

小柴胡加生地黃湯[illegible]

蜞鍼法

取水蛭大者五六條放腫處吮去惡血可以消丹

瘤火[illegible]腫

[illegible]痘瘡毒氣之[illegible]目[illegible]也[illegible]自[illegible]而[illegible]外治之

之法但[illegible]血解毒而已活血不至於熱解毒不至於

冷五臟平和則[illegible]當自去不可輕用點藥反致損睛

宜[illegible]散　四物湯加柴胡主之　若目閉淚出

[illegible]是明者此[illegible]明證也惟於黑暗處則能開窺見

明則[illegible]光[illegible]之淚自流出[illegible]宜洗肝明目散

[illegible]便秘者瀉青丸或能開目只視物昏者此血

不足也四物湯加密蒙花[illegible]中赤者洗肝明目散主

之　從子[illegible]痘後[illegible]目生翳[illegible]明特[illegible]家

兄從宜興試歸[illegible]之則[illegible]皆以[illegible]重覆

蔽沉明[illegible]兩睥白膜已遍[illegible]黑睛[illegible]如[illegible]科眼

科投藥不効束手告技窮矣余亦莫知為計家兄曰

汝第[illegible]之證弟能生之[illegible]遂技窮於是試精思之

余[illegible]閉戶而思目者清陽之所走也而忽焉[illegible]

□□□□陰犯之也蓋陰為敵與陽光□故羞明特
□□□待治法矣乃以黃耆助清陽之氣為君生地
黃當歸養目中真血為臣羌活獨活防風白芷川芎
甘菊花薄荷荊芥升清陽黃芩豬膽汁車前子茯苓
滋陰為佐雄豬肝作引煎服仍間服瀉青丸八劑
□□腫激悍瞑翳已去矣時眼科所進點洗之藥一
切屏不用止用橄欖核磨汁敷眼胞而已蓋嬰兒柔
脆點洗之藥必有所傷故也　治法大論詳大科眼
目門并本門眼目條內

涼肝明目散　痘後羞明

當歸　龍膽草　密蒙花
川芎　柴胡　防風
酒連

各等分雄豬肝煮湯煎服

望月沙散　痘後暗室中不能開者

穀精草　密蒙花　蟬蛻
望月沙一兩

右為末雄豬肝壹兩竹刀破用藥一錢摻入肝
內水煮熟飲汁食肝效

兔絲散　治痘疹後毒氣不散生翳障及赤腫

羌活　蟬退去土　防風
蛇退　菊花　穀精草
木賊　甘草　梔子
白蒺藜　大黃　黃連各少許

右為末每一錢米湯泔水温服

便秘 痘後毒入腹中熱氣併於小腸則小便不通併於大腸則大便不通如前後部俱不通者熱勢愈甚小便不通者五苓散導赤散大便不通者三黃丸四順飲三乙承氣湯大小便俱不通者八正散通關散斟酌用之

泄瀉 痘後泄瀉其證有二　如能食而瀉脉盛者此熱入大腸也瀉者內熱也食能多者熱消穀也脉盛而數熱證諦也宜黃芩湯　加黃連　如食少不渴脉微小者此裏氣虛不能禁固水穀也宜四君子湯加訶子肉豆蔻或理中湯丸加熟附子甚者以肉豆蔻丸止之

便膿血 痘後便膿血者此熱毒入大腸也宜四物湯加黃芩黃連枳殼荊芥穗或黃連解毒湯
地黃　勿作倒靨及用刼澀藥也

□□□□□出於大小腸主出而不納豈受壓土

首是餘毒在胃也然有冷熱二證　如心煩作渴乳甚急聚滿胃中然後吐出如射其人面色帶赤手足心熱居處喜凉此熱吐也橘皮湯加黃連竹茹主之　如乳食水漿隨吐面色青白手足冷大小便自利此冷吐也益黃散脾主之　痘後餘毒多是熱邪其間冷證十有一二也　亦有傷食而嘔者但聞食臭即吐不欲食木香大安丸或養脾丸並用生薑湯下　有飲水多而吐者必吐清水名水逆五苓散主之

木香大安丸

木香二兩	黃連	陳皮
白朮各三	枳實	山查肉
萊菔子炒	連翹	神麴炒
麥蘖炒	砂仁各一兩	

右為末神麴糊為丸陳倉米湯下

養脾丸

人參	白朮	當歸
川芎各一兩	木香	青皮
黃連	陳皮各一	砂仁
山查肉	神麴炒	麥芽炒各五錢

右為細末水調神麴糊丸如麻子大每服三五十丸陳倉米飲下

發熱 痘瘡自初以來一向發熱至於痂後猶不少減者此有虛實二證　如大便難小便赤能食而煩渴者此實熱也以三黃丸或四順飲　如解利其熱後用升麻葛根湯加地骨皮解其熱也蓋升麻葛根湯治痘瘡未發之先已發之後俱可用之藥也　如大便不祕小便不赤坐臥振搖飲食不甚進者此虛熱也以保元湯大法加知母麥門冬虛甚者加炒乾薑或熟附子少許引火歸源　薛陳文宿先生云痘[illegible]痘瘡收靨之後渾身經日不除別無他證用柴胡麥門冬散如不退服人參白朮散　若風熱咳嗽咽喉不利用桔梗甘草防風湯為謂前證有因熱毒未解者有因胃氣虛熱者有因胃氣實熱者其因不能枚舉當臨證制宜而藥之　一小兒咽痛壯熱痘瘡色赤手微熱此餘毒未解用柴胡麥門冬散而安七日之後復熱手指初按似熱久按則冷此脾氣虛也用五味異功散而痊　一小兒痘咽痛大便不實口渴飲湯手足不熱此脾胃虛弱也用人參白朮散而[illegible]便實但不時寒熱用加味逍遙散而愈　一小兒痘

咽痛發熱作渴面赤飲冷此胃經實熱也
梔子湯而愈因食厚味復發手足並熱用瀉黃散一
劑而痊　一小兒痘咽痛發熱飲冷大便黃色手足
指熱此胃經實熱也用瀉黃清胃二散各一劑而愈
後因乳母食厚味兒口角流涎不能吮乳仍用前藥
治母而愈　一小兒痘咽痛足熱余謂此腎虛足三陰
虛而無根之火上炎也古人有云痘歸腎經必不可
救當用壯水之劑亦有生者奈彼不悟翌日果腰痛
咽啞始信余言乃用大劑地黃丸料加五味子并補
中益氣湯而愈　一男子出痘上體甚熱兩足俱冷

喉痛作渴痘亦不起發此禀腎經虛熱也以六味地
黃丸料煎與恣飲漸愈又用八珍湯而痊　一小兒
面色素白出痘咽痛發熱面赤作渴飲湯手足指冷
此禀足三陰虛也用大劑加減八味丸料煎與恣飲
又以益氣湯助其脾肺以滋化源痘止熱退而愈
柴胡麥門冬散方見前
柴胡梔子散　治肝經風熱痘疹發熱不愈或發熱不
止
柴胡　山梔　牡丹皮各一
川芎　芍藥　茯苓各一錢

白朮炒　甘草炙各五分　當歸
牛蒡子炒各分
右水煎母子同服
小柴胡湯　治發熱甚而嘔者宜服之
柴胡　人參　黃芩各三
甘草炙　半夏各二兩半
右為麤末每服二三錢水一盞生薑三片棗子一枚
同煎至半盞去滓溫服嗽者加五味子煎服頭
痛發熱肢節疼痛者四味升麻湯大便不通者四
順飲若大便自利黃黑色者此毒亦有所出不必

瘡加湯劑恐重增他病大便自然通不得以溫藥
助之痘疹亦稍以[illegible]與四味升麻湯荊芥
散攸大便利不可以溫藥助之其下利甚者却與
止溫之
槐花散　治痘疹餘熱不退
槐花　赤小豆各等分　麝香少許
右為細末每服半錢蜜湯調服不拘時候
黃耆散　治壯熱不退可涼肌清散熱
黃耆　柴胡　乾葛
甘草炙各等分

右為末每服一錢薄荷三葉水半盞煎至三[illegible]
三[illegible]心服此藥治發熱數日不退者其熱是疹
疹者量其虛實用之也

[按]痘後忽然口噤涎潮角弓反張手足瘛瘲身背
強直此中風也蓋痘方愈衛正弱不知避忌忽遇
節令氣交八方不正之氣乘虛而入故為此證宜消
風散貳錢入蟬蛻末壹錢分為三服投生薄荷汁
及酒各數點溫湯送之連二三服或作瘖瘂或再出
膚疹而愈

消風散

鈎藤湯 痘後口噤僵直遶臍腹痛

鈎藤	紅花	木香
川芎	當歸	白芍
甘草	白朮	青皮
黃連	官桂	生薑

各等分水煎不拘時服

[按][illegible]為痘風門溪分氣血虛實以日子分之
多屬氣血不足 虛則黃耆生血之劑助之略佐以
風藥 實則[illegible][illegible]藥黃芩為君連翹白芷續斷之類
為佐 [illegible][illegible][illegible][illegible]氏方可用 餘詳痘中風門

[按]痘後手足拘攣屈伸不便此為血虛[illegible]
[illegible]不能榮養於筋宜十全大補湯大地黃白茯苓
加川續斷多服乃佳氣虛者少加川烏煨過行經不
可[illegible]作風治及行發散及耗陰血也

當歸桂枝湯 治痘後手足不能屈伸

當歸	川芎	黃耆
[illegible]	薄桂	黃柏
蒼朮[illegible]		

各等分水煎 如氣虛少加川烏以行經加人參
為主 如感風寒以致肢節疼痛加羌活防風

昏昧妄言 痘後昏昧不解識人口中常妄言如邪祟
狀此移熱入心包絡宜導赤散寧心安神丸症見前
醒後以保元湯加麥門冬生地黃四物湯加石菖蒲
木通山梔子仁相間服之 若[illegible]然昏昏喜睡狀如
脉微身無熱口中無[illegible]此其人無病必與乳食少
令病氣已解正氣未復故欲睡而喜睡以[illegible]極勝
之象不須妄治逐怒赶醒矣

[按]手足厥冷喜睡不語此痘疹逆候也若在[illegible][illegible]
之時十無一生今病已愈氣血久虛脾胃大困其厥
逆宜大用保元湯加當歸身熟附子主之

疹後咳嗽頻頻涕唾稠粘此痰疹餘毒也不問有無
有虛有實不可拘泥一定之法　如自初出咳嗽至
今未愈者此肺中餘邪未盡也宜甘桔湯加牛蒡合瀉
白散潤加牛蒡子馬兜鈴主之　如咳而喘大便難
小便赤者此熱毒也宜葶藶丸主之　如大便潤者
人參白虎湯合甘桔湯主之　如咳而大便溏
小便清無大熱渴者此虛也宜人參清肺散主之
如咳而血出者甘桔湯加牛蒡子生地汁阿膠
主之　如向不咳今始咳者此風寒外感也麻黃湯
主之

燈心湯　治痘疹出後煩喘小便不利者宜進之

燈心一把　鱉甲二兩

右剉為散每服一兩用水八合煎取四分服之各
量大小加減

咳嗽之時腸痛者經云左右者陰陽之道路左右兩
腸之謂也由餘毒在中陰陽之氣不能升降故腸為
之疼也但當解毒毒氣去則真氣有所若自平矣小
柴胡加枳桔湯主之

赤茯苓湯　治小兒疹痘瘡出後咳逆腸痛不下食

赤茯苓　甘草炙　人參
升麻　枳殼半兩麩炒　梔子

右為麤末每服一錢水一小盞入竹葉七片煎
或三十粒同煎至五分溫去滓一日三四
服看兒大小以意加減本方俱疹痘出後腸痛者
由痘後毒氣潤亂阻於升降左右為陰陽之道路
氣之所行處今氣滯為腸痛以枳殼寬腸下氣令
氣順腸不痛也大青梔子去熱毒升麻解毒赤茯
苓導心熱利小腸無熱以先肺氣而終道自下矣

痘疹未出而腹痛者乃毒內攻也今已解
無復壅遏矣而腹中痛者其證有二　一則因大便
不通燥屎作痛備急丸主之　一則因食道
胃虛不能消穀而作痛如便秘者丁香脾積丸
便利者木香人參丸主之　但燥屎痛者病在
下焦傷食痛者病在上焦不可按者原食又
常潤忽然作痛者此虛寒也病在中焦必當用理
按摩黃芪建中湯主之

痘家作渴亦是常事後則不宜有渴乃忽
渴而引飲者餘毒搏於心肺其咽燥故也其人必
能食大便秘小便赤舌燥咽乾宜人參白虎湯加黃
連主之　若食少大小便自調雖好飲湯咽舌不燥

此脾胃虛津液不足也宜人參白朮散不過入參
門冬散加天花粉主之並見瘡渴
痘瘡後失音有二 咽痛不能言者此毒氣結於
咽喉之間痰壅作痛而不能言天花散主之見失音
心熱不能言者心中邪熱未微腎虛不能上接於心
雖有聲而不能言四物湯去川芎加麥門冬白茯苓
主之
痘瘡後邪氣既退正氣將復脾胃略舒宜漸能
飲食今原不食今因飲食太過或原能食今又驟加
以致惡食不食者此皆內傷有餘證也宜木香大安
丸見傷食 丸見秘方 百祥丸
丸主之食傷 如原未食今又不喜食者此脾胃中氣
不足宜七珍散見不能飲食或人參白朮散去葛根加陳皮
木香研末取貳兩另用糯米綠豆各貳兩各炒熟研
末煨和棗湯調服待能食進兼進養脾丸
痘瘡後忽發寒熱如瘧狀發後如洗即發者此脾
胃氣弱失於將理更感風寒宜先以柴胡桂枝湯發
去新受之邪後以保元湯加當歸陳皮白朮砂仁為
佐生脈調之
大和散 治痘瘡後寒熱往來時時煩悶躁亂
生地黃 當歸 地骨皮
人參 甘草炙 白芍藥
右㕮咀每服一錢水半盞煎至三分去滓溫服
柴胡桂枝湯見發熱
痘瘡後面目虛浮或久則一身皆腫者此長氣不
足出風太早風邪乘虛而入其治在肺宜五皮湯先
加桂枝微汗之後只服本方若偏身皆腫以胃苓湯
合五皮湯主之
痘後皮虛膚腹滿或氣喘急者此宿垢在裏不同餘
毒停積蓄水並先利之宜塌氣丸利後以胃苓湯去
甘草加人參黃芪大腹皮湯主之其治在脾如因傷食
並見秘方 丸見秘方 見傷食
作脹不腫者只木香大安丸
五皮湯
桑白皮 地骨皮 生薑皮
大腹皮 五加皮各等分
右判細取長流水一盞燈心廿莖煎七分溫服
塌氣丸
木香半兩 雞心檳榔白者一隻
黑牽牛二兩半生半炒取頭末一兩
右共為末神麴糊為丸如黍米大燈草湯下
胃苓湯

豬苓　澤瀉　白朮
白茯苓　蒼朮　厚朴(紫油者薑汁炒)
陳皮　桂心　甘草
右挫細水一盞煎七分去査溫服無時

汗後亡陽 痘後自汗盜汗皆衛氣虛弱血熱肌肉虛也宜保元湯加桂枝當歸六黃湯相間[illegible]收滿散服之如汗出盛再用溫粉撲之(方見自汗門)若汗潤如油汗出如珠者皆亡陽證死不治

衄血 痘後失血證乃餘毒邪熱迫血妄行也 自鼻出者玄參地黃湯主之(方見失血)外用梔子炒焦黑研末燒灰(?)吹之 自溺出者八正散主之(小便不利) 自大便出者桃仁承氣湯主之 此與上自汗證同一例也上是熱在衛故汗出此是熱在榮故血出二證大便秘者並與四順清涼飲主之

桃仁承氣湯

桃仁(二十二箇去皮尖勿研泥勿煎)　大黃(二錢)
官桂　紅花(各一錢)　甘草(半錢)
右三味剉細水一盞煎七分去渣入桃仁泥化開食前服

蚘蟲 痘後或吐蚘或利下蚘者皆熱毒入裏在胃則吐蚘熱在腸則利下蚘有者宜以安蚘湯加桃仁又蟲吐者宜參苓白朮湯加烏梅川椒 若不因利但因食則吐蚘者此胃久虛蟲無所食故聞食臭即出食已則吐微宜理中湯丸(方見)加烏梅肉黃連川椒主之

錢氏治痘疹蟲歌曰痘家蚘蟲胃氣離人參白朮與陳皮茯苓甘草當歸併烏梅(?)迪服消蟲除

蓮肉湯

蓮肉(去心半斤)　豬肉(去油皮一斤)

共水煮熟下砂仁末(?)粥勿少與喫其胃氣接養蟲自安若不由吐蚘切不宜投以使君子檳榔之物恐[illegible]中一投命遂喪矣

狐惑 痘後吐蚘而手足厥冷者蚘厥若不吐利內熱臟腑者為狐惑狐惑之證其人好睡默默不欲食上脣有瘡蟲蝕其肛下脣有瘡[illegible]其臟其聲啞嗄上下不定故名狐惑也此在痘疹後亦多化䘌丸主之如大便結者以桃仁承氣湯加檳子利之

化䘌丸

黃連(一兩)　蜀椒(去目閉口者炒)
苦楝根白皮(乾者)

右共硏末用烏梅肥者七箇艾湯浸去核搗爛
丸艾湯下
黃連陷蟲丸　治狐惑瘡
黃連一錢　蘆薈　乾蟾頭炙各一錢二分
史君子肉二錢　蕪荑一錢五分　川楝子肉一錢
右末烏梅洗淨去核搗爛和丸米飲下
牙疳瘡後牙齒齦肉潰爛者此症兆脫去從米水浸洗
爲用綿擦用綿醮散傳之　若有臭血出者又
名走馬疳瘡內以黃連解毒湯煩躁加雄黃爲丸仍
煎湯下外以馬鳴散傅之　或口舌生瘡者並宜洗
心散　巳上諸證大便秘者並用四順飲利之大便
潤者用甘露飲服之老茶葉雄鼠糞根煎湯洗以白鹽
即酸梅也燒灰入中白火煅加入雄黃散傅之
洗心散
當歸　生地黃　木通
黃連　麻黃　大黃酒洗
薄荷葉各等分
右剉細水一盞加燈心爲引煎七分去查溫服
甘露飲　牙疳俱用
麥門冬一錢去心　天門冬一錢去心　生地黃
熟地黃八分　石斛去根　枇杷葉各八分
山茵蔯　枳殼　黃芩
犀角屑各五分　甘草一字
水煎服
雄黃散
雄黃　枯礬各一錢　麝香半分
人中白五分
共爲末吹入鼻中如吹不入用麻油潤使進
馬鳴散
人中白即溺缸底白垽以物刮取用新瓦火煅過如白鹽乃佳半兩
馬鳴退即蠶退紙也火燒過存性　五倍子生一錢
共爲極細末先以米泔濃汁浸洗以此傅之
人中白散
人中白煅一兩　黃蘗蜜炙三錢
右爲末搽口內
吹口散　治口瘡
黃連　青黛　孩兒茶
冰片　爲末吹之
赴筵散　口瘡神效

薄荷　黃蘗

等分為末入青黛少許搽之

牙疳方　痘後餘毒攻牙齦消腐[illegible]

人中白[illegible]　枯礬[illegible]　鹽梅[illegible]

麝香一分　白礬子灰[illegible]　五穀蟲[illegible]

為細末先將葱茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

大抵痘之後遇有便秘內熱等證須當解利勿使[illegible]變生諸證也解利之劑如三黃丸四順飲[illegible]之類若失於解利致生[illegible]證須[illegible]切中病源之藥以急治之不可緩治令病勢滋蔓反害人也今人不[illegible]能究其病因一[illegible]用不急之藥其意但欲逃差誤爾而皆實能究其致病之由而藥之耶急治之中惟在識其虛實苟稟受既實藥餌充壯病後不熱者餌與解利緩治不可也所稟怯弱病後藥餌人虛坐立振搖飲食少者却宜和緩之藥以扶持之候其飲食加[illegible]榮衛既充然後微微解利未為遲晚或[illegible]之人不必解利可也

水痘

小兒痘瘡有一症與水痘不同[illegible]新安張李明[illegible]瘡皮不薄如赤根白頭[illegible]之大痘此裏證發於臟也其瘡皮薄如水泡破即易乾而出無漸次白色或淡紅冷冷有水漿者謂之水痘此表證發於腑也亦與疹子同又[illegible]發熱一三日而出出而即消易出易靨不宜[illegible]但用輕劑解之麥湯散主之[illegible]可服又當服大連翹湯以解之[illegible]心悶煩躁發熱及大小便澀口舌生瘡者通關散主之　水痘夾黑出來黑水流或手足冷者[illegible]生地玄參連翹茯苓木通蟬蛻麥門冬川芎陳皮當歸生薑水煎服

麥湯散　治水痘

地骨皮　滑石　甘草各等分

甜葶藶　麻黃　大黃

知母　羌活　人參各一

右剉散水一盞每服二三錢小麥七粒煎六分不拘時溫服分二服

麥煎散　治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及瘧

疹遍身赤發[illegible]不明熱時行麻痘疹子[illegible]
渾身浮腫痰[illegible]嗽　或變急慢驚風手足搐搦眼[illegible]
自上觀及傷風[illegible]治之

滑石　地骨皮　赤芍藥
石膏　白茯苓　杏仁
知母　甘草　葶藶子炒
人參　麻黃[illegible]一兩

右爲末每服一錢麥門冬煎湯下如初生芽兒感冒風冷鼻塞身熱喘[illegible]一字用麥子煎湯調下一方去地骨皮[illegible]加羌活川芎薄荷煎湯調下

（方見幼科六[illegible]）

羌活散[illegible]　消毒飲[illegible]
大連翹湯[illegible]　通關散[illegible]

按水痘今小兒患之[illegible]率無害如無內證不必服藥無事生事也前後[illegible]方不爲輕劑非[illegible]其不解二便秘澀煩悶不寧不宜輕服

麻疹

麻疹浮小而有頭粒隨出即收不結膿疱北人謂之糠瘡南人謂之麩瘡吳人謂之痧越人謂之瘄古所謂麻出入氏所謂膚瘡是也與前所謂胖瘡疹者不同小兒有出一二次者出稀而日數少者名奶疹子出稠重而日數稍多者名正疹子又出於痘前者名奶疹子出於痘後者名正疹子初出亦與痘瘡相似但痘發於臟麻發於腑臟屬陰其病本深故難出難收而藥於溫平爲宜腑屬陽其病本淺故易出易收而藥於清涼爲宜　萬氏云[illegible]而麻瘇者少陽三焦火也腸道常飽故大而[illegible]小而碎皆火陰心火也陰道常乏故小而密三焦水穀之道路脾胃主納水穀治[illegible]以[illegible]爲主心肺爲陽而位乎上心火旺則肺受之麻疹專以肺爲主觀其咳嗽者火炎則肺葉焦舉也鼻流清涕者鼻爲肺之竅以火爍金而液自流也目中淚出肺熱則移於肝肝之竅在目也或手掐眉目唇鼻及面者肺熱證也　按既是心火刑肺金即見肺邪其證當重何反輕於痘余毋[illegible]痘疹但據見證以爲[illegible]散加減大劑投之即至危[illegible]之證無不愈者[illegible]寒降火辛涼發[illegible]而[illegible]

於危亡者不可勝數矣在其爲心火刑肺也 春溫
夏暑秋清冬寒此四時之正氣也冬應寒而反溫陽
氣暴泄火令早行人感之者至於來春必發瘡疹
出痘疹者必感而出[illegible]胎毒未有不由天行者故
一時傳染大小相似[illegible]疹症之出即宜先服三豆
湯代天宣化丸[illegible]以預解之 麻疹初出全
類傷風發熱咳嗽鼻塞[illegible]涕唾稠粘全見肺經之
證有不兼泄利者有[illegible]兼泄利者肺與大腸相
表裏[illegible]病也惜不可[illegible]冒風寒及於正蒸熱時
誤食能變輕爲重不可不慎 麻疹形證亦間有如
麻疹　一八　幼科六　頁四八
發風瘾疹[illegible]起如雲頭色赤成瘢隨見隨沒者有
如蚊[illegible]頭粒[illegible]俱見而不沒至三日後方收漸沒
者然皆謂之麻疹其於欲出未出之際當用發表之
藥發之則易出易收也 麻疹有發熱至十餘日始
見者大抵主在發散肺經之熱毒者始事也調理脾胃
於病後之元氣[illegible]終事也其間或兼風或挾痰[illegible]
食並隨宜加[illegible]之藥其有變證即隨病用對證之
藥要不亂投湯劑則兒無事矣 疹者清涼痘者溫
煖此法人皆知之然疹子初出亦須和煖則易出所
以發苗之初只要發出得盡則毒便解非若痘必苦

而秀秀而實[illegible]後毒解也痘子成實之時若大熱
則必潰爛不收是痘[illegible]亦當清涼也故治痘疹只
要無過熱無過寒溫涼適宜陰陽自和是爲得之
麻疹初發熱之初多似傷寒惟麻疹則咳嗽噴嚏
鼻流清涕眼胞腫其淚汪汪面浮腮赤或嘔惡或泄
利或手掐眉目鼻面與傷寒異耳輕者以葛根散合三
味消毒散主之重者以金沸草散主之兼泄利者合
用麻葛根湯以白芷代葛根此余創立治法用之無
不効者即十分危篤[illegible]每見諸書
所究方類皆苦寒辛涼[illegible]對證恐
麻疹　一八　幼科六　頁四九
有誅罰無過之失用者詳之 大抵疹欲出已出之
際雖寒勿用桂枝雖虛勿用參朮雖嘔而有痰勿用
半夏南星 大忌誤作傷寒妄汗妄下汗之則增其
熱爲衄爲欬血爲口瘡咽痛爲目赤痛爲煩躁爲
大小便不通下之則虛其裏爲滑泄爲滯下多至不
救慎之慎之 凡疹如手足稍微冷惡寒而無汗面色
青慘而不舒左額有青紋者傷寒之熱也手足稍微
溫發熱有汗面赤而光者傷風之熱也並宜僅得散
熱 發散之 目胞腫而右頰有青筋發熱而頭額痕
肚最甚或兼嘔吐腹痛者傷食之熱也備急丸

下之面色[illegible]紅鮮[illegible]中有紋手掌心有汗時作[illegible]
手絡脈微[illegible]消此爲熱也[illegible]半黃爲
心九[illegible]主之身[illegible]面色能食[illegible]紅頰赤大小便秘
脇下汗者此風熱也宜風[illegible]之[illegible]已上[illegible]熱久
不去內外感發則所蘊瘡疹之毒亦能乘間而出
矣　疹子只怕不能得出若出盡則無[illegible]治疹
[illegible]發熱之時當[illegible]令其暖以藥發之如時太寒
以桂枝葛根湯發之太熱以升麻葛根湯[illegible]合人
參白虎湯發之[illegible]不寒不熱以荊防敗毒散發之
[illegible]如[illegible]之[illegible]以人參敗毒散發之[illegible]如盡
[illegible]下出再作本湯發之外用胡荽酒[illegible]以苧麻
[illegible]之發令[illegible]出如三四作更不出加腹中
脹痛氣上喘促昏悶[illegible]者必死證也

爲白消[illegible]散

麥門冬　地骨皮[illegible]
牛蒡子[illegible]　荊芥穗[illegible]　桔梗
甘草[illegible]　浮萍[illegible]

右爲細末每服二五錢水一盞煎六分濾清服[illegible]

加味金沸草散

旋覆花[illegible]　麻黃[illegible]　前胡[illegible]

荊芥穗[illegible]　[illegible]甘草炙　半夏[illegible]
赤芍藥[illegible]　細辛[illegible]　浮萍[illegible]各七[illegible]

右爲末每服二三錢[illegible]薄荷葉三五片煎

防風解毒湯[illegible]

防風　薄荷　荊芥
石膏　知母　桔梗
甘草　牛蒡子　連翹
木通　枳殼　淡竹葉

黃連解毒湯[illegible]

防風　黃芩　黃連
荊芥穗　知母　石膏
黃檗[illegible]　梔子仁　大青
玄參　甘草　桔梗
木通

桂枝解毒湯[illegible]

桂枝　麻黃[illegible]　赤芍藥
防風　荊芥　羌活
甘草　桔梗　人參
川芎　牛蒡子　[illegible]

升麻解毒湯[illegible]

升麻　乾葛　荊芥穗
人參　柴胡　前胡
牛蒡子　枳殼　防風
羌活　赤芍藥　淡竹葉
連翹　甘草

一方雖曰因時制宜亦不可拘泥如冬月亦有不可用麻桂而宜石膏者正當以脈證為主耳若拘執而不知通變必有失不如用前二方之穩妥當也

發熱六七日以後明是疹子却不見出此皮膚堅厚腠理閉密又或為風寒襲之曾有吐利乃伏也急用

[illegible]　又名升六　百壹

托裏發表之劑麻黃湯調樫葉散發之外用胡荽酒

見形證麻黃湯刷之如一向未更衣者毒甚於裏伏而不出也以七物升麻湯之發之解之如不出者死證

紅

麻黃湯

麻黃去節蜜酒炒　升麻　牛蒡子炒
蟬殼洗去土　甘草各一
炒荊芥加石膏末一錢

右剉細加臘茶葉一錢水一盞煎七分去渣服

樫葉散

樫亦名西河柳亦名垂絲柳青茂時採葉陰乾為末每服一二錢茅根湯下

疹子初發熱時未見出現咳嗽百十聲不止上氣喘急面浮目腫時宜甘桔湯加白散三方合用內外用熱者多用熱如石膏末知母黃

合天花粉

疹子發熱或自汗出或衄血不須止之亦發散之義若衄則毒從汗散衄則毒從衄散但不可太過如汗太多人參白虎湯合黃連解毒湯或黃連湯主之衄太多玄參地黃湯主之茅花湯主之

[illegible]　又名升六　百壹

黃連湯

黃連　麥門冬　當歸
黃柏　黃芩　生地黃
黃耆

水煎去查調敗蒲扇灰服之

茅花湯

茅花　鬱金　生地黃
梔子仁　黃芩

水煎調百草霜服

疹子發熱吐利乃火邪內追純是熱證不可作寒論

上焦多吐宜黃芩湯加葛根蘆根枇杷葉
下焦多利宜黃芩湯送下香連丸　中焦吐利
俱多宜黃芩湯多加蘆根等根汁調六一散
自利甚則裏急後重而為滯下宜加味黃芩湯調六
一散　大抵疹家吐利滯下宜於疹家求之不可作
吐利滯下而治

加味黃芩湯

黃連　黃芩各一錢半　白芍藥各一錢
甘草七分　滑石末一錢

水煎服　若滑石不煎調服止於壹錢　血痢加
地榆貳錢

銅壁山人黃芩湯

黃芩　黃連　赤芍藥
生地黃　木通　枳殼
甘草　當歸梢　人參

水煎去查調天水散服之　初加酒大黃微利之
疹出之時咽喉腫痛者多毒火上熏而然勿作喉痺
治法妄用鍼刺喉痺作風痺故宜汎去惡血者
只是咽乾作痛宜甘桔湯加玄參牛蒡連翹或射干
鼠粘子湯細細嚥之餘代甘露飲一千　亦可外治

十全散　玉鎖匙點之

十全散

黃連　黃芩　黃柏各一
苦參　孩兒茶　雄黃各五
硼砂　玄明粉各一　乳香一分
片腦少許

共為極細末每用少許吹之
疹子渴者後水純是火邪熏灼乾心火內亢故也
初發熱渴者宜發散藥中多加石膏天花粉或葛
根麥門冬散　疹子出見渴者人參白虎湯加
天花粉麥門冬渴甚者白虎湯合黃連解毒湯主之

葛根麥門冬散

乾葛　麥門冬各一錢　石膏
升麻　赤芍藥　甘草
茯苓　人參各五分

右剉細加淡竹葉七片水一盞煎七分去查溫服

白虎合解毒湯

石膏　知母　天花粉
黃芩　黃連　山梔仁各一錢
生地黃　麥門冬各二錢

淡竹葉十片水二鍾煎一鍾更磨入犀角汁[illegible]
[illegible]水則與之　[illegible]以此方多與之胃
[illegible]而後消胃凉血
[illegible]人宜早為之所毋事
姑息
[illegible]瘄疹貴[illegible]一齊湧出謂
[illegible]麻疹只要得出便輕減以火照之遍身如塗朱
之狀此將出之狀出形細密與痘瘡者相似但疹
[illegible]出隨沒非若痘子之以漸長大也出形鮮紅與
[illegible]相似但疹[illegible]之皮紅成
[illegible]
片如蚊蚤之迹也
疹癍之色不可同論大抵痘子怕太紅皮嫩易破必
生痒疹疹子喜通紅疹發於心紅者火之正色也若
色淡白者心血不足養血化斑湯主之色太紅或
微紫者血熱也或出太甚者并宜大青湯主之黑者
死證也

養血化斑湯

當歸身　生地黄　紅花
蟬蛻　人參各等分

右剉細水一盞生薑[illegible]煎六分去查溫服無時

大青湯

大青　玄參　生地黄
石膏　知母　木通
甘草　地骨皮　荆芥穗各等分

右剉細水一盞淡竹葉十二片煎七分去查溫服

疹子出沒常以六時為準假如子後出者午時即收午後出者子時即收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之數也凡此旋出旋收者輕若一出連綿三四日不收者乃陽毒太甚宜大青湯解之殘恐不出者乃風外束皮膚閉密也宜荆防敗毒散主之[illegible]

疹疹非熱不出疹子欲出則遍身發熱或煩躁或頭眩或身拘急及既出則身便凉諸病悉解此一層疹子隨收矣如疹子既出熱甚不減此毒邪壅遏宜大青湯解其表使微者以[illegible]白虎湯解其裏大便不通者四順清凉飲主之[illegible]

加味地骨皮散　治疹已出熱不退飲食不進

地骨皮　桑白皮　麥門冬
銀柴胡　赤芍藥　乾葛各一
甘草　牛蒡子[illegible]

水煎調大小無比散五七分[illegible]亦治喘急不

凡疹子只要出得盡則毒邪解散正氣和平如拂拂
發熱煩悶不寧如蛇在灰如蚓在尖之狀此[illegible]或
泄瀉此爲邪氣遏鬱未出盡煩熱者黃連解毒湯[illegible]
喘嗽者柴胡橘皮湯並外用胡荽酒見形以苧麻
蘸酒遍身戛之待疹子出盡則煩熱自去喘嗽自止
矣俱可用大小無比散兼服

柴胡橘皮湯

柴胡　橘皮　黃芩
半夏　人參　白茯苓各等分

右剉細加竹茹一團生薑三片水一盞煎七分去
滓溫服不拘時

疹子欲出未出之時宜早發散以解其毒則無餘災
若不預解使之盡出以致毒蓄於中或爲壯熱日久
枯瘁或成驚癇或爲瀉痢或欬血喘促或作疳䘌而
死此雖一時戾氣之染未有不由於人事之未盡者

疹子收後身有微熱者此虛熱也不須施治待
氣血和暢自然退去若熱太甚或日久不減以柴胡
麥門冬散甚則以黃連解毒湯合人參白虎湯
與前方相間服之如髮枯毛竪肉消骨立漸漸
羸瘦者柴胡四物湯主之

疹子初出多忌不妨痊愈後最忌[illegible]此不可不謹
治者盡疹子發熱之日一二日少亦不下五七日
熱久元氣虛矣加之出之飲食不進而復重熱陰陽
枯竭不死何待故瘦弱者必大補氣血可也余見忽
以爲常而死者屢矣

柴胡麥門冬散

柴胡伍分　龍膽草叁分　麥門冬捌分
甘草二分　人參　玄參各等

右剉細水煎服

柴胡四物湯

柴胡　人參　黃芩
當歸身　川芎　生地黃
白芍藥　地骨皮　知母
麥門冬　淡竹葉

右剉細水一盞煎七分去滓溫服不拘時

疹後熱不除忽作搐者不可與急驚風同論用導赤
散加人參麥門冬送服安神丸[illegible]小便清者可
治短少者不可治

疹後牙齦黑爛肉腐血出臭息衝人者曰走馬疳

馬鳴散主之[illegible]若面頰浮腫環口青黑頰漏齒脫
唇崩鼻壞者死證也如穿口[illegible]其聲嘎啞者曰狐
惑以化䘌丸主之[illegible]更煩躁悶火聲者死證也
文蛤散 [illegible]入門可肉黑爛出血走馬疳證
雄黃[illegible] 五倍子二钱 枯礬[illegible]
蠶退紙一錢[illegible]
右細末米泔水洗淨以藥搽之
雄黃散 治同上
雄黃一钱 黃蘗二钱 麝香一分
先用艾湯淨先後搽藥
[illegible]疹退之後又咳嗽者此餘毒未盡也瀉白散合治
[illegible]氣喘連聲不住甚至飲食湯水俱
[illegible]此熱毒乘肺而然也宜門冬清肺湯加枇杷
[illegible]見血加茅根汁阿膠珠主之但見胸高如龜殼肩
[illegible]血出口鼻擺手摇頭面色或青或赤或白而
[illegible]者不可治也
門冬清肺湯
天門冬去心 麥門冬去心 知母
貝母 桔梗 款冬花
甘草 牛蒡子 杏仁去皮尖

馬兜苓 桑白皮 地骨皮[illegible]
右剉細水一盞煎七分去滓食後温服
疹出之時曾作瀉利未經清解乃疹退之後變為休
息痢不問赤白裏急後重日夜無度此餘毒在大腸
也以黃芩湯送下香連丸虛者加人參滑者加椿根
白皮俱於丸藥內加之勿入湯藥
疹子既收其毒不解邪火拂鬱渾身發熱晝夜不退
髮枯毛豎[illegible]清熱除疳丸主之若不早治
以致[illegible]手足厥逆微微發搐變為
慢風不救[illegible]
清熱除疳丸[illegible]
黃連 當歸各[illegible] 龍膽草
青皮 陳皮 蘆薈各五分
川芎 乾蟾頭一枚 使君子
共為末神麯糊為丸[illegible]
如渾身壯熱[illegible]多搐掣煩躁不寧此熱在
心脾二經也[illegible]當歸養血湯黃連安神丸間而服之
當歸養血湯
當歸 川芎 生地黃
麥門冬去心 木通 甘草

淡竹葉　山梔仁　[illegible]
便秘少加大黄
[illegible]安神丸
遠志　當歸　龍膽草各[illegible]
石菖蒲　茯神各五分　金箔[illegible]
共爲細末湯浸蒸餅杵豬心血丸黍米大硃砂爲衣燈草
湯下
[illegible]痘後完之後出入動止如常忽然心腹絞痛
[illegible]是元氣虚弱皆受疫癘之氣外雖無病裏
[illegible]所以一發而死也謂之中惡間有用人參湯
[illegible]
[illegible]蘇合香丸而更者[illegible]
禁忌痘疹家禁忌比痘家禁忌尤甚若誤食雞魚則終
身但遇天行之時又令重出也鹽醋食之令咳不止
五辛食之令生驚熱所以通禁必待四十九日之後
方無禁也　大熱未退不可與食與傷寒同[illegible]一發
之時既衰之後切勿風寒令水瓜菓之類如一犯之
則皮毛閉塞[illegible]黑而死矣如極渴欲
水只宜少與恐[illegible]必須使皮竅中常微
汗潤澤可也又忌[illegible]鮮之物恐惹瘡癢
[illegible]行[illegible]　六卷廿

幼科證治準繩集之七　金壇王肯堂宇泰甫輯

脾臟

錢氏主困　實則困睡身熱飲水　虚則吐瀉生風
脾[illegible]泄瀉不思飲食　脾胃虚寒則面晄白
目無精光口鼻氣冷肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食
[illegible]散下利用調中丸　傷風手足冷者脾臟怯
也先用益黄散補脾後用大青膏發散　脾病見西
[illegible]四臟治之[illegible]逆者難治　脾怯當
[illegible]
[illegible]相反[illegible]之　[illegible]脾主濕自病則
[illegible]雖[illegible]　後脾苦濕急食苦以燥之　實則
[illegible]之　虚則泄瀉色白
[illegible]不[illegible]上之　[illegible]邪[illegible]而嘔[illegible]
[illegible]之　[illegible]邪[illegible]
[illegible]甘草湯主之　[illegible]不大便[illegible]
[illegible]大黄[illegible]　[illegible]微邪[illegible]
[illegible]泄瀉[illegible]中丸之類[illegible]之　[illegible]必[illegible]
心兩臟之[illegible]根[illegible]之所[illegible]後[illegible]肝[illegible]
之鬼心是脾之母肝氣盛則[illegible]心氣衰則脾家生

氣不足設若抑之則退虧者益之不乏所以有抑脾氣益心氣兩藥以其脉肝心兩臟俱和則是脾自生又當審其虚實而治之　薛氏曰實者病氣實而形氣虚也若面色㿠白吐瀉腹痛口鼻氣冷屬寒水侮土宜用益黄散若面青發熱吐瀉手足並冷此脾土虚寒用益黄理中湯若面色痿黄手足不冷此脾土虚弱用人參理中湯若傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹此脾肺氣虚用五味異功散加防風升麻散外邪若發於寅卯之時用六君子湯加柴胡升麻佐脾土平肝木然面黄者脾之本色也面赤者火生土爲順面青者木剋土爲逆當平其所勝以補元氣爲善

治脾苦濕急食苦以燥之白朮　脾欲緩急食甘以緩之甘草　以甘補之人參　以苦瀉之黄連

脾虚以甘草大棗之類補之如無他證以錢氏益黄散補之虚則補其母心乃脾之母以炒鹽補心

益黄散　又名補脾散　治脾胃虚寒

陳橘皮一兩　青橘皮　訶子肉

甘草炙各半兩　丁香二錢

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分食前溫服

東垣云閻孝忠編集錢氏方以益黄散補土又云風木必克脾土當先實其脾昧者不審脾中寒熱一例用補脾藥又不審藥中有丁香青皮辛熱大瀉肺金脾虚之證豈可反瀉其子爲寒水反來侮土中寒嘔吐腹痛瀉痢青白口鼻中氣冷益黄散所治之藥也如因服熱藥巴豆之類過劑損其脾胃或因暑天傷熱積熱損其脾胃而成吐瀉口鼻中氣熱而成慢驚者不可服之今立一方治胃中熱瀉名人參安胃散　薛氏云脾土虚寒寒水侮之如東垣所云誠宜用此方若因脾土虚弱吐瀉者用六君子湯加柴胡如不應或手足俱冷屬虚寒也更加木香炮薑若因乳母脾虚肝侮必治以前藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾湯

人參安胃散　治脾胃虚熱

黄芪二錢　人參　陳皮去白各一錢

生甘草　炙甘草各半錢　白芍藥七分

白茯苓四分　黄連少許

右爲粗末每服二三錢水煎去渣溫服

六君子湯　六君子湯二方見吐瀉

瀉肺實以抑實瀉之如無他證以錢氏瀉黄散瀉之

則瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

瀉黃散 又名瀉脾散

藿香葉七錢 山梔子仁一兩 石膏半兩

甘草二兩 防風四兩去蘆

右剉同蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服清汁無時

若面赤若作渴飲冷因不食兩手足熱甚或遍身面黃脾胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯因而手足逆冷屬胃經虛熱宜用異功散若面青搐乳食少思肝乘脾也用秘旨補脾湯若面赤方見卷四驚悸身熱昏睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白咳嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若昏黑泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用七味白朮散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審其因而治其母

不乳食

經云胃為水穀之海六腑之大源也人身氣血臟腑俱由胃氣而生故東垣之法一以脾胃為主所謂補腎不若補脾正此意也在小兒純得乳食水穀之氣未全尤於胃氣胃氣一虛則四臟俱失所養矣故丹溪論小兒多肝脾之疾也若面色皖白無精光口中氣冷不食吐水脾胃虛寒之證用五味異功散或六君子湯主之若大便不實兼脾虛方見卷五也加益智溫之中滿不利脾不運也加木香開之喜冷便秘胃實熱也用[illegible]之命門火衰不能生土者用八味丸補之若[illegible]胃氣不足亦用此丸蓋下焦陽盛則上生脾元自能溫蒸水穀矣

平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脹痛口苦短氣惡心噯氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜臥體痛霍亂吐瀉等證

厚朴薑汁炒各一兩 陳皮 甘草炙各一兩

蒼朮米泔浸八兩

右為末每服二錢薑棗水煎沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟四時不正之氣

愚按前證若乳食停滯噯腐不欲嗅聞惡心者宜
服是方若飲食既消脾胃虛弱嘔吐惡心者則宜
四君子湯

温中丸　治脾胃虛寒

白朮　人參　甘草炙各等分

八味地黃丸即六味地黃丸加肉桂附子各一兩治
稟賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食
少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺等證內經
所謂益火之源以消陰翳正此藥也

錢氏益黃散一名補脾散　治脾胃虛寒吐瀉　方見[illegible]

愚按前方若脾土虛寒或寒水侮土而嘔吐泄瀉
手足並冷或痰涎上湧睡而露睛不思乳食者宜
用此方若脾土虛弱吐瀉者用六君子湯如不應
或手足俱冷者屬虛寒加木香炮薑肉荳蔻若脾
虛肝侮亦治以前散若乳母恚怒致兒患前症者
其母兼服八味逍遙湯

參苓白朮散　治脾胃虛弱飲食不進多困少氣中
滿痞噫嘔吐泄瀉此藥不寒不熱性味和平常服調
脾悅色順正辟邪

人參去蘆　白茯苓去皮　粉草[illegible]

白朮　白扁豆[illegible]　山藥[illegible]
縮砂仁　薏苡仁　桔梗[illegible]
蓮子肉去心

右為細末每服半錢至一錢用棗湯空心調服
或溫米湯亦可

啟脾飲　健脾養胃理嘔吐治瀉痢及諸病後氣色
虛弱有痰惡心腹中微痛飲食減少精神憔悴並宜服
之

厚朴[illegible]
人參[illegible]　白茯苓去皮　肉豆蔻[illegible]
半夏[illegible]　益智仁　淨香附
良薑[illegible]　訶子肉各二[illegible]　甘草炙[illegible]

右剉每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分無
時服

藿香飲　理虛化痰及治脾胃不和飲食少進正氣
除邪

人參去蘆　半夏[illegible]　赤茯苓去皮
甘草炙各一兩　蒼朮[illegible]
二兩　陳皮白　藿香去[illegible]
厚朴去粗皮[illegible]一兩半

右件㕮咀每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎
分[illegible]温服或入[illegible]同煎

治小兒脾胃怯弱飲食少進
用人參白术茯苓甘草等分爲末每服一錢陳米湯
點服一方加陳皮縮砂

治[illegible]吐逆吮乳不食
用人參壹錢丁香藿香葉各半錢水半盞煎熟入
乳汁少許煎服

治嬰孩吐逆手足心熱不進乳食
用[illegible]紅麴叁錢半白朮壹錢半麩炒甘草炙壹錢
[illegible]
爲末每服半錢淡炒米飲下

治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進
用厚朴薑製壹錢白朮半錢乾薑炮甘草炙各五
分水一盞煎[illegible]空心[illegible]服

治宿食傷脾[illegible]
用硇砂[illegible]錢[illegible]不[illegible]蓬莪茂各半兩木[illegible]
子[illegible]各[illegible]爲末麵糊丸如麻子大每服[illegible]白湯下
隨大小加減丸數

[illegible]先生匀氣散
桔梗[illegible] 甘草炙二[illegible] 白[illegible]

右件[illegible] [illegible] 茴香[illegible]
爲末每服一錢[illegible]水[illegible]煎湯調服紫蘇鹽湯亦[illegible]
得[illegible]

調理泉病醒脾散
木香 白朮[illegible] 人參
茯苓 草菓子 甘草炙
陳橘皮 厚朴[illegible] 紫蘇子
右等分爲末每一錢水六分盞[illegible]一片棗半箇煎四分
通口服

建脾散 治小兒胃氣[illegible]
白茯苓去皮 人參各一 厚朴[illegible]
蒼朮[illegible]一 陳橘皮[illegible] 甘草半[illegible]
草菓子[illegible]
右件爲末每服一錢薑棗同煎隨大小分減服

調中飲子 治小兒諸疾
肉荳蔻 白朮[illegible] 人參
陳橘皮去白 訶子[illegible] 茴香
甘草[illegible] 縮砂仁[illegible]各半 藿香
桂心 檳榔[illegible]各三[illegible]
右爲末每服半錢一錢用薑棗煎水隨兒大小 五

分用分[illegible]服
煎至[illegible]去滓[illegible]
方三稜 蓬莪茂 益智去皮
甘草炙 陳皮 青皮各二兩
右為末每服一錢不拘時[illegible]
治[illegible]後脾胃虛弱煩熱恍惚胸中多痰氣急煩亂渴
瀉脾胃消進飲食和氣消痰調和臟腑神术散
白术 人參 茯苓
石蓮肉去心 罌粟米 白扁豆
藿香 甘草炙
右[illegible]分細末[illegible]小錢紫蘇湯調空心日午服 白术
幼科十一 二十
平[illegible]治脾胃不和見食欲嘔心胸壅悶前胡散
前胡 蘆根各三分 [illegible]心一分
人參 白术 赤茯苓
枇杷葉去毛 甘草 厚朴各[illegible]
右為末每服一錢水一小盞煎至五分不拘時溫服
張渙集香煎 治脾胃虛不欲食羸瘦
藿香葉 厚朴 丁香
沉香 木香各一兩 白茯苓

白术 白芨半兩
右為細末入[illegible]水一升煎半斤大棗二十
枚薑二十片銀石器中慢火熬成膏去薑棗滓成
每服乾柿皂子大以粥米飲下
調中散 治小兒冷熱不調致脾胃不和
木香 人參去蘆 青橘皮湯浸去白焙
各一兩 丁香 白术
白茯苓 大腹皮 甘草
右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑二
片煎五分去滓溫服
又乳食 幼科七 二十七
[illegible]調冷熱和脾胃
當歸 木香 白术
沉香各一兩 白芍藥 人參去蘆頭
蓬莪茂 縮砂仁各半兩
右件搗羅為細末白麪糊和如黍米大每服拾粒
至拾伍粒煎麝香湯下量兒大小加減
丁香黃耆散 治小兒脾胃虛弱不能飲食已漸傷
損榮衛致令肌體瘦羸時時下痢面色青白
丁香 綿黃耆 人參去蘆頭
白术 當歸 鱉甲[illegible]各

胡黃連　甘草各一兩

右件搗羅爲細末每服半錢水一盞入生薑一片棗一枚同煎至五分去滓溫服錢前

人參抑黃丸　治胃氣不調不嗜食生肌肉

乾地黃　大黃各一兩　茯苓　人參

杏仁　柴胡　當歸各半兩

右爲末蜜丸如麻子每服五丸日三

又藥治二三七歲兒不食或嘔或頭熱或下利或渴或手脚熱有時冷每日一劑便能食

人參一兩　當歸　甘草炙

川芎各　椒去目

右切水一升煮八合爲三服相去人行六七里頃服畢兒身上蓋衣蓋取汗微汗勿深

脾參多困

丹溪云脾具坤靜之德而有乾健之運火胃陽也主氣脾陰也主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣清氣上升糟粕下降納五穀化津液其清者爲榮濁者爲衛陰陽得此謂之橐籥故東垣以脾胃爲五臟之根本也脾氣既弱則健運之令不行化生之功已失飢而嗜臥多困所由生焉法當溫補其脾脾胃則臟腑清陽之氣升舉易於運行又何困倦之有治臟用四君子加木香砂仁半夏白朮倍之蒼朮服之良法也若脾虛好睡多驚則是心血虛而火旺也宜安神養血若因心脾氣虛有痰者宜用人參五味子茯苓以補心氣當歸芍藥酸棗仁以養心血橘紅半夏以開痰若因脾胃氣虛脈微有痰用補中益氣湯以健脾胃膠星牛黃丸以化痰涎若因飲食停滯而作用四君子湯以益脾土山查神麯以消飲食若因脾虛而好睡用六味異功散以補脾氣當歸芍藥以生脾血芍藥須用酒拌炒黃不用酸寒傷脾也服後以時候寒也若乳母飲酒致兒昏醉好睡者以乾葛陳皮煎湯解之不應用異功散

加減四君子湯矣

脾藏脾胃不和四君子加白术一倍薑棗煎　脾風

四君子加木香砂仁人參各半錢煎　脾胃虛弱生

痰多用四君子加炒半夏麴汲不子等分為末入冬

瓜子少許同煎

人參散　治脾風多困用人參散人慢驚參用

人參　冬瓜仁各半兩　南星切片用漿水煮

右為細末每一錢水半盞煎二三分溫服

痰涎

凡小兒多涎者風熱壅脾積聚成涎即乳食不下涎

休積貫而生壯熱　小兒多涎由脾氣不足不能四

布津液而成若不治其本益中氣而徒去其痰涎痰

涎雖病液亦元氣所附去之不已遂成虛脫余見驚

搐用熱等藥觸以下痰小見功効服下之而致夭亡

者屢矣　錢氏治朱監簿子五歲夜發熱睡如故醫

以鐵粉丸下涎病益甚至五日大引飲錢取白术散

末一兩煎三升任意服朱疑其瀉錢曰纔瀉勿服

但不可下耳止瀉治痰退熱清神皆此藥也又煎三

升服稍盡愈第三日又服三升不渴無涎投阿膠散

二服安

半夏丸　治痰涎若驚搐後風涎潮作服之神効

半夏生用二兩　赤茯苓去皮　枳殼麩炒各一兩

風化朴硝二錢

右前三味為末入朴硝同研勻用生薑

自然汁糊和米粉為丸菉豆大每服二三十丸至五

十丸以淡薑湯和食後臨臥送下兒小煮丸如粟

白附丸 通治小兒咳嗽有痰感冒發熱吐瀉心神
不安神効
南星一兩 半夏 白附子
白礬各一兩
右為細末薑汁糊丸如桐子大一歲兒服八丸用
薄荷湯化下南星半夏用冬月水浸六月夏月浸三日浸起曬乾又為末丸方用
天竺丸 治小兒痰涎上壅喘嗽不休
天南星一兩 半夏湯泡去皮薑汁製 白附子湯泡去皮臍各
天竺黃三錢 天麻
防風各二錢 辰砂研水飛另
右為末甘草膏為丸芡實大每服一丸空心薄荷
湯/淡薑湯化下
牛蒡子散 治小兒心脾壅熱多涎
牛蒡子 梔子仁 甘草
川硝 鬱金各五錢 枳殼麩炒去穰各
右件藥搗細羅為散入龍腦半錢同研令勻不計
時候用薄荷水調下半錢量兒大小加減服之
鬱金散 治小兒風熱鎮心壓涎
鬱金一兩用皂角二挺接水一碗煮乾用水淨洗切
天竺黃 馬牙硝 甘草炙各半兩

朱砂研一分 龍腦研少許
右件藥搗羅為末都研令勻每服半錢用麥門冬
熟水調下量兒大小以意加減服
小朱砂丸 治小兒眠睡多驚化風壅痰涎安神
朱砂一兩研 天南星牛膽內製者 人參
茯苓 珍珠研 半夏生薑半兩以水煮一二百沸取出焙乾各焙末半兩
麝香各少許 龍腦
右件同研勻以水浸蒸餅為丸如黍米大每服四
五丸不計時候煎金銀湯下
劉氏滾涎 治小兒多涎乳食不下涎不流出者乃名脾熱
多涎宜金朱丹
朱砂水飛細研 半夏湯洗七遍 牛膽南星各一兩
白茯苓三兩 石膏半兩研水飛細 金箔二十片
右件都拌勻再細研用生薑自然汁和如黍米大
每服十粒煎人參湯下乳後
譚氏金珠丸 治小兒驚悸心忪化涎痰利胸膈煩
熱止欬嗽
天南星湯洗 白礬 半夏湯洗
朱砂細研各半兩 人參 乾山藥各二錢

膩粉一錢　金箔十片

右為細末薄荷汁同水打糊為丸如菉豆大金箔為衣每服一丸食後生薑湯下量力服

半夏丸　治小兒脾熱乳食不下胸膈多涎

半夏半兩生薑汁浸湯洗七遍去滑　皂角子仁半兩

右件藥搗羅為末用生薑汁和丸如麻子大不計時候以溫水下三丸隨兒大小以意加減

劉氏消乳痰丸　此方出禁中小兒無痰亦宜常服

大半夏半兩切作兩片子大用薑一箇亦切作頭子大用水一椀煮水盡為度不用薑　荷　人參末二錢半

右二味焙乾同為細末生薑自然汁煮糊為丸如菉豆大每服二十丸或三十丸生薑湯下食後服看兒大小加減

吐瀉

夫小兒吐瀉所作即名霍亂有心痛而先吐者有腹痛而先瀉者其不由中焦而作上焦主納而不出中焦主腐化水穀而生榮衛灌溉百骸下焦分別水穀主出而不納脾居中州胃為水穀之海乳哺入胃脾能剋化然後水穀分[illegible]變得宜豈有吐瀉之患凡小兒吐瀉皆因六氣未完六淫易侵兼以調護失宜乳食不節遂使脾胃虛弱清濁相干蘊作而然有先瀉而後吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水吐亦不多口氣緩而神色慢額前有汗六脉沉濡此為冷也先吐而後瀉者乃脾胃有熱氣促唇紅吐來面赤脉紅而數渴飲水漿此為熱也冷熱之分要須詳審　夏吐瀉昏睡露睛者胃虛熱錢氏白术散和中散主之　吐瀉昏睡不露睛者胃實熱錢氏玉露散河間益元散主之　薛按前證若脾氣虛寒也用異功散加木香　傷風吐瀉者風木剋脾土也亦用前藥　若飲熱乳而瀉黃者濕熱壅滯也用四苓散如不癒或反甚者元氣復傷也用白术散　瀉而腹中重墜者脾氣下陷也用補中益氣湯若服過劑

之劑面脫中滿後若脾氣虛病也用六君子湯 若
四黃湯脾虛而肝乘之也用六君柴胡升麻木香
若多啼為心脾虧損也用六君炮薑升麻 生
下半月每日內吐者乃宜調治其母恐嬰兒臟腑脆
弱不勝藥餌故也

傷風吐瀉錢小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食
大便乳食不消或白色是傷寒當下之併和胃下用
下餅子 和胃用益黃散 脾主之
兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便
青白色乳食不消此上實下虛也更有五臟兼見證
二十
肺睡露喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饒睡
肝呵欠煩悶 腎不語畏明 當先視兒兼臟證先
瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二證
多病於夜見也
五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱盛也小兒臟腑十
分中九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露
散主之

玉露散方 一名甘露散
寒水石 半兩軟而微青黑中有細紋者 生甘草 二錢
石膏 半兩堅白而有牆壁手不可折者良

右同為細末每服一字或五分一錢食後溫湯調
下 滿悶六月胃熱大渴者不宜服此
六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四
分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不
食乳食前少服益黃散食後多服玉露散 廣親宮
五太尉病吐瀉不止米穀不化眾醫用溫藥一日而
加喘吐不定錢氏曰當以涼藥治之所以然者謂傷
熱在內也用石膏湯三服并服之眾醫皆言吐瀉多
而米穀又不化當補脾何以用涼藥王信眾醫皆用
補脾丁香散三服錢氏後至曰不可服此三日後必
腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所以然者謂
六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大吐瀉
也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當死
眾醫不能治復召錢至見其熱證以白虎湯三服
更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與
白虎湯各二服四日用石膏湯一服及旋合麥門冬
黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂為衣服五丸竹
葉湯化下熱退而安
七月立秋後吐瀉身溫臟腑中三分熱七分冷也不

吐瀉乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛啼白多[illegible]
[illegible]多服益黃散食後少服玉露散
康親七太尉七歲病吐瀉是時七月其證全不食
而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾嘔大便或有或無不渴
衆醫作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與史
君子丸補脾石膏湯退熱次日又以水銀硫黃末
研和以薑水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分下
而一分補八月內九分補而一分下此者是脾虛瀉
醫妄治之至於虛損下之即死即當補脾若以史君
子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何
[illegible]　二十三
食而嘔錢曰脾虛津少即嘔逆曰何爲青褐水曰腸
胃至虛冷極故也錢治而愈
入月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉
[illegible]當補脾益黃散主之不可下也
[illegible]小兒感暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐
[illegible]必渴用玉露散餘吐時熱與冷之過三日必愈
[illegible]身熱脈大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫
服之　如身涼脈細小便利早服益黃散下後玉露
散　如過四五日困弱宜異功散和中散用胃苓丸
瀉如有風而瀉用防風芍藥湯[illegible]　有熱
而瀉用黃連黃芩大黃[illegible]　有寒而瀉用
附子[illegible]　有濕而瀉用白朮茯苓
[illegible]　有肺病而瀉用芍藥桂心定
喘參冬人參其者多[illegible]大便不通加大黃[illegible]
更詳其病新舊新則止之久則有腸風之患
[illegible]
宜推陳致新法當宜風散[illegible]導過後用入藏君臣
藥調之宜益黃散
[illegible]有小兒盛夏初秋遇夜乘風渴而飲水過餐生冷
果物攻激腸胃遂乃暴吐暴瀉傳作手足俱痺筋攣
[illegible]痛則神志不寧以驚搐治之誤矣所謂筋遇寒
[illegible]　二十三
則引縮又以陽明養宗筋屬胃與大腸因內傷生冷
飲食外感風邪吐瀉交作胃氣因虛不能養其宗筋
亦致拘急此證口氣溫面色慘脈沉緩再以手按兩
膝膕下見筋縮而引於皮間是其候也治以理中湯
加附子半生半炮水薑煎熟空心溫服更詳其虛實冷
熱爲治可也　有數歲小兒忽患吐瀉始[illegible]夏秋晝
近極熱之地解衣乘涼夜間當風之所致[illegible]先感熱
後感冷陰陽相搏氣射中焦名爲霍亂活人書用香
薷散湯治以其能分別水穀升降陰陽又曰熱多欲
飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸詳此治法得

非飲乎中焦乎　蓋凡暑令吐瀉手足指熱作渴飲冷者屬陽證宜清涼之劑手足指冷作渴飲熱者屬陰證宜溫補之劑凡病屬陰證誤用寒涼者死則手足青黯或偏身皆然

香薷飲　治夏秋臟腑冷熱不調飲食不節吐痢心腹疼痛發熱煩

香薷三兩　白扁豆　厚朴各一兩半

生甘草二兩

右剉每服二錢水一盞煎服

車前子散　治暑月霍乱吐瀉煩悶引飲不止小便不利

白茯苓　豬苓　香薷

車前子炒　人參各等分

右為末燈心湯調下

不換金正氣散　治脾胃不和寒熱往來臟腑虛熱霍亂吐瀉

厚朴薑製　藿香　陳皮

半夏　蒼朮米泔　甘草炒各等分

右每服二三錢薑棗水煎服

二順散　治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便血肚疼

豬苓　澤瀉　茯苓

白朮　甘草炙　官桂

乾薑　杏仁各一兩去皮尖麩炒

右為末每服半錢不拘時水調下或水煎服

六和湯　治心脾不和氣不升降霍亂吐瀉咳嗽胸滿頭目疼痛嗜卧倦怠并陰陽不分冒暑伏熱煩悶成痢中酒作渴心逆畏食

人參去蘆　縮砂仁　甘草炙

杏仁泡去皮尖　半夏湯泡透剉焙乾各一兩　白扁豆炒

藿香　（斤碎切焙拌勻藊經一宿焙乾）

赤茯苓去皮　木瓜各二兩　香薷

厚朴去麄皮薑製火焙乾各肆兩

右每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分無時溫服或入鹽半字同煎

傷風吐瀉　錢傷風吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣麤大便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五臟兼見證當煎入臟君臣藥先服大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下此乃脾肺受寒不能入脾也

按云吐瀉咳嗽是風木入於脾母虛其子亦弱法當[illegible]

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止此痰大便
水此發胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其瀉
止後用發散藥止瀉多服白术散發散大青膏主之
潔古云吐瀉身熱而渴小便少者五苓散主之身熱而睡者當服白术散發散煎防風木香湯下大青膏
傷風吐瀉身凉吐沫瀉青白色悶亂不渴哽氣長出
氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發
散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病於春
冬也潔古云身凉吐瀉不渴者則加[illegible]寒煎附子桂枝湯下大青膏

大青膏

天麻末一分　白附子末生一錢半　蝎尾去毒生半錢
朱砂一字[illegible]　青黛一錢　麝香一字
烏梢蛇肉酒浸焙乾取末半錢　天竺黃一錢

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服之

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以凉藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾氣積虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間風風退則痢止宜風散主之後用史君子丸補其胃

亦有諸吐痢久不差者則脾虛生風而成慢驚矣
瀉吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減半生薑煎服

守胃散　治陰陽不和吐瀉不止預防風證常調脾胃進飲食

人參去蘆　白术　白茯苓去皮
山藥去黑皮　乾葛　扁豆炒
南星剉碎用器盛東壁土同炒少時漉出去土切片焙　甘草
藿香去梗　防風去蘆　天麻各半兩

右剉每服二錢水一鍾薑二片冬瓜子仁五十粒煎七分空心溫服如瀉不止入沉香白豆蔻同煎

鉤藤飲　治吐利脾胃氣虛生風

鉤藤鉤二分　蟬殼　天麻
防風　蝎尾去毒　人參各半兩
麻黃　殭蠶炒　甘草炙
川芎各二錢五分　麝香五分

右為末水煎服寒多加附子壹錢

身熱吐瀉[illegible]曾氏云先吐而後瀉者乃脾胃有熱氣促唇紅吐來面赤脈洪而數渴飲水

辨此為熱也錢氏以吐瀉身熱瀉黃多渴作熱病治
在夏秋用玉露散益黃散相間服在春冬用白朮散
大青膏相間服
錢氏玉露散方見前
李閣中治夏秋吐瀉
好黃連壹兩入銚丹壹兩炒丹焦爲細末麪糊丸
如芥子大服一二十丸生薑湯吞更量數服不妨
丹溪治小兒胃寒吐乳腹瀉
白朮 滑石末各三 乾薑一分
陳皮 甘草炙各一分
右為麤末煎服

辨吐瀉不渴爲寒宜溫藥 曾氏云先瀉而後吐者
為脾胃虛冷其候先瀉白水或白凍吐亦不多口氣
緩而神色慢額前有汗六脈沉濡此為冷也錢氏以
吐瀉身涼瀉青不渴作寒病治在秋以益黃散主之在
冬春以益黃散大青膏相間服
溫吐利四肢厥逆脾門低陷四君子加藿香丁香芍
藥等分煎服
錢氏益黃散見脾 溫胃安神見吐
溫和胃丸 治吐瀉不止欲生慢驚
丁香 白朮各一兩 半夏
藿香 [illegible]各一錢
右為末薑汁打糊為丸如小豆大一二歲兒三十丸
薑湯下
理中湯 主溫脾煖胃冷吐冷瀉及胎氣虛中寒腹
痛
人參去蘆 白朮各一兩 乾薑炮
粉草炙各二
右剉焙為末每服半錢或一錢用溫白湯空心
調服

五九

理中丸 治吐利不止米穀不化手足厥冷
人參 白朮 乾薑
甘草炙各等分
右為末煉蜜為丸如菉豆大每服十丸米飲下或一
二十丸不拘時候
金液丹 治吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏
寒多睡露睛[illegible]漸成慢驚又治大人陽
虛陰盛身冷脈微自汗吐利小便不禁
舶上硫黃[illegible]
[illegible]

人參去蘆　木香　乾葛

厚朴薑製炙　藿香各半

右為細末每服一錢水一小盞薑二片煎六分溫服

王氏治吐逆兼吐利不止

丁香　藿香各一分　木香一錢

硫黃半兩別研　滑石二錢研

右為末每服一錢或半錢米飲調下量大小與之

如瀉即用附子當枚重半兩者炮去皮臍為末再

用生薑汁搗成餅子用白麪裹之慢火煨麪熟去

麪不用只用附子切焙再搗羅為末每吐兼瀉即

入附子末少許如藥三之一更量虛實以米飲調

下神驗如瀉水者亦定吐利不止多成慢驚宜

速[illegible]之如已成慢驚兼金液丹與之

助胃膏　治脾胃虛寒吐瀉等證

人參　白朮　白茯苓

甘草炙　丁香各五錢　砂仁四十箇

木香三錢　白荳蔻十四箇　乾山藥一兩

肉荳蔻四箇煨

右為末蜜丸芡實大每服一丸米飲化下

[illegible]錢氏治法在夏秋

[illegible]

右以[illegible]丸[illegible]為末每服一錢生薑米飲調

下多服取效大人[illegible]兩水浸去木

餅和丸如桐子大每服五十丸至百丸米飲空

心下

閻氏云吐瀉虛極當速生胃氣宜與理中丸併研

金液丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效俟胃

氣已生手足漸熱然猶瘈瘲即減金液丹一二分

增青州白丸子一二分同研如上服兼用異功散

羌活散溫白丸鉤藤飲子之類仍頻與粥雖至危

者往往死中得生十救八九沈存中論金液丹見

小兒吐利劇氣已絶服之得活者數人須多服方

效

荳蔻散　治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黃　滑石五分　丁香

荳蔻各半分

右為細末每服一字至半錢米飲調下無時

溫胃散　治三焦不調停寒膈上乳哺不消胸

膈痞滿甚則喘逆吐利肌體痿黃

甘草炙一　藿香　白荳蔻

用玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大要
相間服

錢氏四君子湯　治脾氣虛損吐瀉少食

人參　白朮　茯苓
甘草各等分

右每服二錢薑棗水煎

六君子湯即四君子加陳皮半夏治脾胃氣虛吐瀉不食肌肉消瘦或肺虛痰嗽喘促惡寒或肝虛驚搐目眩自汗諸證並宜服之以滋化源

錢氏異功散　溫中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷病先與數服以正其氣

人參　茯苓　白朮
甘草　陳皮各等分　一方加木香

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗二枚同煎[illegible]

愚按前方[illegible]治吐瀉不食或驚搐痰嗽或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有證致兒患此者子母並服之

和劑觀音散　治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸至羸瘦大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛則吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進美飲食

石蓮肉去心　人參　神麴炒各
茯苓二錢　甘草炙　木香
綿黃耆炙　白扁豆炒去皮　白朮各一錢

右剉散每服二錢水一盞棗一枚藿香三葉煎溫服

溫中丸　治小兒瀉白胃寒故也腹痛腸鳴吐酸水不思飲食霍亂吐瀉

人參　白朮　甘草各等分

右為末薑汁麵糊丸如黍米大米飲下二三十丸無時

和中散　和胃止吐瀉定煩渴治腹痛

人參　茯苓　白朮
甘草炙　乾葛　黃耆炙
白扁豆炒　藿香葉各等分

右為細末每服三錢水一盞棗二枚去核生薑五片煎八分食前溫服[illegible]

曾氏和中散　治[illegible]吐久病[illegible]清爽神昏氣弱

脾胃不和飲食所傷生冷飲生痰留滯中脘嘔噦
氣或吐瀉泄瀉腸鳴日漸羸瘦不能消化宿食服和胃

和胃氣進飲食悅顏色理風痰

人參去蘆 白扁豆去皮炒 白茯苓去皮各一
川芎 縮砂仁 半夏麯
香附子 甘草炙各 肉豆蔻
訶子去核各 木香各半

右剉每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空
心溫服或不拘時

治胃氣不和吐瀉不止痰逆不食平胃引行諸

[illegible]白散

半夏一兩湯洗七次 白扁豆炒
罌粟米 人參 白朮
白茯苓 山藥各

右為細末每服二錢水八分盞薑二片棗一枚煎
分溫服

[illegible]人參安胃散 治脾胃虛熱

胃苓湯 治脾胃受濕嘔吐泄瀉

白朮 茯苓 澤瀉
厚朴 豬苓 陳皮

甘草各等分炒 桂少許

右為末每服二錢薑水煎心陳皮煎湯調下若
食吐瀉小便短少腹脹作痛用此以分利之更用
六君子湯以調補脾胃

[illegible]半粟散 治小兒脾胃虛寒吐瀉等疾及治寒
痰

半夏湯泡七次切炒 陳粟米各三分

右㕮咀每服二錢水一大盞生薑十片同煎至
八分食前溫服

白附丸 [illegible]

[illegible] 宿食錢氏云吐乳不化傷食也宜下之漸承務子
五歲吐瀉壯熱不思飲食錢氏見目中黑睛少而白
睛多面色㿠白曰此子必多病面色㿠白者神怯也
黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱
長成必肥瘦不壯不奈寒暑易虛易實脾胃亦怯更
不可縱恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精
神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷
食也又虛怯不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入
脾則瀉入腎則益虛但宜以消積丸磨化之爲微有
食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在上亦

可下也下畢補脾必[illegible]其[illegible]守不必[illegible] 錢
氏曰吐乳瀉黃是傷熱乳吐乳瀉青是傷冷乳皆當
下之此迎而奪之之法也不若傷熱者用五苓散以導其
濕傷冷者用理中湯以溫其中自然平復　脾經積
滯未除再為飲食所傷不吐則瀉不瀉則吐宜以三
稜散化積守胃散和中
治小兒吐瀉黃疸
三稜　蓬朮　陳皮
青皮　神麴　麥芽
黃連　甘草　白朮
[illegible]
茯苓
右為細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山查
時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷
消積丸　治小兒吐瀉大便酸臭
丁香 九個　砂仁 十二個　巴豆 二粒去油
烏梅肉 二個
右為末麵糊丸黍米大三五丸溫水送下
[illegible]少 五苓散治虛熱而渴 不除
白朮散治虛熱而渴 方見
[illegible]患消渴不止

[illegible]　[illegible]豆蔻 各半　人參 一兩
右細剉分六服每水一小盞煎五分不時量分稍
熱服
張渙[illegible]散　治吐利津液燥少
白茯苓 一兩　烏梅肉 炒乾　乾木瓜
各等分為細末一錢水一小盞煎五分溫時時服
治霍亂煩渴香豆散
藿香　肉豆蔻 各一兩　白扁豆
人參 各半兩　甘草 炙一分
為末每一錢水八分盞薑二片煎四分溫服
[illegible]時發人參散　治虛熱及吐利煩渴疎轉後服
人參　茯苓　桔梗
乾葛 各半兩　犀角　甘草 炙各一分
右為末每服一錢水一小盞燈心煎五分頻頻溫服
[illegible]前服
[illegible]凡冷熱不調乳哺不節使陰陽清濁之
氣相干而變亂腸胃間則成霍亂而心腹痛者冷氣
與真氣相搏或上攻心下攻腹故痛
外臺療霍亂心腹[illegible]痛吐利
茯苓　桔梗　人參 各[illegible]分

白朮伍分　甘草炙　厚朴四分

右㕮咀用水二升煮六合溫服

人參散　治霍亂心腹痛不食

人參　白朮　黃耆

草豆蔻　厚朴薑炙　當歸炒

陳皮去白　丁香　桂心各一分

右搗羅為散不拘時候粟米飲調半錢服

治霍亂乳食不消腹心滿痛

訶梨勒皮半兩　木香　當歸炒

白朮　藿香　陳皮去白各一分

右為末不拘時薑湯調半錢服

[illegible]散　治霍亂吐瀉腹痛

丁香　桂心各一分　人參去蘆

甘草炙各半兩

右為末每服一錢水一小盞薑少許煎五分不計時候量兒大小分減溫服

鄭氏云小兒吐瀉皆由外感風冷內傷乳食或兒本[illegible]定氣息未調以乳餵之氣逆於上則停滯胸膈致令嘔吐氣逆於下則停留胃[illegible]令泄瀉上下氣逆吐瀉俱作凡小兒只吐不瀉者逆其吐必有痰發驚者十無一生若只瀉不吐或[illegible]久不止變陰癇治之當暫斷其乳[illegible]煩稀粥服藥速效十全八九或者不信[illegible]兒藉乳為命不肯暫斷[illegible]不可斷也殊不知因乳所傷得之者若再以所傷之乳乳之如抱薪救火藥何功之有其間有不斷服藥得效者[illegible]也亦有因輕致重大損者多矣　活幼心書云小兒吐瀉不止大要節乳徐徐用藥調治必效節者撙節之義一日但三次或五次每以乳時不可過飽其[illegible]自減及間以稀粥投之亦能和胃屢見不明其理[illegible]

藥以求速效[illegible]斷乳三四日後使其腸胃虛弱[illegible]不已反激他證[illegible]斷其乳然乳即[illegible]之醫者切須知此[illegible]亦宜服和氣血調脾胃等藥[illegible]不若兒大能食[illegible]之待其平復兒亦不[illegible]飲食者但節之可也

吐

嘔吐皆主脾胃古人謂脾虛則嘔胃虛則吐是也[illegible]者有聲無物叫者有物無聲者手足指發冷喜飲熱[illegible]睡而露睛皆胃氣虛弱也用異功散若手足指熱喜飲冷或睡不露睛爲胃有實熱也用瀉黃散若作[illegible]水食或小便色赤[illegible]熱也用七味白朮散大[illegible]嬰兒有乳母尤當節飲食若乳母停食亦能致兒吐[illegible]不可不慎也 [illegible]論吐之原難以枚舉有冷[illegible]積吐傷風嗽吐傷乳吐其吐則同其證有異[illegible]

▶幼科[illegible] 吐

[illegible]乳食後 冷吐乳片不消多吐而少出脈息沉微面白眼慢氣緩神昏額上汗出此因風寒入胃或食生冷或傷宿乳胃虛不納而出宜溫胃去風除宿冷用當歸散木香藿香陳皮煎服或用理中[illegible]和飲理中湯及薑橘湯定吐飲如諸藥不[illegible]以[illegible]香飲治之 熱吐面赤唇紅吐次少而出多乳片已消而色黃遍體熱甚或因暑氣在胃或食物將精神不慢而多煩躁此熱吐也宜解熱[illegible]用[illegible]飲漏熱不[illegible]心胸下五苓散小柴胡湯並加竹茹煎服及香薷散主之又服熱[illegible]先投[illegible]飲解之次服止吐之劑 積吐服胞

浮面微黃足冷用熱劑輕夜重少者脈沉緩此[illegible]冷滯脾故吐黃酸水或有清痰脈實而滑爲食積所傷吐酸酸氣或宿食併出兒小者嘅乳不化是也先用五苓散薑汁湯調下和脾次以烏犀丸主之最小者投三稜散化癖丸 傷風嗽吐有熱生風有風生痰痰結胸中肺氣不順連嗽不止和痰吐出此爲嗽吐痰壅而作乃爲實證宜去風化痰先投清肺飲次小柴胡湯爲治若嗽久而肺虛土不生金故面白唇燥乾嗽乾嘔而無痰可溫補爲上用茯苓厚朴湯惺惺散如意膏爲治 傷乳吐纔乳哺後即吐或少

吐 ▶幼科[illegible] 四二

停而吐此因乳飲無度脾氣弱不能運化故有此證譬如小器盛物滿則溢治法宜節乳投三稜散 此外又有風痰吐乃是傷風不解吐乳夾痰者多時必要生風宜服青州白丸子半夏散疎風下痰之劑皆可服之 毒氣吐[illegible]氏病源 投黃[illegible]湯[illegible]丹之類 痢[illegible]不止方 凡有[illegible]吐不止者伏龍肝細末[illegible]錢[illegible]米飲煎湯調下立止或用白荷[illegible]下亦好若白扁豆嫩苗煎亦好

[illegible]小兒嘔吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷入乳變敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去

傷宿乳宜服理中湯次用消乳法其飲是寒凝
夾乳吐出也凡有此候服藥不効胃氣將絶難療不
能下當服[illegible]砂丸如大便[illegible]宜[illegible]後升二粟當用驗
寒吐之症面目脹額汗出脉沉遲微寒氣停於
胃故胃不納而吐出也嘔逆者由胃氣虚甚過服尅
伐之藥氣不升濁氣不降以致氣不宣通而作也風
寒在胃者用理中丸胃氣虚者六君子湯風寒所致
宜先去敗乳急服理中丸次服消乳法若嘔吐清
涎夾乳小便清利用大安丸若因乳母食厚味肥聚
上滿胃散若乳母飲醉酒用葛花解酲湯飲焼酒歷
冷米醋三五杯乳母食生冷而致者用五味異功散
乳母停食者母服大安丸子服異功散乳母勞役者
子母俱服補中益氣湯乳母怒動肝火者用加味逍
遥散乳母鬱怒傷脾者用歸脾湯乳母脾虚血弱者
用六君芎歸其子亦服一二五滴氣血虚而乳熱者子
母俱服八珍散仍[illegible]以[illegible]藿亂治之

[illegible]安胃 治小兒脾胃虚弱腹中[illegible]痛[illegible]痰食積
泄瀉常服消痰去濕[illegible]胃氣和中[illegible]氣滯

人參 一　厚朴薑製　陳皮
青皮　肉桂去皮不用　乾薑炮各一

木香　沉香[illegible]　藿香
甘草各[illegible]　史君子[illegible]　澤瀉[illegible]不用

右為末煉蜜丸如芡實大食前米飲化下如熱滿
[illegible]湯下　一方無木香沉香藿香青皮四君子有
白术茯苓豬苓

[illegible]沉丹 治小兒嘔吐不止

朱砂二錢　沉香　藿香三錢
滑石半兩　丁香[illegible]

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油滴成
花子抄藥在上須臾墜下去水却用別水空心送
下

定吐紫金核 治小兒一切嘔吐不止

半夏湯洗七次薑製　人參　白术
木香　丁香　藿香各二錢半

右為細末稀麵糊為丸如李核大後用沉香一錢
朱砂末一錢研勻為衣陰乾每服
一丸用小棗一枚去核納藥在內濕紙裹燒熟嚼
與小兒服後以米飲壓之

香銀丸 治吐

丁香　乾葛各一　半夏湯泡切焙

水銀各半

右上三味同爲細末將水銀與藥研勻生薑汁少如麻子大每服一二丸至五七丸煎金銀花湯下無時

本事白术散　治小兒吐嘔脉遲細有寒

白术　人參　半夏麯各二

茯苓　乾薑　甘草炙各一

右爲末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去查溫服日二三服一方無半夏麯有木香藿香

溫橘湯　治脾胃冷嘔吐不止

白薑二兩炮　陳橘皮一兩去白　粉草炙三兩

右件剉爲末每服半錢或一錢用溫棗湯調化空心少與緩服

定吐飲　治吐逆投諸藥不止用此神效

半夏湯洗七遍去滑切作如粟米大一兩　生薑乾淨和皮二兩

薄桂削去粗皮

右件粗切作小方塊如豆大同前半夏和勻入小鐺內慢火煅令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以皮紙攤盛地上出火毒候冷略搖去黑焦末每服二錢水一盞薑三片煎七分稍空心少與緩服

參香飲　治胃虛作吐投諸藥不止

人參去蘆一兩　沉香　丁香

藿香去土一兩　南木香各一分

右剉每服二錢水一盞煎七分去滓臨入薑汁少許作三次空心溫服

熱吐　小兒秋夏伏暑多有熱吐此由暑邪頭額溫五心熱小便或赤而少乃熱吐也是以嘔而無物宜香薷飲　翻小兒熱吐者因多食甘肥炙煿之物或乳母喜啖厚味胃經積熱或夏間暑氣內伏於胃所致者肌肉瞤動煩熱作渴者暑傷胃氣也先用香薷散次用竹茹湯若吐乳色黃不能受納者胃經有熱也先用瀉黃散次用人參安胃散若吐出酸穢者乳食內停也用保和丸吐止不行者胃氣弱也用異功散吐而少食腹痛欲按者脾氣虛也用六君子加木香凡諸證當驗其手指熱則胃熱也冷則胃寒熱用瀉黃散寒用理中湯兼不乳食異功散調之

錢氏玉露散方見上

香薷散　治寒溫不適飲食失調或外因風寒暑邪致吐利心腹疼痛霍亂氣逆發熱頭痛或轉筋拘

或吐利嘔吐四肢逆冷

香薷 兩 茯苓 白扁豆 炒

厚朴 薑汁製 各伍兩

右每服二三錢入煎加酒半杯冷服立効

竹茹湯 治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止

葛根 半兩 半夏 兩半 甘草 炙三

右每服二三錢入竹茹棗許大薑水煎取清汁微

冷細細服加茯苓錢尤妙

錢氏藿香散 治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉

過度者宜服

麥門冬 半夏 麯炒 甘草 炙各半兩

藿香 石膏 半兩

右爲末每服五分至一錢水一盞半煎七分食前

溫服

本事麥門冬散 治小兒嘔吐脉數有熱

麥門冬 半夏 人參

茯苓 各一 甘草 一分

右爲末每服二錢水一盞薑三片煎至五分去滓

溫服日二三服

湯氏消暑飲子 治小兒伏暑嘔吐

香薷 淡竹葉 各一兩 白茯苓

人參 半夏 藿香

甘草 炙各半兩 白粳米 一合

右㕮咀每服煎溫服大小加減

小兒麥門冬散 治嘔吐不止心神煩熱

麥門冬 去心 淡竹葉 各半兩 甘草 炙

人參 茅根 陳皮 去白各一分

右爲麤末每服一錢水一小盞薑少許煎五分稍

熱頻服量大小加減

治嘔吐心煩熱蘆根粥

生蘆根 二兩 粟米 一合

右用水二大盞煎至一盞去滓投米作粥薑蜜少

許食

大順飲 解冒暑毒煩渴吐瀉[illegible]發熱昏悶或痢

血路血及大小便下血[illegible]口乾汗多

細麵 一斤 生薑 十兩 赤茯苓 去皮一

粉草 各[illegible]

右先以生薑方切如豆[illegible]拌和麵內杵爛入麵再

杵勻攤作薄片曬日中晒乾赤茯苓粉草二味細

剉同前[illegible]搗爲末每服一二錢新

汲井水細研調服或温熟湯

綠豆飲 解諸藥與熱之毒煩燥悶亂或作吐或渴宜先投下次服對證藥

綠豆粉一兩 黃連 乾葛

甘草各半兩

右除綠豆粉外餘三味共為細末入乳鉢同綠豆粉杵勻每服半錢至一錢温豉湯調服

玉露散 治熱吐面赤氣麤小水短少傷暑作吐丸作

滑石六兩 甘草一兩

右為細末薑汁調稀心湯下吐甚者井花水下

竹茹湯 治熱吐口渴煩躁

橘紅 乾葛 甘草

麥門冬 竹茹 生薑

右水煎服 挾熱者加黃連

冷吐 烏犀丸 主諸積滯夾驚夾風温中調脾消飲食吐逆醋酸氣逆脹滿不利孩兒生後歲月遠近並宜可投

烏犀[illegible]

白附子 陳皮去白 各一兩

川烏炮去皮臍 巴豆去殼膜心存油 各三錢

右硫黃一味先入罐內研細除巴豆外餘四味焙為末仍以巴豆薄紙在乳鉢內細杵再同前五味藥末杵勻用粳大米飯包作粽子一大箇小瓦瓶盛水熟煮候冷取出於鉢內爛杵細布兜緊捻出如稠糊安在別器內以藥末亭分同杵細軟丸黍大取露和每服十五丸或五丸或二十一丸至三十三丸並用淡薑湯泡冷飯取汁一小盞五更初空心送下通利三五行以勻氣散止補治積吐有醋餿氣每服三丸至五丸用淡薑湯入米醋少許候温空心投下

傷寒吐 茯苓厚朴湯 主傷寒傷風夾痰嘔逆并吐瀉後喉涎牽響飲食減少脾胃氣虛

白茯苓去皮 半夏[illegible]

甘草炙 厚朴[illegible]

[illegible]

右件㕮咀每服二錢水一盞半薑三片煎七分無時服或加棗一枚去核同煎

傷乳吐 乳下嬰兒乳哺太過或兒睡著而更銜乳並有啾兒以致胛不能運胃不能受滿而溢致令嘔吐

良與六[illegible]巴豆致慢驚可不慎乎此候但令節乳稿[illegible]
一醫者宜節斷乳先令乳母服調氣之劑兒服消乳丸
化乳丁香散爲上若吐白[illegible]角出者是乳多不能消化
滿溢之證非病也不可妄投它治吐 凡吐乳而
出而不停留者謂之哯乳但以減[illegible]參錢橘紅一
錢丁香[illegible]分水煎服之吐止

消乳丸 溫中快膈止嘔吐消乳食脈沉者傷食不
消也
香附子炒二兩 甘草炙 陳皮去白各[illegible]
縮砂仁 神麴炒 麥蘗炒各一兩
右爲末泡雪糕圓如黍米大七歲以上菉豆大三
十丸食後薑湯下

消食丸 治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積於脾
胃脾爲水穀之海脾氣寬而消之胃氣消和則乳
食化脾傷於冷則宿食不消此藥寬中快氣消
乳食正顏色
縮砂仁 橘皮 三稜煨
蓬朮煨 神麴炒 麥蘗炒各半兩
香附子炒一兩
右爲末麪糊丸菉豆大食後紫蘇湯下二十丸

又方 治百晬內嘔吐乳奶或大便青色
用少婦乳汁一盞入丁香拾粒陳皮壹錢磁器內
煮數沸稍熱空心以綿蘸兒服

青州白丸子 治一切吐逆小兒驚風
天南星生 白附子生各二兩 川烏頭去皮臍生五錢
半夏洗去皮生
右為末井花水浸每日早再換新水春五日夏三日
秋七日冬十日曬乾爲細末以糯米粉煎粥清爲
圓如菉豆大小兒驚風薄荷湯調下和蘇合香圓
[illegible]名蘇青圓

[illegible] 治小兒胃虛嘔吐水穀不化
半夏湯泡 陳糯米[illegible]
右[illegible]散[illegible]薑五片棗一枚同煎

[illegible]粉丸 治涎盛潮搐吐逆
朱砂[illegible] 鐵粉
天南星[illegible] 輕粉[illegible]
右同研水浸蒸餅爲丸以生薑汁糊丸如粟米大煎
生薑湯下十五丸至二三十丸無時

茯苓半夏湯 治[illegible]下堅痞胸間有痰水[illegible]
橘

半夏（湯泡伍錢） 白茯苓（貳兩去皮）

右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎去滓熟服不拘時

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏（湯洗七次） 橘紅（各伍兩） 白茯苓（叁兩）

甘草（壹兩半炙）

右剉散每服三錢水一盞生薑三片烏梅一個同煎

白附飲 治肝風痰盛壅痰涎壅盛和飲食吐出並小兒[illegible]

白附子 南星（生用） 半夏（生用）

川烏（去皮臍生用） 天麻 陳皮（去白）

南木香 全蠍（去尖） 僵蠶（去絲）

丁香（各壹錢）

右件剉每服二錢水一盞生薑五片慢火煎七分作五次空心服

五十三

[illegible]張氏六合湯 治小兒胸膈不利嘔吐不止[illegible]

丁香藿香湯 治[illegible]吐下[illegible]乳哺

藿香（壹兩） 生薑（叁兩） 青竹茹

甘草（炙各半兩） [illegible]加升麻（各半兩）

右㕮咀水二升煮八合服一合日三

王氏消奶湯 令兒吃乳[illegible]

升麻（半兩） 大麻子（一合[illegible]）

右二味酒浸每日早晨[illegible]一盞煎了要乳時須[illegible]些小方與兒[illegible]

[illegible]三香丹 治嘔吐不止

藿香葉 丁香（各一分） 半夏（湯洗七遍焙乾半兩）

[illegible] 膩粉（壹分） 龍腦

麝香（[illegible]）

右件同拌勻生薑取汁打白麵糊為丸黍米大每服十粒人參荊荷湯下量兒大小加減

五十四

聖惠命丹 歌曰小兒嘔噦吐還頻晝夜連連不暫停諸水槐黃湯定和調乳食一時寧丁香研共生[illegible]如此藥直饒命因[illegible]遲丸

丁香 藿香（各[illegible]） 生[illegible]

牛黃（各半錢） 豬[illegible]

右為末丸如菉豆大量兒大小加減一歲以下[illegible]薄荷湯研二丸

治驚[illegible]不快吐逆乳食或心胸痰熱定吐丸
丁香 [illegible] 蝎梢 [illegible] 半夏[illegible]
右研勻煮棗肉丸如黍米大每服七丸至十丸金
銀煎湯吞下如傷暑吐瀉四苓湯煎香薷散送下
是方治久患翻胃及小兒驚吐諸吐用香散
上好硫黃半兩水銀壹分研如黑煤色每服三錢
生薑四兩取汁酒一盞同薑汁煎熟調藥空心服
衣被蓋覆當自足指間汗出漸漸遍身汗微即差
此散極淨難調須先滴少水以指緩緩研殺稍稍
增湯使令稀和否則[illegible]不可服

王氏睡驚丸 治熱化痰鎮心神治驚悸吐逆
半夏[illegible] 乳香 犀角末各壹錢
右件同為末用生薑自然汁煮麵糊為丸如菉豆
大薄荷湯臨臥服
丹藥多冷[illegible]定驚[illegible]胃不足牛乳黃連治
小兒一切驚疾
木香 檀香 丁香各參錢
沉香貳錢 香附 藿香
史君子肉各壹兩 檳榔 肉豆蔻
人參 天竺黃各半兩 白朮

薄荷 甘草各貳兩 琥珀
真珠 青黛 犀角各貳錢半
麝香伍分
右為末煉蜜丸臨臥服薄荷汁或蜜水米飲化下
全蝎觀音散 治吐瀉後風定志魔免傳變慢驚
黃耆炙 [illegible]貳錢 木香
炙甘草 蓮肉 扁豆炒
茯苓 白芷 全蝎
羌活 防風 天麻各錢
右每服三五錢薑棗煎服

[illegible]本事方治小兒疳積黃瘦吐食
川烏[illegible] 定粉各參錢 艾灰貳錢
龍骨末貳錢
右為末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅
米飲磨下
六神湯 脾胃虛吐瀉不進飲食
黃耆 扁豆 人參
白朮 茯苓 炙甘草
藿香各等分
每服三四錢薑棗煎服

和劑觀音散 吐瀉

人參散 治小兒臟腑冷若縱喫乳食即又吐出或因喫乳驚觸致作驚搐之狀令小兒外證面唇青白手足心熱口多清涎吐逆不止或作瀉候青黃紫白兼須千或如鼻涕雞子清者或乳食不化並宜服之常服開胃益乳食

人參　白术　茯苓

沉香　白芍藥　甘草各半

右為細末以瓷器收之遇小兒有前項形證半歲一字二三歲半錢大者一錢煎棗子米飲調下或陳紫蘇湯亦可或吐瀉并作煎丁香湯下陳皮湯尤妙

雜病經驗方治小兒吐不定

用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕紙裹炮過同搗為末每服米泔調下半錢七瘥

掌中金 治小兒嘔吐虛痢吐下不乳不得飲食

白豆蔻仁四箇　甘草炙半生半兩　砂仁四箇

右為末遂旋安掌中與他乾吸才兒乾糝口中亦可

釀乳法 治初生嬰兒凡有胎熱證當令乳母服藥不可求效之速治法且釀乳令兒喫漸次解之百無一失若遂以冷藥攻之必損脾胃加以嘔吐必成大患

澤瀉二兩半　豬苓去黑皮　赤茯苓

天花粉各一兩半　乾生地黃二兩　山茵陳用葉

甘草各一兩

右為散每服五錢水一盞煎六分食後捏去舊乳可服

凡吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷　吐稠涎及血皆肺熱　吐水不止者屬胃冷　吐水心痛者蟲動　口中吐沫水者後必蟲痛　面恍白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之　丹參月吐蛔多是胃虛寒　可用錢氏白朮散加丁香大效　亦可用理中湯加甘草加烏梅肉川椒

瀉

嘗論瀉之原有冷瀉熱瀉傷食瀉水瀉積瀉驚瀉風
瀉臟寒瀉疳積瀉[illegible]種種不同各分於後　冷瀉
多是白水瀉密而少腹痛而鳴眉皺目慢面帶白色
額有汗多用冲和飲 慢驚 當歸散 溫熱 令和水煨薑
煎服并守中湯 本條 參苓白朮散 飲食 乳 益中膏 本條
并香連丸 不乳食 治之　熱瀉大便黃色如筒吊水
瀉過即止半日復然心煩口渴小便黃少食乳必
先用五苓散 驚 或大順飲　次以錢氏白朮散 渴 生

之香薷散 吐瀉 亦佳　傷食瀉乃脾胃素弱復爲生
冷果食所傷故大便不聚而瀉或因乳母餐生冷肥
膩之物自乳而過亦能作瀉面唇俱白瀉稀而少或
如[illegible]雞子腥臭異常身形黃瘦宜先溫正胃氣次理
脾而後因脾冲和飲[illegible]合和小[illegible]散
[illegible]小者化癖丸 驚 三
稜散 宿食 同脾[illegible]醒脾散 慢驚　水瀉謂之
洞泄乃陰陽不順水穀不分瀉黃水而小便少者炙
搭而無度[illegible]取涼夜則失蓋感
冷冷熱相激清濁渾亂或因[illegible]熱中來乳有熱氣

乃以補之令[illegible]脾胃不[illegible]而下以收其五
苓散 驚 加燈心[illegible]調中止陰陽
或先用大順飲 吐 溫[illegible]香薷散 吐瀉 調中止
用錢氏白朮散 渴 六和湯 可[illegible]亦好　積瀉脾氣虛
乳食入胃不能運化積滯日久再爲冷食所傷傳
之大腸遂成泄瀉留連不止諸藥無效蓋以積在脾
胃[illegible]積未除何由得愈宜先去積後止瀉瀉止實脾
去積除以三稜散 宿食 烏[illegible]繼用沉香檳榔丸
飲乳 參苓白朮散 食 和中散 本 香橘餅 本條 調
理　驚瀉糞青如苔稠若膠粘不可便止但鎮心抑

肝和脾胃消乳食斯爲治法先投五苓散 驚 次用三
稜散 宿食 水[illegible]解散 驚熱 神麯生薑
煎湯調服及沉香檳榔丸 飲乳 不驚丹 驚 調治　風
瀉慢驚大病後有之其糞稀黃褐色或夾不消乳食
同下此因脾虛所致或夾黑褐色者爲腎益脾虛 驚
腎水所乘故也若久不進飲食再有驚搐宜疎腎水
大脾風次補脾則自然無複作之患疎腎水吹咀
五苓散 驚 加黑牽牛半生半炒并蒼朮仁水薑煎服
去脾風瀉黃散 脾 調胃氣參苓白朮散 飲乳　臟寒
瀉糞如青竹色不稀不稠或下青水未瀉時腹痛瀉

嗚咽哭乃隨多是生來三五月內有此周歲則無殄因斷臍帶觸風冷自外通內而成此疾先用沖和飲濃煎水葱白煎投湯中解表次以當歸散調熱水煨薑煎服及投勻氣散兼理中湯調理 別積聚瀉其候面色痿黃肚脹脚弱頭大項小髮稀且成肌肉消瘦不思飲食晝凉夜熱或腹內有癖癥氣塊瀉則顏色

其臭異常其瀉有時或一月半月旬日一番自止名為積瀉先以當歸散加三稜散除水薑煎服次投烏犀丸 沉香檳榔丸 及化癖丸 蘆薈丸 沒石子丸本條見 最小者難下丸藥 [illegible]

幼科一 六一

以止投三稜散 快膈湯 自然痊愈 若瀉或面色青[illegible]此陰邪勝陽宜用理中湯冒苓湯[illegible]劑服扶表救裏乃進當歸散加陳皮紫蘇木薑糯米煎服亦宜和劑理中湯溫 渴米飲空心調服溫脾去濕益氣[illegible]盛者理中湯內加熟附子木薑棗煎服次投[illegible]薑煎服和脾胃去邪 若瀉或黑色青淡而有沫黃稠熱多痰少亦致面黃肌瘦煩躁不寧宜以咬咀五苓散加薏苡仁車前子水薑煎服解散餘邪仍用[illegible]梔子仁煎湯調細末五苓散溫服退黃色消

陽[illegible]及當歸散水薑棗煎投或服萬安飲 積熱 四神丸

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉

黃連去鬚 白芍藥[illegible] 吳茱萸[illegible]各[illegible]

右三味各內慢火炒赤色放冷併研為細末每服三錢七水一盞半煎至八九分去滓空腹食前溫服日三四服小兒量與或以水[illegible]餅丸如梧桐子大更丸一等如粟[illegible]米大小兒每服十五丸至二十九溫米飲下若作散以沸湯或溫米飲[illegible]下並可服病泄痢之人若不禁生冷魚肉肥膩與不消

幼科一 六三

服藥同 一方有木香無[illegible]

朱先生香連丸 治瀉利

木香 黃連[illegible]

肉豆蔻 訶子[illegible] 阿膠炒

朱砂各一

右為細末軟飯殺丸如梧桐子大每服十丸十四丸用飯飲吞下兒小者[illegible]之

乳香散 治一切瀉痢

乳香[illegible] 肉豆蔻

甘草炙 [illegible]

右細剉用醋麪裹於熱灰內煨令赤色取出去麪
為末入乳香木香令勻每服半錢一錢陳米飲調
下

冷瀉 湯氏云冷瀉者乃脾胃虛寒水穀不化而泄
錢仲陽云小兒不能食乳瀉褐色身冷無陽也當用
益黃散(脾) 加減治之大便糞白口不煩渴冷積瀉也
理中湯(見泄瀉) 主之若口鼻吸風寒之氣脾胃受生冷
之食而作者先用理中湯後用異功散命門火衰不
能溫蒸中州之氣故脾胃虛寒者用益黃散及八味
丸(腎) 脾胃虛弱者五味異功散(見嘔吐) 脾氣下陷者補

中益氣湯(虛羸) 脾氣虛寒者人參理中湯寒水侮土
者益黃散肝木乘脾者四君柴胡散手足並冷者加
木香乾薑治者豁之 百問云冷積瀉沒石子丸極
効人參散(附) 理中湯(附) 加減肥兒丸(附) 更加肉豆蔻
則止來復丹(附)秘旨不換金正氣散(見吐瀉) 皆可觀音散
吐瀉 銀白散加減調治乃下利之劑也

守中湯 理脾胃交相受陰盛氣弱中傷脾胃致瀉痢
泄利經久不止漸傳于脾胃飲食少思
桔梗(去蘆炒) 蒼朮(米泔浸一宿去蘆麩炒微黃色各二兩)
白薑(炮) 甘草(炙)

右件剉焙為末每服一錢空心米湯調服或用木
煎亦可或用當歸

沒石子丸 治嬰孩先因冷瀉或作赤白痢候久而
變作諸般異色不止一端外證面或青或白唇舌
乾焦手微冷渾身溫壯肚肉刺痛啼叫擾鬧不安
者是候當服
沒石子 木香 黃連
當歸 青皮(各二錢半)
右五味為末阿魏一錢分酒半盞浸化入麪少許令
勻煮糊為丸如粟米大一二歲兒服如粒月大者

四五六歲兒服每服五十丸赤痢甘草湯下白痢
乾薑湯下赤白各半湯下

張渙川椒丸 治小兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止
川椒(一兩) 肉豆蔻(半兩)
右件搗羅為細末粳米飯和圓如黍米大每服十
粒米飲下量兒大小加減

粟煎湯 治腸胃受風冷泄瀉不止身體壯熱
白朮(炒) 當歸 川芎
人參(去蘆頭) 肉桂 芍藥(各一兩)
右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑二

片棗米一匙頭許煎至五分棗米熟去滓放温服

温中丸　治胃寒瀉白腹痛腸鳴吐乳（方見嘔吐）

孔氏治藏府不調大便青色

白朮　人參　茯苓各一

甘草（炙各半）

右末一錢水一小盞煎七分温服

張渙云瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分

和勻湯調服　田氏云便青者因驚風内藏脾氣不和

宜白朮湯

洞瀉　湯氏云小兒熱瀉者大便黄而赤或有沫乃臟

中有積或因乳母好飲酒或啖熱物或坐下傷濕蘊

熱醫者不明但用豆蔻訶子等藥服之如水澆石既

不識其證藥不辨其冷熱用藥又不得其法焉能取

効此證當以小便赤少口乾煩躁爲驗治法當用錢

氏白朮散（見）去木香用之五苓散（見）去桂亦可服大

熱甚者四逆散大柴胡湯（見傷寒）去大黄服之殊驗也

更用黄連丸（見痢）亦佳調中湯（見）去大黄加黄連

枳殼如夾熱而瀉太陽與少陽合病自下利者與黄

芩湯嘔者加半夏又有挾熱瀉痢而小便秘濇赤黄

者加減四順清涼飲（見熱）治之即止　薛氏云右腮

色赤飲冷胃經實熱也用瀉黄散（見脾）惡冷喜熱

虚熱也用白朮散（見渴）右腮及額間俱赤心脾翕熱

用瀉黄散加炒黑黄連若左腮右腮俱赤肝火乘脾

土也用四君子湯（見吐瀉）加柴胡若兒飲傷乳食用保

和丸（見宿食）乳母尤當忌厚味節飲食若乳母停食所

傳致兒吐瀉等病當治其母大抵始病而熱者邪氣

勝則實也終變爲寒者真氣奪則虚也久病而熱者

内真寒而外假熱也久瀉元氣虚寒當參前證治之

黄芩湯　治下利而頭痛胸滿口苦咽乾或往來寒

熱而嘔其脉浮大而弦者或協熱而利者

黄芩一兩　芍藥　甘草（炙各一兩）

右剉散每服二錢棗子一箇水一盞煎七分去滓

温服嘔者加半夏壹兩貳錢半生薑煎

張渙清胃散　治挾熱泄利

川楝子　黄柏（炙去皮）　當歸（洗焙）

地榆（各）　黄連（去鬚各半兩）

右件搗羅爲細末每服一錢水八分煎至四分去

滓温服乳食前

香連丸

黄連（薑汁拌炒二兩）　木香（炙半兩）

右為末陳米飯丸菉豆大米飲下一二十丸亦可

調中散

錢氏云凡此瀉不宜便補先用消食藥或用紫霜丸見驚 取其積盡然後可補經云食瀉重當取痢虛用補虛治食瀉與香橘餅子加減觀音散調中湯散以意加減凡傷食瀉雖止亦不宜補再傷又瀉宜節飲食當用進食丸見諸 取下食積令盡次以錢氏加減益黃散只一服可止此乃切要治法然後異功散四君子湯見吐 調理必取全安有腹中雷鳴下痢者生薑瀉心湯止之如冷積釀瀉用香朴散止之白

水散以和氣調胃調中散保安丸能止傷食瀉感應丸沉香煎三稜丸見積 皆可服也 東垣云傷食則惡食小兒食瀉者因飲食傷脾脾氣不能運故乳食不化而出若噯臭吞酸胸膈脹滿腹痛按之益痛者雖作瀉而所停滯之物尚未消也用保和丸腹痛按之不痛者乳食已消也用異功散脾氣傷而未復不思飲食者用六君子湯所傷生冷之物及喜熱者並加木香乾薑乳食已消腹痛已止瀉尚未止者此失清升之氣也用補中益氣湯像有別當參苓白錢黃承務子二歲病傷食而瀉衆醫與止之十餘日便青白乳食不消身涼加噦氣昏睡錢以為危候錢先與益黃散補肺散各三服三日身溫而不噦氣後以白餅子微下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷食初不與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子母故也今先補脾則肺病自退即身溫不噦氣也然後下其所傷或曰何不先下後補曰便青為下臟冷若先下必大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安

香橘餅　止積瀉傷冷

木香　青皮各二錢半　陳皮二錢

厚朴薑汁製　神麯　麥蘗各半兩

右為末蜜丸為餅紫蘇米飲調下

加減觀音散　止吐瀉咳嗽

黃耆　人參　木香

甘草炙　石蓮心　扁豆炒

茯苓　白朮　全蝎

羌活各二錢　防風　天麻各錢

右剉散水煎

調中散　治傷食瀉凡此瀉不宜便補先用食藥或紫霜丸取其積盡然後可補經云食瀉重當取解

虛用補虛良醫明妙理何虛疾難除

人參去蘆　白茯苓　白朮

木香　乾薑炮　藿香葉

香附子炒去毛　縮砂仁　甘草炙

丁香各等分

右爲末每服一錢薑棗湯調下肚痛白湯下量大小加減

生薑瀉心湯　治傷寒汗出解後胃中不和心下痞硬脇下有水氣腹中雷鳴下利者

黃芩　甘草炙　人參各壹兩半

乾薑炮　黃連各半兩　半夏壹兩壹錢湯泡

右剉散每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓溫服

保安丸　治小兒瀉傷食瀉

香附子炒　縮砂仁各壹兩　白薑炮

青皮去穰　陳皮去白　三稜炮

莪朮炮　甘草炙各半兩

右爲末麪糊丸如菉豆大每服二三丸白湯下食前溫服

消積丸　治小兒食積作瀉并痢疾

杏仁湯泡去皮尖炒　巴豆去殼細研入杏仁同炒黃

黃蠟各壹兩　百草霜用

右將杏仁巴豆研極細溶入黃蠟令勻錠和丸如菉豆大赤痢甘草湯下白痢生薑湯下先進三四服腹脹者十餘服効驗如神

聖石開胃丸　治小兒府藏怯弱內受風冷腹脇脹滿腸鳴泄利或青或白乳食不化又治藏冷夜啼胎寒腹痛

木香　蓬莪茂　白朮

人參去蘆　當歸各壹兩　麝香細研

白芍藥各半分

右件爲細末研令勻湯浸炊餅和丸如黍米大每服十五丸溫米飲下新生兒腹痛夜啼可服五丸并乳食前服

補遺　聖惠厚朴散　治小兒脾胃不和洞瀉下利不止飲食

厚朴去皮薑汁炙　人參去蘆

訶梨勒皮用　白朮　黃連去鬚

地榆　甘草炙　乾薑各半分

肉豆蔻

右件搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小以意加減

張渙厚朴散 治洞泄注下

厚朴生薑汁製 訶梨勒炮取皮 肉豆蔻各壹兩

白朮 乾薑炮各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水八分盞入生薑粟米各少許煎五分去滓溫服

萬全龍骨丸 治小兒冷熱不調時有洞泄下利不止

龍骨 黃連 白石脂

白礬燒令汁盡 乾薑炮 木香各半兩

右件藥搗羅為末醋煮麵糊為丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大小加減服之

劉氏小兒水瀉注下

黃連 石蓮[illegible]

右為末每服半錢米泔[illegible]不調下白粥粟米飲下

嬰孺香橘丹 治嬰孩過傷乳食或吐或瀉及病後虛中感積成疳氣弱脾胃商貴日[illegible]

南木香 陳橘皮去白 青皮去白各貳錢半

厚朴[illegible] 訶黎勒炮

麥芽[illegible]

右木香不過火餘七味剉焙仍同木香研為細末煉蜜作劑子如芡實大每服餅子一餅用棗湯化開空心溫投米泔湯亦可

嬰孺四 什陽云慢驚病後或吐瀉胃虛或稟氣弱因驚眼白如淡黃下黃青此為冷溫補不理[illegible]用釣藤飲[illegible]土之戒乳隨番下消乳丸[illegible]進食丸[illegible]之或微瀉心脾喘燥生熱此瀉尤難治宜五苓散驚土之法者宜命飲子治之後與溫驚朱君散睡驚太乙丹 [illegible]肝用木也盛則必傳於脾脾土既衰則[illegible]不能化水道不調故泄瀉色青或兼痰涎者[illegible]用之色搐乃肝之證也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火而致者[illegible]則氣逆甚則嘔血及飧泄法當平肝補脾慎勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚[illegible]火熾盛中州虧損之變[illegible]宜用四君六君異功散等方[illegible]以杜漸則必不至瀉搐[illegible]吐瀉搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎮驚等藥治之其亦去生遠矣

至聖保命丹　治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眼睛[illegible]
夜後多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足搐掣
不省人事悉皆主之並宜用此
全蝎十四箇　防風　僵蠶去絲嘴
南星炮　天麻各二錢　白附子
麝香伍分　金箔十片　蟬蛻
朱砂各一　有熱證加牛黃腦子硼砂
右為末粳米糊丸每兩作四十丸常服鎮心安神
化痰除一切驚風諸證薄荷湯臨時換　一方加人參
茯苓貳錢

定命飲子　治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用
半夏湯泡　茯苓　木香
老生薑切片焙　白术　甘草炙各一錢
天麻一錢
右剉散每服二錢薑棗煎湯調下

朱君散　治吐瀉後[illegible]服之
人參　白术　茯苓
甘草炙　麝香
燈心　鉤藤
右為末每服一錢用白湯調下

截驚太乙丹　常服安神鎮驚止夜啼[illegible]
桔梗炒各一兩　藿香葉　白茯苓炒各
白芷炙各一錢　川芎炒
右為末煉蜜丸如芡實大以硃砂麝香為衣每服半
丸薄荷湯磨下夜啼以金銀燈心鉤藤湯
磨下加白术茯苓白芍藥炒

肉豆蔻丸　治脾虛胃弱人食不消飲食不思或泄痢
腹痛
肉豆蔻　五味子各二兩　補骨脂肆兩
吳茱萸壹兩
為細末用紅棗六十五枚生薑六兩用水二鍾
煮乾取棗肉和丸如梧子大每服五六十丸白湯
送下或化服

二神丸
補骨脂肆兩　肉豆蔻貳兩生用
右為末用紅棗四十九枚生薑四兩用水一鍾煮
乾取棗肉和丸如梧子大每服二三十丸白滾湯
下

[illegible]沒石子丸　治久患痢疾及釀瀉
沒石子二枚　南木香　黃連

內豆蔻（麵裹煨） 訶子（去核）
右剉焙成末如常法丸內粟飯糊爲丸粟殼大每
服十丸至三十丸或五十丸温白湯空心下或米
清湯下
巢氏小兒冷利者由腸胃虛弱爲冷熱之氣所
傷而爲冷利熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交
則變爲赤白滯利也
聖惠胡黃連散 治小兒冷熱氣不和忽發下利腹
內疼痛
胡黃連 母丁香 桂心
木香 肉豆蔻（去殼） 當歸（剉微炒）
麝香（細研各半分） 犀角（屑半兩）
右件藥擣細羅爲散每服以粥飲調下半錢日三
四服量兒大小加減
龍骨散 治小兒冷熱[illegible]
龍骨 黃連（去鬚微炒） 當歸（剉微炒）
枳殼（麩炒微黃去瓤各半兩）
右件藥擣麤羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小加減溫服
張渙胡黃丹 治洩利身熱及發渴[illegible]

黃連 乾薑 當歸 川黃連 肉豆蔻 烏梅
右件擣羅爲細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒
粟米飲下量兒大小加減
神仙玉粉丹 補一切虛不論男婦小兒皆可服冷
積癖瀉見功尤速
猪肚 硫黃
右用豶猪肚七箇旋採桑根白皮二斤寸剉將猪
肚一箇淨洗以硫黃實之用麻線縫合水二斗先
將桑根白皮一斤同煮一伏時其餘諸肚亦用㬌
火養之不得令冷候煮滿一伏時則以猪肚換之
又用白皮肉一斤同煮再一伏時又換猪肚并桑
白皮過三伏時不換白皮只換猪肚共煮七伏時
水耗以熱湯添不得用冷水候滿七伏時取出用
溫水淘淨研至細候烈日中曬極乾再研蒸餅米
粉爲糊丸如梧桐子大每服空心米飲下十粒至
十五粒大宰驪除宿冷其功効無比老人經久可
服
瀉 大法補虛 消積 風寒 錢氏歌云脾中有積熱
[illegible]使終日瀉不休更[illegible]見人多喫氣虛兼清水

身中於外間有似真茶色若有血腸頭不收形證如
有物脂上膈前深赤汁如油屠赤生瘡瘦脉赤若不
調脾命即休

千金七味散　治利下久不差

黃連八分　龍骨　赤石脂
厚朴　烏梅肉各二分　甘草炙一分
阿膠炙三分

右治下篩漿水服二方寸匕日二小兒一錢匕

華陀治老小下利柴立不能食入口即出命在旦夕

久利神驗方

黃連末一兩　亂髮灰　醇苦酒
蜜名半雞子許　白蠟方寸　雞子黃一枚

右六味於銅器中炭火上先內酒蜜蠟雞子黃攪
勻乃內黃連末髮灰又攪可丸服出為丸久困
者一日一夜盡之

外臺療久利無問冷熱瘥之
棗去核勿令皮破內胡粉令滿於炭火中燒
如炭燒器中研之米飲和服一歲以下分服之不
過三服瘥

聖惠治久利赤白滯痢胃虛不食丁香散

丁香　厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟
黃連去鬚剉微炒　當歸剉微炒　訶梨勒皮煨用
白朮微炒　伏龍肝各半兩　木香一分
赤石脂一兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三
四服量兒大小加減

黃連丸　治小兒冷熱痢經久不斷增減有時

黃連去鬚微炒　人參去蘆頭　赤石脂
龍骨　甘草炙微赤剉　黃芩
厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟　白茯苓
枳殼麩炒微黃去瓤各半兩　烏梅肉微炒一分

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥
飲下七丸日三四服量兒大小臨時加減

譚氏十門散　歌曰小兒瀉利甚青黃久患時多轉
滑腸下部脫肛須炒胡熟瘦漸羸尪

訶子　枳殼　地榆各等分

右為末每服一錢米飲調下一歲以下半錢

嬰孺龍骨湯　治下利不住

龍骨　甘草炙分　黃連各四分
當歸　乾薑各一分

右[illegible]以水[illegible]升煮取一升二合去滓溫分三服

[illegible]車湯 治服藥不[illegible]後不止

龍骨[illegible]分 [illegible]炙 乾薑

當歸 黃連 赤石脂

附子炮裂去皮臍 前胡各三分

右以水四升煮取一升二合為九服日服至午令盡

黃連煎 治冷熱利纏綿不止微痢不瘥餘治者宜

又發用好黃連武兩水七升煎八合煎取一升三合

去滓百日兒服半合二百日[illegible]歲服一合

雞骨丸 治下利經久不斷羸瘦脾胃冷弱食不消 幼科七 七十八

瀉為

化

雞骨 前骨肋骨全用一具 黃連 陸分

厚朴 三分 神麴 炒 甘草 炙

白朮 各四分 麥糵 炒 烏梅肉 各二分

人參 赤石脂 黃芩

白龍骨 各五分 桔梗 二分

右為末蜜丸小豆大白飲下二十五丸日二服量

兒大小與之

溫白丸 治久瀉脾虛不食食即瀉下米穀不化

白朮 一分 [illegible] 丁香 半分 半夏 一分湯[illegible]

右為末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大半

歲每服三丸三五歲五七丸淡生薑湯吞下早晚

各進一服

[illegible]散 治久瀉脾困不思乳食恐作脾風

天麻 全蝎 去毒炒 木香 炮

糯米 人參 茯苓 各等分

白扁豆 炒 山藥 炒 甘草 一錢炙

右為末每服嬰孺一字二三歲半錢用水一藥注

或半銀盞棗子半片煎十數沸服

張渙治瀉利久不止香[illegible]丹 幼科七 七十九

瀉

木香 枯白礬 各一兩

酸石榴皮 炒黃 訶梨勒皮 炮

右件搗羅為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒

粥飲下量兒大小加減

劉氏治小兒臟腑久瀉瀉不止

人參 白朮 茯苓

甘草 陳皮 藿香

丁香 木香 肉豆蔻

右等分為末每服二錢以藿香合糯米煮粥飲調

下或當木煎亦可

風癎滑泄四君子加訶子伍分米飲調下

嬰孩寶鑑小兒瀉者謂之飱泄飱食不消脾胃冷故不能消化當用益黃散主之　瀉乳食不消而瀉者冷氣出令四肢冷面白無光澤精神不守此乃胃氣不和可以大溫藥治之如若大人益黃散主之　若病泄瀉日久不瘥乳食不化是脾胃有風冷先服益黃散二服後用宣風散導之即宜補　宜參大利瘥泄門用之

聖惠厚朴散　治小兒水穀利羸瘦面黃不欲飲食

厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟　龍骨

黃連去鬚微炒各半兩　丁香

木香　白朮　當歸剉微炒　肉豆蔻各一分

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減

地榆散　治水穀利日夜不止

地榆微炙　厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟各三分

黃連去鬚微炒一兩　阿膠搗碎炒令黃色半兩

右件藥搗細羅爲散不計時候以粥飲調下半錢量大小加減

醫局胃風湯　治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇滿腸鳴㽲痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

人參去蘆頭　白茯苓去皮　芎藭

桂皮去粗皮　當歸去苗　白芍藥

白朮各等分

右爲粗散每服二錢以水一大盞入粟米百粒同煎七分去滓稍熱服空心食前小兒量減

大抵有濕食泄脈大手足寒難已脈小手足溫易已

痢疾

湯氏云小兒痢疾皆因飲食無節或餐果食因不知
飫足乃脾胃尚弱不能剋化停積於臟故成痢也熱
則赤風寒之氣入於腸胃致令津液凝滯則成白
或有者有驚積或如魚腦肚中疼痛者大抵入
由冷熱赤白雜作雖有不同治法不相遠矣又有
赤白相雜者當先去其熱積須用大黃枳實朴硝之
類以去其熱毒然後黃連黃芩黃蘗解其熱痢白止
只用宗此妙法也如痢不止則用地榆熟艾等劑調
理自然平復脾虛者不可輕用罌粟澀滯等劑必致
有何須用沒石子黃連阿膠地榆以止之方為盡善
其積殺有藥皆要藥也噤口痢不能食者石蓮散主
之香薷散亦可冷痢如豆汁肚疼者胃風湯主之脾
虛臟熱當服香連丸黃連香薷散去桂五苓散
芍藥湯當歸芍藥枳殼[illegible]用芍藥[illegible]先與解毒退
熱與開胃進食分利水穀寬腸定痛先與水浸丹
名方敗毒散[illegible]地榆飲寬腸枳殼散有熱而痢不
止者三黃熟艾湯[illegible]積滯不通者神芎丸亦可用
熱壯甚煩躁者黃連解毒湯解之煩躁潑火散亦効

若赤白[illegible]用人參不可[illegible]為湯為熱白為冷
或曰無積不成痢至於調治者以冷熱之劑互相[illegible]
投去積之藥必難取效不究其源何由可療且四時
入風之中人五運六氣之相勝夏秋人多痢疾內經
曰春傷於風夏生飧泄至真要大論曰少陽在泉火
淫所勝民病注泄赤白其可拘於無積不成痢之說
暑尊以積為論豈一歲之中獨於夏秋人皆有積春
不然蓋風邪入胃木能勝土不為暴下則成痢疾
赤白交雜此為陰陽不分法當分正陰陽五苓散以
導其逆理中湯以溫其胃使色歸一然後施治若一
病[illegible]
分之後仍赤白同下則當究其所患之因若先白後
赤乃內傷生冷先於蓋積由元氣感於暑熱治法先
救其裏次解暑毒若先赤後白乃先傷熱而後失蓋
感冷生宜解熱後治其痢有夾熱而痢者則下純
鮮血用[illegible]能動血宜冷服黃連香薷散[illegible]用黃芩散
又當歸散[illegible]加[illegible]柏葉[illegible]水[illegible]服或[illegible]散
加三和湯水煎各半[illegible]有挾冷而痢者則下[illegible]
凍或下上有粉紅色或似豬肝瘀血皆為陰證蓋血
得寒則凝澀故也先用㕮咀五苓散加守中湯[illegible]煎
服次以附子理中湯帶溫服或因貞湯[illegible]尚不辨

其虛實冷熱妄行施治必致脾胃愈虛不能[illegible]
噤口痢者熱難療矣又有裏急後重蓋裏急爲[illegible]
重爲[illegible]未調亦腹痛爲裏急已痢後腹痛爲後重故
裏急者大腸澀也先以大順飲加寬氣飲急驚和解
及羌活散水煎冬水煎服次下寬腸丸後重爲氣虛
用吃四五苓散加人參木香煎服并投香連丸若二
[illegible]俱行前二丸子並進或雙金飲金粟丸亦佳爲[illegible]
痢一二字白是痢[illegible]水來多而頻者曰爲帶血來
白東來三五點而痢者曰痢輕重陰陽於此而分斯
爲治法有膿血交雜經久不止或晝輕夜重或晝夜頻

數食減痛多並用萬金散神効散主之有五色痢者
者乃因五臟蘊熱日久不散故有是證蓋五臟受熱
積損不一而穀不化熏腐臟腑神氣昏沉此候已危
最者是膀中刺痛兒小者無治法蓋五色者乃五臟
之色皆見於外兒大者可用[illegible]一神丸或小來復
丹以五苓散送下或[illegible]故不可爲也
又有痢多是黃赤色與[illegible]但不與爲[illegible]
耳此[illegible]主之若
見赤[illegible]並作唇裂服
不[illegible]心煩坐卧不安作渴飲水穀道傾陷時復向

容如粧飲食不進者難治 錢仲陽云瀉痢黃赤
黑皆熱也瀉痢青白米穀不化皆冷也東垣云白者
濕熱傷於氣分赤者濕熱傷於血分赤白相雜氣血
俱傷也海藏用四君子[illegible]治虛弱之痢四君乾薑治
虛寒之痢愚常治[illegible]指熱[illegible]冷者爲實熱用香連
丸[illegible]指冷飲熱者爲虛寒用異功散送香連丸者
素[illegible]重腹痛濕熱傷脾也用升陽益胃湯小便不利
陰陽不分也用五苓散若濕熱退而久痢不愈者脾
氣下陷也用補中益氣湯倍加升麻柴胡瀉痢兼嘔
或腹中作痛者脾胃虛寒也用異功散加炮薑木香

或變而爲瘧者脾虛也用六君升麻柴胡[illegible]
若積滯已去痢仍不止者脾氣虛也用四君子送下
香連丸若因乳母膏粱厚味六淫七情致兒爲患者
當各推其因仍兼治其母并參冷熱瀉及積滯腹痛
等證覽之

[illegible]羌活散 治傷風時氣頭痛發熱身
體[illegible]咳嗽失音鼻塞聲重及解時行下痢
赤白

人參去蘆 羌活 赤茯苓去皮
柴胡去蘆 前胡去蘆 川芎

獨活　桔梗　枳殼（去瓤麩炒黃色）
蒼朮（米泔水浸一宿去粗皮焙乾剉片炒至微黃色）　甘草（各一兩）
右每服二錢，水一盞，薑三片，薄荷三葉，煎七分
無時溫服。發散風邪入戀，臼同前痢證，並倉米煎
真人養臟湯　治痢之法，若欲取積，只用官桂進食
丸、玉燭散取積，久能治痢，萬無一失。積已下，急以
四君子湯加豆蔻、訶子，再之次加香連丸得效
丹　治小兒痢疾
黃連　黃芩　大黃
甘草

右煎服，赤痢加紅花、桃仁，白痢加滑石末
治小兒赤白痢多，體弱不堪下大黃者，麻子壹合
炒令香熟，搗末，每服一錢七，蜜漿水和服，効
水浸丹　治濕痢先餘之藥
黃丹（一兩研細）　巴豆（大者二拾伍箇，去皮膜，研，出油，或黃丹二兩亦可）
右研勻，用黃蠟作汁，拌勻，量大小旋丸，水
浸吞下，湯使見下。一方用黃丹壹兩，巴豆
肆拾玖粒，乳香貳錢，麻油貳錢，蠟半兩，熔汁和丸
名類止丹。又冷證加木香貳錢半
寬腸丸　治痢後裏急，大腑閉澀不通
枳殼（水浸去瓤切片麩炒微黃）
（用清油浸一宿焙乾伍錢）
麻仁（去殼）　木通（去節去皮）　大黃（半生半煨）
檳榔　大腹皮（洗焙乾）
右除麻仁用乳缽極細研外，五味擂碎，不過火，除
焙同研成末，入乳缽中，與麻仁再杵勻，煉蜜丸如
豆大，每服十丸至五十丸，仍以枳殼甘草煎湯
空心送下，或嬰孩濕茶湯下
治痢用涼藥　治熱，治赤痢，用枳殼子加赤芍藥、當歸
入粟米少許同煎
黃連解毒湯　治時疫三日已汗解，苦煩悶乾嘔，口
燥呻吟，錯語不得臥，亦治熱痢

黃連（參錢）　黃蘗（半兩）　梔子（肆箇）
黃芩（壹兩）
右剉散，每服一錢，水一盞，煎六分，去滓服
瀉火散　治中暑煩熱，口乾及治血痢
青皮（去白）　赤芍藥　黃連（去鬚）
地榆（各等分）
右為細末，每服一錢，冷水調下，如吾熱而氣血妄
行，加甘草
□皮丸　治一切惡痢，窘痛，膿血

黃連各半兩　黃蘗各二兩　當歸

右為末滴水丸小豆大每服二三十丸熟水下加

枳殼

寬腸枳殼散　順氣止痢

甘草炙一錢　枳殼去穰炒二錢

右為細末每服一錢空心沸湯點服

三黃熟艾湯　治積藏有下痢赤白及治傷寒四五

日而大下熱痢服諸藥多不止宜服之

黃芩　黃連　黃蘗各半兩

熟艾半雞子大

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

地榆散　治瀉痢血痢

地榆　訶子　甘草各等分

右為末鹽米湯調下有熱加黃芩

又方

地榆　訶子　厚朴薑製各一

右剉散每服一錢水一盞煎數沸服

地榆飲　治冷熱痢腹痛下痢赤白頻併

地榆　甘草　芍藥

枳殼各一兩半

右剉散每服二錢白水煎加黃連妙

又方

地榆　烏梅　檗皮

甘草　當歸各等分

右剉散每服二錢煎服

川芎散　治腹痛下痢赤白不拘遠近

川芎　白芷　甘草炙

赤芍　當歸酒洗　黃連各伍

右剉焙為末每服半錢至一錢白痢白蜜湯調赤

痢甘草湯調赤白痢溫米清湯調並空心服

治熱痢備急方

用韭花水調臘茶磨生薑汁同飲之

本事治小兒赤痢

搗青藍汁二升分四服

治小兒糞血

甘草伍分以水六合煎服二合去滓一歲兒一日

服令盡

錢氏　乘丸　治小兒熱痢下血

黃蘗去皮半兩　赤芍藥四錢

右爲末飯和丸如麻子大每服一二十丸米飲下量兒加減

梔子丸　治少小熱痢不止

梔子 柒枚　黃蘗 三分　黃連 伍分

礬石 四分　大棗 四枚炙令黑

右五味爲末蜜丸如小豆大服五丸日三夜二服不知稍加至十丸

小品子芩湯　療小兒熱痢

子芩 十二分　知母　女萎 各六分

竹葉 切八分　黃蘗　甘草 炙各分

右六味切以水二升煮取一升分服甚妙

聖惠梔子仁散　治小兒熱痢腹痛心煩口乾小便赤黃不欲飲食

梔子仁　當歸 剉微炒　黃蘗

地榆 各三分　黃連 去鬚微炒

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減

烏梅散　治小兒熱痢但壯熱多渴而痢不止

烏梅 一兩微炒去核　黃連 去鬚微炒　藍葉 各一兩

犀角 屑　阿膠 搗碎炒令黃燥　甘草 炙微赤剉各半兩

右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

形證治赤痢搗胃散

白朮　茯苓　人參 各半兩

石蓮子 去心炒

右爲末霍香湯下半錢

孔氏治赤白痢背上地榆一斤水二升煮升半去滓煎如餳空腹服

黃連例法 孫氏　加黃蘗爲二聖丸 治痢　加橘皮爲橘連丸 治痢　加榆仁爲榆連丸 治痢　加黃芩大黃爲三黃丸 治熱痢

加阿膠茯苓爲阿膠丸 治痢　加訶子木香爲小香連丸 治痢　加豆蔻木香爲豆蔻香連丸 治痢　加木香白附子爲白附子香連丸 治痢　加阿膠當歸乾薑爲駐車丸 治痢

幾處用瀉痢藥　海藏治白痢用四君子等分加乾薑減半入粟米少許同煎

大順飲 見吐

養臟湯　去生冷益氣溫腸止痢

人參 去蘆　甘草 炙各二　白芍藥

白朮 各半兩　南木香　肉桂 去粗皮各一兩

肉豆蔻　罌粟殼去蒂炙　訶子肉各[illegible]

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七
分空心溫服或入粟米同煎

廣濟療冷熱痢

人參四分　訶梨勒炙　甘草四分炙

茯苓　[illegible]分　榮州櫟皮炙八分

右六味切以水二升煮取一升空大小可一合為
度以瘥止忌如常法

嬰孺治五六歲兒冷痢

當歸　黃連　龍骨各四分

薤白[illegible]　[illegible]各三

赤石脂　厚朴炙　乾薑

酸石榴皮各二分

右切以水三升半煮一升六合為四服相去一炊
久服

雄朱散　治小兒腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛不
可忍

雄黃一分細研　乳香細研　白礬[illegible]

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下
一日三服

[illegible]散　治冷痢大便色青[illegible]則有膿

赤石脂　當歸[illegible]　丁香

白朮各[illegible]　肉豆蔻[illegible]　厚朴各[illegible]

右件搗羅為細末每服半錢以粥飲調下量兒大
小加減

[illegible]痢艾湯

艾葉炒　當歸各一　乾薑炮

木香　訶梨勒皮各[illegible]

右件搗羅為細末每服一錢水八分一盞入粟米
少許煎至五分去滓溫服食前

[illegible]臟湯　治白痢頻併

當歸[illegible]　烏梅肉炒乾　乾薑

黃芩　白朮[illegible]　龍骨各壹

右件搗羅為細末每服一錢水一盞入粟米
各少許煎至五分去滓量兒食前大小加減

聖[illegible]　治秋深冷痢不[illegible]一日動脈中一[illegible]

炷灸[illegible]

寒熱雜合

香[illegible]　治小兒下痢煩渴作痛

南木香[illegible]　黃連[illegible]　吳茱萸

烏梅肉[illegible]

右為末用阿膠半兩銼碎炒服水化為糊候冷入

孔鉢內同前擣末空分作八九作麻仁大亦須頻
服二十三丸至五十丸或七十七丸甘草湯空
心下白痢丸數同前白礬湯空心下赤白交作溫
米清湯空心嚥服

金粟丸　治下痢赤白水穀不化

淨黃連一兩　川芎　枳殼製
穀芽炒　赤茯苓去皮　白芷
南木香各半　神麯一兩半別研

右除木香別剉不過火餘六味焙入木香同為末
用神麯末煮糊丸粟殼大每服七十丸至百丸空

心溫米清湯下或不拘時

白附香連丸　治腸胃氣虛傷乳哺冷熱相雜瀉痢
赤白裏急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連　木香各一分　白附尖二箇

右末飯丸如粟米大每服十丸至二三十丸米飲
下食前日夜各四五服

豆蔻香連丸　治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹
痛腸鳴切痛可効如神

黃連炒三分　肉豆蔻　木香各一錢

右為細末粟米飯丸米粒大每服十丸至二三十
丸日夜各四五服食前粥米飲下

木香丸　治小兒瀉痢[illegible]白膿血相雜

黃連去須以吳茱萸同炒去茱萸各半兩　肉豆蔻煨二箇
木香一分

右為細末麪糊丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢
厚朴湯下空心服

香連丸　治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香　訶子肉各一分　黃連半兩

右為細末米飲和丸如綠豆大每服十丸至三五
十丸食前頻服之

吉氏香連丸　治赤白痢

黃連　木香　訶子皮各一兩
肉豆蔻二箇　子芩半兩

右末蜜丸綠豆大空心煎醋漿湯下大人十丸小
兒五丸空心日午臨卧煎蜜湯下

[illegible]嬰童寶鑑[illegible]下白膿腹痛

聖惠[illegible]治孩子冷熱痢腹痛數日加瘦弱不喫
食腹痛

青木香一分　黃連半兩

右末以蒸餅和丸如梧子大一歲以上空心熟水下一

丸三歲五歲服二丸藥性熱不宜多服忌生冷油

惠救治冷熱痢二物等分

葛氏用炙雞子餅 療小兒秋夏暴冷痢腹脹乍臭乍熱白帶下

右用雞子一枚胡粉一丸碎絹篩合雞子黃白共攪研調熬令熟如常雞子餅兒年一歲一食半餅日再不過二餅即差兒大倍作凡羸弱不堪與藥宜與此餅

王氏手集治大人小兒純膿白痢其効如神脂附丸

大附子一枚

右先用猪脂煎成油半盞許慢煎炮附子令裂湯出放冷削去皮臍銼爲細末以猪肉和丸大人如梧子大小兒如菉豆大每服五七丸至十五二十丸米飲湯送下空心食前服

孝氏家傳治小兒白膿冷痢臍下絞痛

訶子皮　青木香各等分

右件並爲末以粳米飯丸如菉豆大米飲下五丸

長沙醫者丁時發傳附子散　治小兒痢多有白膿腹內疞痛

附子炮去皮臍尖一枚　龍骨　赤石脂各半兩

寒水石　黃丹　胡粉炒

烏賊魚骨燒灰　赤芍藥各一分

右件爲末每服半錢米飲下一日三服

嬰孩寶鑑云小兒痢如膿血者此是赤痢腸虛腸間脂與血俱下故也　又患大小兒血痢者由熱毒折於血血入大腸故也血隨氣行循環經絡通行臟腑常無停滯若爲毒熱所乘遇腸虛血滲入於腸則成血痢也　寶鑑小兒腸熱即痢下鮮血一如腸風

外臺資療小兒熱毒血痢方

犀角十分　地榆六分　蜜三分

地脊草五合

右四味切以水三升煮取二升去滓量大小服之

又方

葱白三兩　香豉二合　梔子綿裹七枚

黃連一兩

右四味切以水二升煮取九合去滓分服

外臺劉氏療小兒血痢方

地榆　黃蘗　黃連

黃芩各六分　馬蘭子二分　茜根一兩

生薑三分

右七味切以水二升煮取一升分服大小量之
一合至二合為度

陳藏器小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血方

右並煮草犀根汁服之更良生水中者名水犀也

食醫心鑑治小兒血痢方

右取生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙匕空心飲之

聖惠治小兒血痢煩熱口乾腹痛黃連散

黃連(去須微炒) 犀角(屑) 白蘘荷根

黃芩 蔓青根 吳藍(各一兩)

白頭翁(三分) 甘草(炙微赤剉) 當歸(剉微炒各半兩)

右件藥搗麤羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減服之

聖惠治小兒血痢不差馬齒莧汁粥方

馬齒莧汁(一合) 蜜(半合) 粟米(一合)

右以水一大盞煮粟米粥後入二味和調食前服之

張渙水蓼丹 治血痢羸瘦

蛇蛻皮(燒灰) 猪牙皂角(去皮炙黃各一兩)

胡黃連 水蓼(以上各半兩各搗羅為細末次用)

硃砂(半兩) 真麝香 牛黃

粉霜(各一分細研)

右件為末入研藥細研軟飯和如黍米大每服五粒
至七粒溫粥飲下量兒大小加減不拘時候

張渙治熱痢聚於血滲入腸胃其病則赤黃連丹方

黃連(去須微炒) 當歸(洗焙乾壹兩) 白頭翁

蔓青根(湯洗焙乾各半兩) 木香

川楝子(各半兩麩炒)

右件搗羅為細末粳米飯和丸黍米大每服十粒
米飲下量兒大小加減

張渙茜根湯 治血痢不差

茜根(剉) 地榆(剉) 黃連(去鬚)

赤石脂 阿膠(炙焦各壹兩) 甘草(炙)

黃蘗(各半兩)

右件藥搗羅為細末每服一錢水八分煎至五分
去滓放溫服

張渙厚腸丹 治血痢腸虛

黃連(去鬚) 川楝子(各壹兩) 木香

阿膠(炙) 吳茱萸(鹽炒) 當歸(洗焙乾各半兩)

右件搗羅為細末粟米飯和丸黍米大每服十粒
米飲下乳食前量兒大小加減

張渙聖功散 治血痢久不差

赤石脂(燒赤)　白龍骨　阿膠(炙)
訶梨勒皮　木香　乾薑(炮)
黃連　甘草(炙各半兩)
右件搗羅為細末每服半錢煎粟米飲調下食前
張渙必效丹　治血痢頻併
用黃連(二兩去鬚)　大棗(半升)　乾薑(壹兩)
白礬(半兩)
右件用瓦器盛鹽泥固濟留一竅子以木炭火燒
煙盡為度取出搗羅為末白麪糊和丸黍米大每
服十粒米飲下量兒大小加減

錢乙附方　治小兒熱痢下血　以之前
黃蘗(去皮半兩)　赤芍藥(四錢)
右同為細末飯和丸麻子大每服一二十粒食前
米飲送下大者加丸數
吉氏家傳治小兒血痢方
右用宣連為末以雞子清和作餅子炙火煅令通赤
便蓋著勿令泄氣候冷細研空心米飲下半錢大
人一錢以意加減服
又方
只用石榴皮燒灰調下好禁金末半錢

吉氏家傳地榆散　治小兒血痢日久不差
地榆(炒)　分　訶子(伍箇炮去皮)　陳槐
黃連(各一錢炒)
右為細末每服半錢或一錢陳米飲下
膿血相雜痢　聖惠夫小兒膿血痢者由熱毒在藏血
得熱則流溢滲入大腸與腸間汁液相搏積熱蘊結
血化為膿腹虛則泄故成膿血痢也
葛氏肘後小兒熱下及赤帶下如魚腦白頭翁丸方
白頭翁(三分)　黃連(六分)　石榴皮(三分無皮用石榴)
檗皮(用)　角膠(三分)

右三物以水二升煮取八合兒生四十日以五合
為三服大者則加藥
肘後乳母方
扁豆莖(一升炙令黃切之)　人參(三兩)
右以水三升煎取一大升半去滓取汁煮粟米粥
與乳母食之亦常濃煮服乳勿冷佳又法乳母常
食粥仍欲乳兒先捻去少許即當佳
肘後近效方療小兒三歲即患痢初患膿少血多四
日膿多血少日夜四十餘行末子丸方服即效
生地黃(汁一小合)　羊腎脂(一小合)

右先濕臍脂令[illegible]分三門服亦效乳母須禁食并

有乳母方在前

千金黄檗湯 治小兒夏月傷暴寒寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽之氣外傷於寒使熱氣便入胃也服此方良若已以利藥下之或以溫脾湯下之則熱劇以利藥下之便數去赤汁如爛肉者或下之不差後以澀藥斷之下既不止倍增壯熱者服之即效或是溫病熱盛復遇暴寒折之熱入腹中下血如魚腦者服之良

黄檗　黄連　白頭翁（一作白歛）

升麻　當歸　牡蠣

石榴皮　黄芩　寄生

甘草（炙各二分）　犀角　艾葉（各一分）

右十二味㕮咀以水三升煮取一升二合百日兒至二百日一服三合二百餘日至期歲一服三合半

千金治小兒赤白滯下雜方 薤白（一把）豉（壹升）以水三升煮取二升分三服 梔蘗子末各壹升以水五升煮三沸百日兒每服三合 亂髮灰 鹿角灰等分三歲兒以水和服三錢七日三[illegible]髮灰水和服三方寸匕 擣石榴汁服之 燒蜂房灰水和服之 生地黄汁白蘘荷根汁各五合微火上煎 單服生地黄汁一合

聖惠吴藍散 治小兒膿血痢如魚腦腹痛

吴藍　川升麻　赤芍藥

龍骨（各一兩）　梔子仁（半兩）

右件藥擣麤羅為散每服一錢水一小盞入豉三七粒煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

樗根皮散 治小兒膿血痢如魚腦困重

臭樗根皮（一分剉微炙黄）　枳殼（半兩麩炒微黄）

黄連（去鬚微炒）　蕪荑（微炒）　赤芍藥（各半兩）

右件藥擣麤羅為散每服一錢以水一小盞入豉三十粒葱白一莖煎至六分去滓不計時候量兒大小分減溫服

人參散 治小兒膿血痢多時不差腹痛羸瘦不欲飲食

人參（去蘆頭）　當歸（剉微炒）　地榆（剉微炙）

阿膠（搗碎炒令黄燥）　黄連（去鬚微炒）　子芩

當歸剉微炒　赤芍藥　蒲黃微炒
厚朴去麄皮塗生薑汁炙令香熟各半兩
右件藥擣麄羅為散每服一錢以水一小盞入薤
白一莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候量兒
大小分減溫服
雞屎礬丸　治小兒膿血痢不差漸加瘦弱
雞屎礬燒灰　龍骨　阿膠擣碎炒令黃燥
黃連去須微炒　胡粉炒各三分
右件藥擣羅為末煎醋為膏和丸如菉豆大每
服以暖漿水下七丸日三四服量兒大小以意加
減

□氏必用黃連阿膠丸　治熱痢下重膿血疼痛腹
中痛不可忍老人產婦虛勞人小兒並宜服
黃連去須一兩　白茯苓　白芍藥
阿膠
右上三物為細末米醋熬膠得所和勻
入臼杵萬下眾手丸如梧桐子大每服自二十丸為
始止於五十丸食前溫米飲下日二三以知為度
未知加藥更丸一等如梧桐子大與小兒服
蟠蔥散　治腸澼下膿血

白石脂一分　髮炒　甘草炙各二分
右為末米汁和二刀圭日二服
張渙建胃丹　治泄利兼膿血日漸羸瘦
黃連一兩去鬚微炒　白礬一分燒令汁盡　烏梅肉炒
龍骨　白石脂　神麴炒
乾薑炮各半兩
右件搗羅為細末醋煮麵糊和丸黍米大每服十
粒米飲下量兒大小加減
青橘丹　治冷熱相交赤白相雜膿血
青橘皮湯浸去白焙　當歸洗焙　黃連

乾薑各一兩　厚朴生薑製　肉豆蔻各半兩
右件搗羅為細末白麵和丸黍米大每服十粒米
飲下食前
長沙醫者王兌傳通神丸　治小兒大人痢疾下膿
血裏急腰重腹疼痛
没藥　五靈脂　乳香各一錢研細
巴豆七粒去皮心
右四味同研令細勻滴水為丸如粟米大每服一
粒生木瓜研水下不拘時候
形證論歌曰五色之痢最多端見此方知有

下痢青色只因驚積黃多食積白痢間白色令虛
腸胃[illegible]赤為積熱[illegible]難安[illegible]成片黑血相
和[illegible]安[illegible][illegible]若[illegible]前急安
藏[illegible]和湯散醫者當心[illegible]人欲[illegible]五色之痢
[illegible]四歲之前始有之青色只因驚積紫黃因食
積[illegible]脾[illegible]積巳知心腎病白多冷[illegible]是脾經三七
以[illegible]氣變動休令多[illegible]飲[illegible]此疾[illegible]須和五藏
[illegible]衛方漸漸安痢如[illegible]腫不進飲食[illegible]只須
調胃散補之

[illegible]王先生[illegible]湯丸 [illegible] 治小兒滯痢五色膿血如爛
痢[illegible]魚腸並無大便只是膿血腸中攪痛 [illegible]

粉霜　輕粉　硇砂各一錢

朱砂一錢　白丁香四錢　乳香一錢

巴豆七粒去皮出油

右為末蒸棗肉丸每服嬰孩三丸如粟米大二三歲如大麻子大四五歲亦如麻子大旋旋丸煎餅湯吞下一日[illegible]之

三十六種內治下五色[illegible]心神煩熱不止方

地榆　白茯苓　黃蘗炙各一兩

右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓分三服

三霜丸　治小兒赤白或五色積痢

巴豆[illegible]　[illegible]粉　粉霜各一錢

右三味同研勻極細別取好黃蠟[illegible]錢酒煮三二沸取出去酒令淨再[illegible]入藥和之如[illegible]煮酒蠟亦得用和成劑油單內盛如服食旋丸如小菉豆大三歲以下如粟米大每服一丸二丸溫熱水下量兒大小加減

黃氏家傳治五色痢兼渴不止方

茯苓　宣黃連　黃蘗各等分

右件取黃蘗末以漿水和[illegible]良久和前二味為丸如菉豆大三歲米飲下七丸殺疳熱水下五丸

至聖丸　治五色痢

厚朴　當歸酒浸　黃蘗

右三味等分細末煉蜜為丸如梧桐子大小兒細丸厚朴湯下每服四十丸加減

定粉散　治䘌痢五色痢

定粉　龍骨　黃丹

訶子

右爲末每服半錢粥飲下三歲以上半錢

下痢石蓮散 治小兒噤口痢嘔逆不食止而復
作

蓮肉去心

右爲末每一錢米飲調服 一方用山藥末米
飲調下亦可

散 治小兒刮腸下痢噤口不食閉眼合口至
重者

精猪肉一兩薄批一片 膩粉

右將肉於炭火上慢炙旋鋪膩粉令成脯每以
少作與喫如未[illegible]食且[illegible]閒[illegible]要喫此方治
胃口有毒至奇至妙

丹 小兒噤口痢[illegible]乳法

厚朴 枳殼各半 白朮
芍藥各半 滑石一兩 木通
陳皮 甘草各伍分

右分四貼細研桃仁柒枚水二盞半煎取一盞與
母服服時去宿乳令盡爲妙

休息痢 用後治下痢經時不止者此成休息方
取龍骨炙令黃焦爲服方寸匕日三服即愈

又方
用龍骨四兩搗如小豆大水五升煮取二升半
之分爲五服效

保生信效松煙餅子 治一切痃癖積滯氣血瘕聚
等一二十年者

細墨焙 芫花醋炒 青礞石
大戟 乾漆炒 五靈脂
京三稜 蓬莪茂 蜜陀僧
陳橘皮去白 牡蠣 巴豆一兩去皮
人參 [illegible]
白丁香 [illegible] 玉露[illegible]
斑猫各一

右同爲細末醋煮麪糊丸如皂子大捏作餅子記
以所傷物煎湯或麪湯送下一丸須以齒嚼爛之
其積漸漸移近下再服再覺移下更一丸則積自
下若尋常要宣轉只以麪湯下血積塊癖經血閉
塞大人小兒久痢腹血休息痢皆治之

玉命丹 治小兒久患赤白痢及休息痢不止腹脹
虛鳴日漸羸瘦好食多喫泥土可食者

硫黃 密陀僧 黃丹

寒水石　白礬各研一兩用新瓦焙乾五味用鹽泥固濟煅令
朱砂研細　麝香一字
右件六味研勻以蒸餅爲丸如小豆大每服十粒用烏梅甘草煎湯下大小加減忌生冷毒物鮓麪等

巢氏病源小兒蠱毒痢候歲時寒暑不調而有毒厲之氣小兒解脫爲其所傷邪與血氣相搏入於腸胃毒氣蘊積值大腸虛者則變痢血其痢狀血色蘊瘀如雞鴨肝片隨痢下此是毒氣盛熱食於人藏狀如中蠱故謂之蠱毒痢也

石壁經脾毒痢歌
痢蠱毒
脾間有毒號純陽不爲[illegible]人[illegible]致使大腸多結澀多饒滴血在後[illegible]眼身熱頭溫腳轉涼[illegible]亦胸高爲此[illegible]先須解熱并開胃便是明醫用藥

此脾受熱積失治則伏毒治當涼脾次去其積[illegible]者更加喘急則不治也　風毒[illegible]與金華散香連丸[illegible]

形證論風毒痢歌
八痢之中風轉難形如青草汁多般病風毒汁滲邪熱胃[illegible]用片片全加赤不須[illegible]下[illegible]閉胖食絕不堪存白痢還須下藏府頻溫得本源

千金治下血狀如雞肝腹中搅痛難忍號蠱毒痢方
茜根　升麻　犀角各參兩
桔梗　黃蘗　黃芩各貳兩
地榆　白蘘荷四兩
右八味㕮咀以水九升煮取二升半分三服此蠱痢血用之小兒分減服

圖經治蠱痢方
側柏葉焙乾　川黃連等分
右二味同煎爲汁服之以治男子婦人小兒大腹下黑血茶腳色或膿血如淀所謂蠱痢者治之有殊效又能殺五藏蠱

子母祕錄小兒蠱毒痢方
右用生地黃汁一升二合分三四服立效

聖惠白蘘荷散　治小兒蠱毒痢不止身體壯熱煩悶
白蘘荷根　川升麻　敗鼓皮炙黃焦
甘草炙微赤剉　乾藍葉各半兩　赤芍藥
犀角屑各參分
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞入豉二七粒煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

黃連散 治小兒蠱毒痢血體瘦

黃連（去鬚微炒） 鼓皮（炙令黃焦） 白頭翁

甘草（炙微赤剉） 當歸（剉微炒） 犀角屑

白蘘荷根 黃芩 茜根（已上各半分）

右件藥搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

犀角散 治小兒蠱毒血痢發歇心神煩悶腹脹不欲飲食

犀角屑 白蘘荷根 地榆（微炙剉）

桔梗（去蘆頭） 蘇枋木（剉各三分） 甘草（炙微赤剉半兩）

右件藥搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

嬰孺蘘荷根湯 治小兒蠱毒痢

白蘘荷根（四分） 犀角（屑） 鼓皮（炙）

升麻（十分） 甘草（炙四分） 蘘荷（壹升）

豉（三合） 芍藥（三分）

右以水四升煮一升二合二歲兒為三服

嬰孺犀角煎 治小兒蠱痢挾毒

地膚子 黃連 葳蕤（各拾分）

藍葉 竹茹 甘草（各一分剉）

錢上升 人參（陸分） 牡蠣（拾分）

梁州榉皮（拾肆分） 乾藍（肆分） 犀角（屑）

甘草（各伍分）

右切以水一斗煮取二升半絞去滓下蜜火上煎餘二升三歲一合三四歲一合半日二夜一量與之

張渙白頭翁散 治蠱毒痢及肛門脫出

白頭翁 黃連（去鬚微炒） 茜根（剉焙乾）

蘇枋木 鼓皮（炙令黃焦各壹兩）

犀角（屑） 地榆（炙剉各半兩） 甘草（炙壹分）

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞煎六分去滓服量兒大小加減乳食前

地榆丹 消毒止痢

地榆（炙剉） 黃連 乾藍葉

川升麻（各壹兩） 苦楝根（各半兩）

右件搗羅為細末煉蜜和丸黍米大每服十粒米飲下量兒大小加減乳食前

寶連丸 治蠱痢

寶連（作一瓣用…作） 肉豆蔻（壹箇去心麪內） 朱砂

入乳香不枯紙裹火煨黃色

木香各半錢　杏仁去皮尖炒研　巴豆去皮心膜出油

右為末醋糊丸如蘿蔔子大陳米飲下七粒赤痢

槐花湯下

寶鑑方　治藏毒下血為吹喘藥不愈者

槐花炒　白礬各等分

右為末每服二錢用陳米飲下

孔氏家傳治藏毒下血方

取薺花根搗末以飲服方寸匕立差　一方可入

地榆與樗根同服

發揮雙金飲　治下痢赤白晝夜頻數及泄瀉經久

列

大罌粟殼去蒂判碎蜜炙炒透焙乾若兩　大川芎判碎醋炒透

錢乾半兩

右二味再㕮咀或焙為末每服一錢至二錢用古米

清湯空心調服或溫蜜湯下

黃金散　治水瀉下痢久不差者

罌粟殼去蒂醋炙一兩　陳皮　甘草不去節一兩炙

一兩生用　烏梅和核壹兩

右碎每服二錢水一盞烏梅二個煎二沸和查傾出盞

內上以盞蓋定候澄清去查空心溫服

神効散　治赤白痢晝夜頻數食減腹痛小便不利

罌粟殼去蒂醋炙炒　乳香　甘草

烏梅和核各壹兩　撫芎各半兩

右碎每服二錢水一盞煎七分空心溫服

補遺補中益氣湯虛熱　四君子湯吐瀉

六君子湯吐瀉　異功散吐瀉

參苓白术散不食

升陽益胃湯

黃耆貳錢　半夏　人參

甘草炙　白术　黃連炒各壹錢

獨活　防風　白芍藥

羌活各伍分　陳皮　茯苓

柴胡　澤瀉各叁分

右水二鍾薑三片棗二枚煎四分食遠服

瀉痢條證

巢氏病源小兒利而渴者，此是水穀利，津液枯竭，臟腑虛燥則引飲，若小便快者利斷渴則止，若小便澁水不行於小腸，滲入腸胃，渴亦不止，利亦不斷，凡如此者，皆身體浮腫，脾氣弱，不能剋水故也，亦必眼瞼生瘡。小兒上焦不潔，今又利下焦虛，上焦熱氣轉而熱氣熏肝故也。茅先生：此為食傷脾胃所致，先用醒脾散、勻氣散，調一日後，下調中飲（不乳食），夾乳香散，渴龍涎膏，渴調理即愈。千金單搗冬瓜汁飲之。

羌活各一分　陳皮　茯苓

柴胡　澤瀉各叁分

右入薑三片棗二枚，煎四分，食遠服。

寒水石　葛根各貳兩

右為末，冷下，飾以渴水，各五合煮散令一沸，去滓，量兒大小服之。

麥門冬湯　療小兒夏月霍亂吐下後胃中虛熱渴

麥門冬去心　甘草炙各貳分　人參

黃芩　人參各叁分　龍骨陸分

右六味，以水二升煮取九合，去滓分溫服。

外臺橘皮飲子　療小兒渴痢

梁州橘皮　薤白　茯苓各

人參　粟米貳分

右五味切，以水三升煮取一升二合，去滓分服，量大小與之。

又療小兒痢渴不微，腹滿不能食方

訶梨勒皮陸分　桑根白皮

右二味切，以水一升煮取五合，去滓分服之，亦治渴痢兼

大人

子母秘錄　小兒赤白痢渴，及得水喫又嘔逆方

右炙楮葉令香黃，以飲漿半升浸楮葉，使水綠色，然後去葉，以木瓜壹箇切，內葉汁中，煮三二沸，去木瓜，使暖細細服，渴便

聖惠黃耆散　治小兒痢渴，心胸煩悶，不欲飲食

黃耆　麥門冬去心　黃芩各叁分

烏梅肉　龍骨　白朮

黃連各

右件藥搗羅為散，每服一錢，以水一小盞煎至

五分去滓不計時候量兒大小分減溫服
黃芩散 治小兒痢渴不止
黃芩 訶梨勒（煨用皮） 樗株皮（各半兩）
款鄒根 黃連（去鬚） 當歸（各剉微炒 叁分）
烏梅肉（壹分 微炒）
右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減溫服
當歸散 治小兒痢渴腹內疼痛不止
當歸（剉 微炒） 黃連（去鬚 微炒） 黃芩（剉 各叁分）
乾薑（炮裂 剉） 甘草（炙微赤 剉 各半兩）

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減溫服
龍骨散 治小兒痢渴煩熱腹痛
白龍骨（壹兩） 胡黃連（三分） 茯神
人參（去蘆頭） 黃芪（剉） 麥門冬（去心焙 各叁分）
右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減溫服
藍葉散 治小兒痢渴煩熱不止
藍葉（半分） 赤茯苓（壹分） 赤石脂（壹兩）
黃連（微炒 去鬚） 冬瓜仁 酸石榴皮（剉 微炒）

各半兩
右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓入蜜半茶匙更煎三兩沸不計時候量
大小分減服之
地榆散 治小兒痢渴或下五色惡物心神煩熱不
止
地榆 白茯苓 黃檗（微炙剉 各壹兩）
右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減服之
黃連散 治小兒痢渴煩熱與水不知足

黃連（去鬚 微炒） 牡蠣（燒為粉） 烏梅肉（微炒）
甘草（炙微赤 剉） 訶梨勒（煨 用皮 各壹分）
右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減溫服
樗皮散 治小兒痢渴不止
樗株皮（壹兩） 蘆根 白茯苓（各叁分）
人參（半兩 去蘆頭）
右件藥搗細羅為散不計時候以粟米飲調下半
錢量兒大小以意加減
甘草散 治小兒痢渴不止

甘草炙剉 烏梅肉微炒各 訶梨勒用皮
右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小盞入生
薑少許煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小
分減服之
黄芩丸　治小兒痢渴不止壯熱腹痛
黄芩　蘆根　黄連去鬚微炒
當歸剉微炒各三分　兒伢條皮炙微剉
訶梨勒煨用皮各半兩　烏梅肉微炒焙
右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥
飲下七丸日三四服量兒大小加減服之

太醫局人參散　調中和氣止嘔逆除煩渴治昏困
多睡乳食減少及傷寒時氣胃氣不順吐利止後
躁渴不解
人參去蘆　白茯苓去皮各　木香
甘草炙剉　藿香葉各壹分　乾葛剉貳兩
右件爲末每服一錢水一中盞煎七分去滓放溫
服不計時候
嬰孺子芩湯　治小兒大熱痢兼渴增寒
子芩　枳殼炒　黄檗各肆分
石膏拾貳　竹葉切壹升　橡皮拾分

人參柒分
右以水五升煮一升六合七歲兒爲三服四五歲
兒爲四服以次量與之服
蘆蘆湯　治小兒有熱不嘔渴痢
蘆蘆　知母　茯苓各捌分
甘草　黄檗肆分　人參陸分
黄芩　橡皮各拾分
右以水五升煮一升半五六歲兒爲三服
冬瓜湯　治小兒渴不止煩不住
冬瓜切一合　蘆蘆貳分　茯苓
知母各捌分　麥門冬去心伍分　一粟米壹合

右水五升煮一升四合新布絞去滓量兒與之
張渙延胃散　治洩瀉熱煩渴
厚朴去粗皮生薑汁炙　川黃連
肉豆蔻各壹兩　縮砂仁　乾薑炮
白朮炒　木香各半兩
右件搗羅爲細末每服一錢水一小盞入生薑粟
米少許煎至五分去滓溫服
碧香丹　治小兒吐利後大渴不止不得眠睡甚則
成癇

天竺黃　龍骨　不灰木（燒赤放冷）
赤石脂（各壹兩別為末）　鉛粉　定粉
鉛白霜　細蛤粉（各壹兩好者研細）
右件通拌勻入麝香半兩同研勻滴水和丸如雞
頭大每服一粒至兩粒用蜆螺兒兩箇研細沸湯
浸水沉極冷化下大効郎與服神驗
寶鑑竹茹丸　治小兒吐瀉
黃連（壹兩切如豆大）　茱萸（壹兩）（二味相和同作一處炒令黃赤色去了茱萸）
右件為末薄糊為丸如蘿蔔子大每服十丸竹茹
煎飯飲吞下

人參白朮散　治脾胃不和不思飲食吐瀉渴水
及小兒虛熱煩躁
人參　白扁豆　白朮
茯苓（各壹兩）　罌粟子　甘草（炙）
山藥（各半兩）
右為末每用二錢水一中盞入薑二片棗半箇同
煎至七分通口服如腹疼痛加紫蘇煎小兒虛熱
加薄荷同煎
吉氏家傳治水瀉嘔吐不歇肚脹不食方
訶子皮　桑白皮（各等）

右水二升煎三合服之立效
吉氏六神丸　治痢瀉渴飲無度
木香　丁香　豆蔻（以麪裹煨此三味入慢火煨候熟去麪）
使君子（去殼）　訶子（去核各半兩）
蘆薈（壹兩）
右件為末棗肉丸如菉豆大每服三五丸米飲吞
下
聖惠黃連散　治小兒久赤白痢不止腹痛羸
弱不欲飲食
黃連（壹兩去須微炒）　厚朴（去粗皮塗生薑汁炙令香熟）

乾薑（剉炮裂）　木香　艾葉（微炙）
龍骨（各半兩）　當歸（剉微炒）　黃牛角䚡（燒灰各三分）
烏梅肉（壹分微炒）
右件細末每服以粥飲調下半錢日三四服量兒
大小加減服之
黃蘗丸　治小兒久白痢腹脹疞痛
黃蘗（微炙）　當歸（剉微炒）
右件藥搗羅為末煨大蒜和丸如菉豆大每服以
粥飲下七丸日三四服量兒大小加減服之
木香散　治小兒久赤白痢腹脹疞痛

木香　訶棃勒（煨用皮）　臭樗樁皮（微炙）

木賊　黃連（去鬚微炒各半兩）

右件藥搗細羅爲散，每服以粥飲調下半錢，日三四服，量兒大小以意加減

肉豆蔻散　治小兒久赤白痢，腹内疞痛，全不思食，漸至困羸

肉豆蔻（去殼叁枚）　青橘皮（湯浸去白瓤焙）　黃牛角䚡（炙令黃焦）

當歸　地榆　厚朴（去粗皮塗生薑汁炙）

（令香）　黃連（去鬚微炒各半兩）　乾薑（炮裂剉）

右件藥搗細羅爲散，每服以粥飲調下半錢，日三四服，量兒大小臨時加減

龍骨丸　治小兒久赤白痢不止腹痛

白龍骨　黃連（去鬚微炒）　黃蘗（微炙剉）

木香　訶棃勒（煨用皮各壹分）　胡粉（叁錢炒）

白礬（燒令汁盡）　乾薑（炮裂剉）　當歸（剉微炒各半兩）

右件藥搗羅爲末，煉蜜和丸如菉豆大，每服以粥飲下五丸，日三四服，量兒大小臨時加減

錢氏小香連丸（見前）

張涣順胃丹　治瀉利無度腹痛

肉豆蔻　乾漆　肉桂（各壹兩）

白朮（炒）　肉豆蔻仁（各半兩）

右件搗羅爲細末，白麪糊和丸如黍米大，每服十粒，粟米飲下，量兒大小加減

建中丹　治泄注不止，腹痛多啼

胡椒　蓬莪茂　肉豆蔻（各半兩）

全蠍（壹分）

右件爲細末，白麪糊和丸如黍米大，每服十粒，米飲下

九籥衛生固氣丸　療小兒脾胃虛怯，泄瀉腹痛

用絕大肉豆蔻壹枚，剜空，填入通明乳香壹塊，用酵麪裹，慢火内煨候麪熟爲度，去麪不用，將肉豆蔻乳

香同爲細末，麪糊和丸如菉豆大，每服二十丸，乳食前米飲下

張氏聖餅子　治小兒久瀉腹痛脱肛下血

神麯（壹兩）　膩粉（壹錢）

右件二味拌令勻，後以雞子清調拌上件藥，稀稠得所，捏作餅子如錢大小，於火上炙令黃熟，每服一餅，於食前空心同油餅喫之，後進飲少許

吉氏紫朮丸　治小兒久積，胸高羸瘦，赤白痢疾，肚腹[illegible]

丁頭代赭石（半兩火煅醋淬五遍） 杏仁（貳柒箇去皮尖）
乳香 朱砂 木香（各壹分）
宣黃連（壹分去鬚） 輕粉（半錢） 麝香（少許）
肉豆蔻（壹箇麪裹煨） 巴豆（拾粒去皮出油）
右為末麪糊為丸如梧桐子大每服七丸至
十五丸紫蘇飯飲吞下
張氏云小兒腸胃虛弱受風冷（[illegible]）則下利
後脾胃尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦
劉氏療小兒痢後虛羸手足心熱痢雖未斷亦可
服之方

陳橘皮 生薑（各壹分）
右一味切以牛乳半升煎取四合去滓分溫服之
聖惠桔梗丸 治小兒久利不斷肌體羸瘦食不消
桔梗（去蘆頭） 神麴（微炒令香） 麥蘖（[illegible]）
烏梅肉（微炒） 厚朴（去粗皮塗生薑汁炙令香熟）
白朮 人參（去蘆頭） 赤石脂
黃芩 龍骨 桂心
甘草（炙微赤剉） 黃連（去鬚微炒） 黃雌雞骨（壹具[illegible]）
（已上各半兩[illegible]）
右件藥擣羅為末煉蜜丸如菉豆大每服以粥飲
下五丸日三服量兒大小加減服之
雄黃散 治小兒久痢不差羸瘦壯熱毛髮乾焦不
能飲食
雄黃 蘆薈 青黛
朱砂 熊膽 麝香（各細研）
龍膽（去蘆頭） 黃連（去鬚微炒） 黃蘖（微炙剉）
當歸（[illegible]） 白芷 細辛
胡黃連（[illegible]） 蟾蜍（[illegible]） 乾蝦蟆（[illegible]）
右件藥搗細羅為散入研了藥更研令勻每服以
井華水調下半錢日三四服量兒大小以意加減

雞子粥 治小兒下痢不止瘦弱
雞子（壹枚） 糯米（壹合）
右煮粥臨熟破雞子相和攪勻空腹入少醋食之
張渙龍骨湯 治小兒痢久成疳漸漸黃瘦
龍骨 訶黎勒皮（煨） 赤石脂（各半兩）
醋石榴皮（炒黃） 木香 史君子仁（各壹分）
右件搗羅為細末每服半字至一錢煎麝香湯調
下
嬰孺惠濟論小兒痢疾後疳身體候狀 今痢日久
以脾治疳身浮腫小兒以脾虛氣化為水充四肢

間或有之腑氣腫消爲上法氣平兩日定多尿黃皮
食從還發滯此疾元因積損脾
惠濟論塌氣散
蘹香　白牽牛　甘草各炒
木香各壹分
右爲末每服半錢紫蘇湯下
□□勿散　治小兒因吐利氣虛津液減耗生疳
□□水不休面肺腳浮腹大頭細小便利白金
□□嗅食
乾葛　白芷各弍兩一兩炒　黃芪一兩半炒
湯泡去皮尖麩炒黃　細辛去土二兩一兩　黃丹二兩炒紫色一兩
兩生用
右同爲細末每服半錢倒流水調下

腹痛

蓋夫腹痛者多因邪正交攻與臟氣相擊而作也挾熱而痛者必面赤或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷而痛者必面色或白或青手足冷者見之冷甚而變證則面黯唇口俱黑爪甲皆青矣熱證四順清涼飲裏熱加青皮枳殼冷證七氣湯加辣桂調蘇合香丸若邪正交攻冷熱不調桂枝枳殼湯加青皮陳皮木香當歸爲妙若內吊等證則釣藤散方見其餘則芍藥甘草湯爲要藥也蓋痛有熱者大柴胡湯傷寒主之心腹痛甚有實熱者大承氣湯傷寒下之腹痛桂枝加芍藥痛甚桂枝加大黃見方證

薛小兒腹痛口中氣冷不思飲食脾土虛寒也用調中丸食不乳主之口中氣溫大便酸臭積痛也用下積丸治之面赤壯熱或手足並熱實熱也用瀉黃散脾瀉之面黃微熱或手足並溫虛熱也用異功散見寫補之若作渴飲湯胃氣虛熱也用白朮散渴若痛連兩脇肝木乘脾也用四君子湯加柴胡芍藥若腹痛重墜脾氣下陷也用補中益氣湯加升麻若手足指冷或吃逆泄瀉寒水侮土也用六君炮薑肉桂不効

急加附子若服剋滯之藥致腹作痛按之不痛脾氣
復傷也用五味異功散中脘痛者屬脾少腹痛者屬
腎按之痛者爲積滯不痛者爲裏虛積滯者消之虛
者補之　婁氏分肉腹乾哭無淚者爲盤腸內釣痛
面晄白不思食爲胃冷痛　面赤唇焦便黄爲熱
痛　面黄白大便酸臭爲積痛　口淡而沫自出爲
蟲痛　曾氏又有藏寒痛鎖肚痛盤腸痛蟲痛
治腎痛偏墜痛寒疝痛　各有治法今悉列於後
茅先生歌云面青唇青面白痛自可黑色如青瓜一
同此是腹心生冷痛須將溫藥裹頭攻　錢氏云胃

虛冷面晄白色腹痛不思食當補益脾益黄散主之
若不下利者調中丸主之（益黄散治下利而痛也調中丸治不利而痛也）
曾氏臟寒痛議附胎寒論後
益黄散（方見脾）
調中丸
白朮　人參　甘草（炙各半兩）
乾薑（炮四錢）
右爲細末蜜丸如菉豆大每服五七丸至十五丸
食前温水下（[illegible]）
當歸散　凡小兒夜啼者藏寒而腹痛面青手冷不

吐乳是也宜此方服之效
當歸（去蘆頭）　白芍藥　人參（各壹錢）
甘草（炙分）　桔梗　陳皮（各壹分）
右㕮咀煎五分時時少服愈
七氣湯　治七氣所傷痰涎結聚心腹亦痛不能飲
食
半夏（湯洗伍兩）　人參　辣桂（去皮各壹兩）
甘草（半兩）
右剉細每服三錢水一大盞薑五片棗一枚煎食
前服

指迷七氣湯　治七情相干陰陽不升降氣道壅滯
攻衝作疼
青皮　陳皮　桔梗
蓬朮　辣桂　益智仁（各壹兩）
香附子（壹兩半）　甘草　加半夏（製各半錢）
右剉細每服三錢水一盞薑四片棗一枚煎至七
分不拘時服
張渙寬中湯　治心腹疼痛不可忍者
高良薑　木香（各半兩）　丁香
青橘皮（去白）　桔梗　甘草（炙各壹分）

右件擣羅爲細末每服半錢溫酒調下

蓬莪朮丹

蓬莪朮（炮製蓬莪朮熱剉碎） 當歸（洗焙乾各壹兩） 木香

人參（去蘆頭） 桂心（各半兩） 黑牽牛（炒微黃壹分）

右件擣羅爲末細白麵糊和丸如黍米大每服十粒煎生薑湯下量兒大小加減

溫胃丹 治腹痛啼哭不止

人參（去蘆頭） 白朮（炮各壹兩） 五味子

當歸（洗焙乾） 高良薑（各半兩） 木香（壹兩）

右件擣爲細末白麵糊和丸如黍米大每服十粒米飲下

橘香散

青橘皮（去） 吳茱萸 木香

當歸（洗焙乾各壹兩） 乾薑（炮） 丁香（各半兩）

右件擣羅爲末每服一錢水八分一盞入生薑二片煎五分去滓放溫熱服食前

曾氏藿香湯 和脾胃進飲食理腹痛散邪氣

藿香（少） 良薑（剉碎用東壁土炒各壹兩）

蒼朮（米泔水浸一宿去粗皮剉片炒至微黃色貳兩） 甘草（炙壹兩）

右剉焙爲末每服一錢燒鹽湯空心調下

熱痛 錢氏云熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤黃與三黃丸人參湯下

嬰孺治小兒腹痛大叫不能哺乳茯苓丸方

茯苓 黃連（各等分）

右爲末用蜜爲丸如大豆大飲下量加

積痛 錢氏積痛口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者白餅子下之後和胃用白朮散（消積丸白餅子方見癖 白朮散方見渴）

曾氏積痛腹中陰陰而痛面黃不食兒大者口吐酸餿氣先治積滯後調脾胃其痛自止仍辨虛實和解治法見後癖積條中

湯氏三稜散 治積氣肚痛

砂仁 甘草 益智（炒去殼）

三稜 蓬朮 青皮（炒各等分）

右爲末白湯點下

張渙云食積腹痛必用紫蘇萊菔子之類 初虞世治小兒好吃餘成此痛用黃連白酒藥等分爲丸服

蟲痛 蟲痛面㿠白口中沫及清水出發痛有時 田氏云蟲痛啼哭俯仰坐臥不安自按心腹時時大叫面無正色或青或黃或白又目無精色口吐

涎沫此為蟲痛　錢氏云積痛食痛虛痛大同小異
惟蟲痛者當口淡而沫自出治之隨其證用藥　曾氏云蟲
痛相似小兒本怯故胃虛冷則蟲動而心痛與癇略
相似但目不斜手不搐也安蟲散主之　曾氏云蟲
蟲動痛口吐清水涎沫或吐出蟲痛不堪忍其痰因
甘肥當脾太早而得故胃寒蟲動作痛其蟲出來
或生或死兒小者此痛甚者亦致危篤先以理中湯
加烏梅水煎服使胃煖不逆次服蕪荑丸使君
子丸化蟲飲主之有兒大者面皖白而間黃色肉食
倍進肌體消瘦腹中時復作痛此有血鱉蛔蟲雜乎
腹痛蟲痛 ■ 初科七　一百吉
其間以二聖丸下之　又有胃受極寒極熱亦令蟲
動或微痛或不痛遽然吐出法當安蟲為上若以治
蟲反傷胃氣固不可也因寒而動者用理中湯加烏
梅水煎服因熱而動者用淡四五苓散亦加烏梅水
煎服　辛氏女子五歲病蟲痛諸醫以巴豆乾漆
硇砂之屬治之不效至五日外多哭而俛仰睡卧不
安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑
目無光而慢動口吐沫至六日胸高而卧轉不安召
錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚
曰此病大困若更加瀉則為逆矣至次日辛見錢曰

夜來三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見
有丸藥錢曰此子肌厚當瀉今而反虛不可治也
辛曰何以然錢曰脾虛而冷則蟲動而今反目青此
肝乘脾又更加瀉知其脾不虛也而丸藥隨瀉下即
脾胃已脫兼形病不相應故知死病後五日昏篤七
日而死

錢氏安蟲散　治小兒蟲痛
胡粉炒黃　鶴虱炒黃　川楝子去皮核
白礬鐵器枯
右為細末每服一字大者五分米飲調下痛時服
腹痛蟲痛 ■ 初科七　一百吉
治蟲動痛極不可忍用乾漆半兩槌碎燒存性生用窨
老壺規再煆細研三分一處為末空心熱酒調良
久取下蟲立愈
又方用乾漆半兩搗碎炒令煙盡出用新汲水入生
麻油空心調下

錢氏安蟲丸　治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛
乾漆三分杵碎炒煙盡　雄黃　巴豆霜一錢
右為細末麵糊丸如黍米大量兒大小服之取東引
石榴根煎湯下痛甚者苦楝根或蕪荑湯下五七丸至
一二三十丸發時服

蕪荑散　主治同前凡小兒病時便高聲大叫
上鼻頭各口一時黑色脉法當沉弱而弦今反浮
大是蟲證也
白蕪荑　乾漆（炒各等分）
右為細末每服一字或五分或一錢米飲調下發
時服
使君子丸　治腹內諸蟲作痛口吐清水
使君肉（薄切屋瓦焙乾）　檳榔　酸石榴根皮（洗
者佳淨洗剉焙）　大黃（半生半炮各半兩）
右除檳榔剉屬不過火餘三味再焙同檳榔為末
（煉）砂糖水煮麵糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸
（臨痛）食前（幼科全書）
淡豬肉汁空心下或雞肉汁亦好
化蟲飲　消化蟲毒在腹作痛
檳榔　酸石榴根皮（淨洗焙乾各壹兩）
紅丹（煅過）　雷丸　貫衆（如雞頭大者佳）
使君子肉（薄切焙各）　甘草（炙）
枳殼（麩炒去穰）　大黃（各等分）
右為細末用清油煎雞子一枚如春餅樣候冷挑
藥末一錢於上攤勻空心捲而食之兒小者用糯
米粉米煮糊丸粟殼大每服十五粒至三十丸以

淡豬肉汁空心下雞肉汁亦好
二聖丸　治腹內諸蟲及消穀逐水下氣去風
檳榔（一兩）　巴豆（去殼膜心人淨搥去油）
右檳榔剉曬為末巴豆碎切作兒鉢內極細杵仍
入檳榔末同研杵勻麵糊丸菜豆大每服七十七
丸至九十九丸用溫茶清五更初空心止一投藥
見蟲下盡止以稀粥自安
（鎖）肚痛一月後嬰孩忽乳不下咽肚硬如石赤如
米撮口而哭面青唇黑手足口氣俱冷是也始因斷
臍帶不緊為風冷所乘證亦危急以白芍藥湯烏
梅散二字金（撮風散）投之日久則難愈更參考臍風證
內議論
烏梅散　治腹痛及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾
烏梅（去核）　玄胡索　粉草（半生半炙各五錢）
乳香　沒藥　釣藤（各半兩）
右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分空心溫服
盤腸內釣　湯氏小兒腹痛曲腰乾啼無淚面青白多
黑肢冷為盤腸內釣凡有此證急煎葱湯淋洗其腹
揉之葱熨臍腹間良久尿自痛中出其疼立止續次
服藥

乳香　沒藥（各研）

右件末香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調乳沒末此藥只一服效

盤腸　小兒盤腸氣者痛則曲腰乾啼額上有汗皆由肝經風邪所搏也肝腎居下故痛則曲腰乾啼者風燥其液故無淚也額上有汗者風木助心火也口閉足冷者脾氣不營也下利青糞者肝木乘脾也皆由產下澡洗受風冷所致當服鈎藤膏之類若乳母及兒受寒邪者用沉香湯之類若兒額間有汗口閉脚冷虛寒也用當歸散（見前）或沉香降氣湯之類若面[illegible]焦小便不通小腹脹痛者乃小腸熱也用人參[illegible]二黃丸若因乳母飲食停滯者用保和[illegible]懷抱氣鬱者加味歸脾湯[illegible]怒動肝火者[illegible]味逍遙散[illegible]俱服益佳

[illegible]氏鈎藤膏　治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內釣

乳香（研）　沒藥（研）　木香　薑黃（各[illegible]）　木鼈子仁（[illegible]）

右先將後三味同爲細末次研入上二味煉蜜和劑收貯每一歲兒可服半皂子大餘以意加減

煎鈎藤湯化下無時次用魏香散

魏香散

蓬朮（半兩）　阿魏（一錢）

右先用溫水化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾爲細末每服一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

蒜乳丸　治冷證腹痛夜啼

大蒜（一顆慢火煨香熟研爛）　乳香（五分另研）

右研爲丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下

與香散　治小兒諸般吊證角弓反張胸高臍凸

用透明沒藥一味爲末薑湯調下

癥瘕[illegible]　癥瘕癖痛乃積久所致由榮衛俱虛外則感受風寒內則過傷乳食停滯既久不能尅化故邪併於陰爲癥[illegible]而不移邪併於陽爲瘕假物象形動而不忍若久而不治亦成脾癖積或兩脇間有塊如石按之則痛不按則輕或面黃肌瘦肚硬而脹及有青筋[illegible]夜熱潮熱無時乳食減少愛喫泥土或大便酸臭痛則身冷如冰法當調脾養胃用醒脾散（[illegible]）參苓白朮散（[illegible]）不乳磨積理脾用化癖丸（[illegible]）三稜散（[illegible]）木香蒜朮丸（[illegible]）治癥瘕沒石子丸（[illegible]）沉香檳榔丸（[illegible]）然此積滯之疾非七劑可療必須

次第調理則日久自然平復
[illegible]始則腹内一小長塊其硬如石從腰而傳或
左或右良久痛甚則見於皮下不妨乳食其脉生因
有孩未解未盡遽爾下之太過氣虛痰搏結而成
治宜益氣理虚用參苓白朮散不食沉香檳榔丸癖
木香蕤木丸宿食爲治或間投白芍藥湯痛加人參
白朮茴煎服
治法詳癖門　按癥瘕痃癖四證大同小異治
亦無大分別以不必强立名亦可也
治[illegible]腎痛證治在陰腫門
寒疝痛證治在疝門
芍藥甘草湯　治出疹肚疼腹滿小便不通
芍藥壹兩　甘草半錢
右剉散白水煎服
聖惠人參散　治小兒空吐下腹痛不止
人參去蘆　當歸各半兩　甘草炙微赤剉
乾薑炮裂　黃耆各剉分　細辛壹分
右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓稍熱服量兒大小以意加減頻服
錢乙附方和中散　和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛
思食
人參去蘆　白茯苓　白朮
甘草剉炒　乾葛剉　黃耆
白扁豆炒　藿香葉各等分
右爲細末每服三錢水一盞乾棗一箇去核薑五
片煎至八分食前温服
外治　莊氏家傳小兒未能語啼哭不能辨者當以手
候其腹如有實硬處即是腹痛治之方研生薑取汁
[illegible]温調麪成糊塗紙上貼臍心立定

腹脹

【鑒】腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用紫霜丸、白餅子（[illegible]）不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛甚即目胞腮腫四肢黃色宜之用塌氣丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香橘皮豆蔻大溫散藥治之何以然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以溫散藥治之使上下分消其氣則愈矣若氣虛已出附肺而行即脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛則不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四肢面目腫若水狀皆氣脹浮於肺即大喘也此當用塌氣丸（[illegible]）虛衰未復故也（此下後喘[illegible]）

治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇不出林以兵攻之必可獲寇若出林不可急攻攻則必有失當以意漸收之即順也（[illegible]）

塌氣丸（錢氏方）治小兒虛脹腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而後有積所治宜先補脾然後下之後又補脾即愈也不可補肺恐生虛喘

【醫】古腹脹虛實　凡久病吐瀉之後虛則其脈微細肺主目胞及腮脾主四肢若色淡黃目胞腮虛腫手足冷先服塌氣丸後服異功散和中丸四君子湯益黃散之類用諸溫藥養其氣（[illegible]）實則脈洪實不因吐瀉久病後亦不因痢下腹脹而喘急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜

服白餅子大黃丸解毒丸下之兼須詳認大小便如都不通先利小便後利大便（[illegible]）

雲岐云小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃躁悶煩亂者宜瀉青丸

【醫】東垣云寒脹多熱脹少皆主於脾胃虛者宜用六君子湯若喘而氣短者脾肺氣虛也用異功散補之若服剋伐之類而喘脹益甚者脾肺之氣復傷也用前湯加半夏升麻若既下而不喘則邪氣去而肺氣寧也不必用藥或病久小便不利或四肢浮腫者脾肺之氣虛不能通調水道也用金匱加減腎氣丸主

之或手足逆冷睡而露睛脾胃虛寒也用六君子加炮薑手足不冷睡而露睛脾胃虛弱也用六君子湯若面色青木剋土也用六君木香柴胡更當調治乳母節其飲食恐藥餌過劑復傷胃氣故也　一小兒腹脹面赤痰喘大便秘壯熱飲冷此形病俱實用紫霜丸一服諸證益甚面色頓白飲湯不絕余以為邪氣退而真氣復傷故面白而喜湯用白朮散大劑煎湯令恣飲良久而睡翌日頓安　一小兒傷食腹脹胸滿有痰余治以異功散而痊後復傷食腹脹兼痛或用藥下之痛脹益甚而加氣喘此脾胃傷而致肺虛也用六君子加桔梗調補而痊　一小兒腹脹惡食發熱惡心證類外感余曰此飲食停滯也用保和丸一服諸證頓退惟腹脹用異功散而痊　一小兒傷食腹脹服剋伐之劑小便澀滯又服五苓散之類飲食漸減小便不通四肢頓腫余朝用金匱腎氣丸去附子夕用補中益氣湯而安　一小兒腹脹大便青白腹左一塊面色痿黃肌體小瘦飲食少滯頗余用異功散調補中氣為主佐以大蕪荑湯消疳治熱月餘諸證稍愈仍服異功散及蚵蚾丸外貼阿魏膏兩月塊消左脇微痛用四君子湯九味蘆薈丸而愈

百問云有痢脹氣脹癥積脹鎖肚脹疣脹胸脹食脹蚘脹虛冷積脹其痢氣積壞宜先與保童兼塌氣以去之其疳癖氣脹痢後脹宜一按以消疳其鎖肚脹宜與珍珠大麻丸以消之其上膈中脘食傷膨脹宜三棱塌氣大茶迎丸以消磨之其蚘脹宜下蟲丸以之其虛冷積脹宜沉香煎以溫之以上諸證宜調氣消磨通利腫脹必然平復矣如有實者必以牽牛等藥以治之推氣丸劑亦可用　按百問之雖詳而偏於攻下若無鍼灸活法薛氏補法以之鮮不殺人慎之

塌氣丸

胡椒　蠍尾

右為末糊丸如粟米大每服五七丸至一二十丸陳米飲下無時　一方有木香壹錢

錢氏潔古所用塌氣丸乃此二味不可誤用後有牽牛者慎之

本事調中丸　治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑　橘紅　白朮

茯苓　木香　砂仁

官桂　良薑各等分

右細末糊丸如麻子大每服二三十丸食後熟水下

聖惠治小兒脾虛腹脹不能乳食訶梨勒丸

訶梨勒皮煨用 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 乾薑炮裂剉

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

甘草炙微赤剉 木香 白朮

人參去蘆頭各壹分

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大小加減服之

張氏溫脾散 治脾胃虛損腹脹虛脹乳食不進困倦無力

訶子肉 人參各柒錢 白朮

木香 桔梗 茯苓

藿香 陳皮 黃耆各伍錢

甘草炙貳錢半

右每服二三錢薑棗水煎

沉香煎 治脾氣冷積

乳香 沉香 丁香

杏仁炒 百草霜 木香各壹錢

肉豆蔻壹箇煨 巴豆拾四粒出油如霜

右為末酒煮麵糊丸如菉豆大每服三五丸淡生薑湯飲下 疳患肚大不可服之效常服以通為度

三因肥兒丸 治小兒病多因缺乳喫食太早所致或因久患臟府胃虛蟲動日漸羸瘦腹大不能行髮堅發熱無精神

黃連 神麴各壹兩 麥芽炒半兩

木香貳錢 檳榔壹箇不見火 使君子

肉豆蔻麵裹煨各半兩

右為末糊為丸如桐子大每服二三十丸量兒加減熟水吞下

六神丸 治如前證

丁香 木香 肉豆蔻用麵裹煨各伍錢

訶子煨去核半兩 使君子 蘆薈研各壹兩

右為末以棗肉和丸如麻子大每服五丸至七丸溫米飲下食前

治小兒疳病或腹大

胡黃連貳錢半 阿魏壹錢半酒浸研 神麴貳錢炒

黃連炒貳錢 麝香少許

右為末每服十二粒白朮湯下

消丸子 治府腫脹

蘿蔔子（一兩半微炒）　陳皮　青皮
檳榔　五靈脂　蓬朮（煨）
黑牽牛（取頭末半生半炒）　赤茯苓（各半兩）
木香（一錢半）
右為末，麪糊丸菉豆大，每服十五丸，紫蘇葉或白
湯下

五疳保童丸　治五種疳疾
五倍子（生）　青黛（一兩）　夜明砂（以布裹洗）
苦楝根皮　蘆薈　熊膽（研入）
黃連（去毛）　龍膽草（生用）　乾蟾（酥炙去骨）
麝香（研入）　蕪荑（去皮）　蟬退（去土，各等分）
右末，用粟米糊為丸麻子大，一歲兒二十丸，飯飲
下，二三服

幼科有丁奚哺露無辜等名，其證腹大頸小黃瘦，皆
疳脹之異名也。昔人因為此重則為積耳，今仍舊別立
門於疳後

楊氏塌氣散　治小兒腹脹氣喘，諸腫面浮
胡椒（一分）　青皮（去穰，以巴豆二十一粒同炒黃，去巴豆）
甘草（炙，各半兩）　黑牽牛（二兩半，半生半炒）
肉豆蔻（一箇，煨熟）

右末，半錢，米飲調下，加檳榔一箇

塌氣丸　治小兒肝氣腹脹喘急，并面浮腫
丁香　胡椒（各一分）　蘿蔔子（炒）
白牽牛（各半生半炒）
右為末，麪糊丸小豆大，二三歲三十丸，米湯下

塌氣散　治小兒腹脹，氣麤并疳疾相攻，面目浮腫
木香（一兩）　青皮（半兩）　巴豆（三十粒同炒黃色，去巴豆）
右為末，三歲半錢，米湯下，食前，連進即效

分氣飲　治小兒腫脹作喘，氣短而急
桔梗　赤茯苓　陳皮
桑白皮　大腹皮　枳殼（炒）
半夏（製）　蘿蔔子（微炒）　紫蘇
甘草（炙，各一兩）　草果仁（一兩）
右剉散，每服一錢半，薑棗煎服

三稜煎丸　治嬰孩食傷生冷甜膩毒熱等物，脾胃
積滯久不消化，令兒肚熱腳冷，痞癖寒熱及療癥
瘕中脘不和，腹脹上膈氣噎，心腹不得宣通，所以
作疾。此藥溫良，但見結積，乳食不化，並宜與服
京三稜（煨成塊）　蓬朮（半兩，並炮，各）　芫花（醋浸，二兩半）

醋中煮去醋米醋半兩 淡豆豉三錢 巴豆粒去殼

川當歸半錢 杏仁去皮尖二錢

右前四味一處以少醋一盞煮令乾仍用炒起焙

細剉焙為末次入當歸木香仁巴豆淡豆豉和勻

水煮麵糊為丸麻子大每服二十丸薑湯下大小

加減服之

三稜丸 治小兒停積腹脇脹滿乾噦惡心全不入

食

三稜煨 木香 神麴炒

陳皮去白 半夏薑汁製各壹兩 丁香

官桂各半兩 百草

右為末麵糊丸如黃米大二十丸乳食後溫生薑

湯下

阿魏丸 治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏醋浸一宿 黃連炒 連翹各半兩

花鹼二錢研如粉 山查肉壹兩 半夏皂角水浸壹兩

右為末炒神麴糊丸如菉豆大每服二十丸空心

米飲下嗽果子多者加胡黃連米食多者加神麴

山查肉食多者加阿魏

又阿魏丸

阿魏壹兩 黃連

右為末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元

氣不足加人參

小阿魏丸

山查肉三兩 石鹼三錢 半夏壹兩

右為末阿魏半兩醋浸糊丸白湯下

珠天麻丸 治急驚風請量用之以通為度此方

仍治吊腸鎖肚撮口至妙丸如麻子大初生兒者

三日三丸五日五丸七日七丸加青黛名青黛丸

天南星炮 天麻 白附子各二錢半

膩粉半錢 巴霜壹字 蕪荑炒

全蝎 滑石各壹錢

右為末煮細麵糊丸如麻子大每服一歲五丸二

歲十丸大小加減薄荷湯吞下

大棗連丸 治小兒飲食過度肚腹膨脹上下氣不

宣通鬱滞迷悶情思不樂大則作喘飲食不化作

渴煩躁坐卧不寧常發急腹脇疼痛

蓬朮 三稜各一錢 乾薑炮

青皮 陳皮去白 木香

丁香各三錢 巴豆二十一粒去殼心出油

綠細小茱萸二錢

右爲末醋糊丸麻子大每服七丸至十丸大者每服生薑棗子湯下

下蟲丸　治蛔痛諸蟲

苦楝根皮（酒浸焙）　綠色貫衆　木香

桃仁（浸去皮焙）　蕪荑（焙）　雞心檳榔（各貳錢）

鶴蝨（炒）　輕粉（各半錢）　乾蝦蟆（三錢炙焦）

史君子（五拾箇取肉用）

右爲末飛麪糊丸麻子大每服二十丸天明清肉汁下內加當歸川連各貳錢半治脊疳兼疳勞

遇仙丹　治諸蟲取諸積

牽牛（三斤）　大腹子（貳斤）　錫灰（炙乾爲末）

大黃（四兩）　雷丸（四兩）　青木香

鶴蝨　乾漆（各貳兩）　皂角（四條）

右後四味煎水用粟米煮粥初用牽牛末次用大腹末三用錫灰四用大黃五用雷丸六用青木香和劑丸如梧桐子大每服五七九丸用蔥湯熱水送下　此藥專治男子婦人積蟲氣塊[illegible]七傷赤白痢疾便血汁下[illegible]十般氣十一般蠱蟲又進飲食除病悅顏色不與他藥相反四季可服細末三四錢量大小加減服時不喫脫飲三盞用茶清下次早桶子內蟲積及粒米盡方可洗溫粥補之傷寒孕婦不可服

東垣治脹不犯上下二焦用素問中滿者瀉之於內之法實者分氣消積虛者升陽滋血治者當師其意而活用之勝前所用排擊諸方遠矣

中滿分消丸

黃連　枳實　厚朴（各伍錢）

乾薑　薑黃　豬苓

砂仁　澤瀉　茯苓（各三分）

陳皮　白朮（各壹分）　半夏（肆分）

黃芩（壹兩貳錢）　甘草（壹分）

右爲細末蒸餅爲丸如黍米大每服三十丸溫酒送下

消痞丸　快利之劑

黃連（半兩）　枳實　黃芩

甘草　人參（各[illegible]）　厚朴（柒分）

乾薑（四分）　橘皮（壹錢）　薑黃（伍分）

右爲細末蒸餅爲丸如黍米大每服三十丸隨[illegible]下

腹脹

蘿蔔子　蘇梗　乾葛

陳皮各等分　甘草減半

如食減加白术煎服

升陽滋血湯　二月間一小兒未滿百日病腹脹不

大便二日但瘦弱遍身黄色宜升陽氣滋血和血

補血利大便

蝎梢貳分　神麴三分　厚朴

當歸身壹錢　桃仁十箇　升麻三分

右作一服水一盞煎至半盞去渣食前服

[illegible]中滿湯　治小兒面色痿黄腹脹食不下正月

至五月小兒服之神効

麻黄貳分　桂枝　杏仁

吳茱萸　草豆蔻　厚朴

麴末　當歸　白茯苓

升麻根　蒼术　澤瀉

豬苓　陳皮　黄檗各壹分

柴胡根　白术　青皮

黄連各半分

右㕮咀作一服水一大盞煎七分去渣食前熱

水腫

演山腫脹二證此由虚中有積久患失治日漸傷[illegible]

證候多端臨事[illegible]其本

後止其標斯無[illegible]矣　蓋腫病皆[illegible]

逆於脾胃脾虚[illegible]制腎水[illegible]

脾主四肢故流走而身面皆浮也若加喘者重也何

以然腎水勝而尅退脾土反乘心火心又勝肺肺為

心[illegible]或問曰心刑肺肺本見虚今何喘實曰此

有二一者肺大喘此五藏逆二者腎水氣上行傍侵

於肺故令大喘此皆難治

曾氏治法

原腫病之由標本之疾腎主元氣天一之水生焉肺

主冲化地四之金屬焉腎為本而肺為標皆至陰以

積水其為病也腎者胃之關鍵關鍵不利樞機不轉

水乃不行滲於脈絡皮膚而為浮腫當推究内外所

因而為施治脱大者憑脈以明虚實古方有十種論

證短氣不得臥爲心水兩脇緊痛爲肝水大便鴨溏

為肺水四肢苦重為脾水腰痛足冷爲腎水口苦咽

乾為膽水乍虚乍實為大腸水腹急肢瘦為膀胱水

小便閉澀爲胃水小腹急滿爲小腸水然脉沉爲風
爲虛沉伏爲水病沉則脉絡虛伏則小便難即爲正
水脾脉虛大多作脾[illegible]不治乃成水腫蓋脾屬
土喜燥而惡濕當感濕氣濕蓄傷脾血化爲水土敗
不能制水則停蓄不行留滯皮膚故作浮腫初得病
猶見眼胞早晨浮突至午後稍消以羌活散[illegible]白术
次醒脾散[illegible]主之及間投南星腹皮散其脾冷
則燥以草果縮砂之類然此證夏與秋冬治之頗
異惟春不然蓋四時之水無如春水泛濫兼肝木旺
而脾土受克不能受水所以難療進退不常須徐徐
[illegible] 幼科一 [illegible] 一百五十八
調理取効　若脾熱而困又以熱藥燥之雖火能生
土亦可勝水奈何燥之太過土不敵火則熱愈甚而
食發熱煩渴[illegible]者又進之以燥劑由此而面目轉
浮致脾敗而手足背皆腫甚手足背與臍凸即脾之
外候有未經發表遽用下藥以瀉之則一瀉而腫消
乃曰神瀉之力殊不知脾愈瀉而愈虛不逾旬月其
腫如初此因人只知瀉腫爲最而不求其十補勿一
瀉之論[illegible]當隨四時用藥解表通利小便春以七寶
[illegible]麻黃桂枝赤茯苓水煎葱煎服夏以五苓
[illegible]前子[illegible]以仁茯以清肺飲[illegible]加羌活

細辛荊防冬以冲和飲[illegible]加白术生川烏赤小豆
已上三藥並用水煎葱湯次投滋潤救脾導水湯劑
滲泄之乃爲良法更以[illegible]赤茯飲頻服白
然後安[illegible]鬼門[illegible]小便自治
樞衡以平爲期此之謂也　[illegible]中便覺痰嗽氣喘
小水不通此爲肺腎所主先[illegible]表散[illegible]次以玉
白散爲治餘證[illegible]者投南星[illegible]故從其高者因而
越之即[illegible]之義也下者引而竭之即滲泄之義也
凡得此[illegible]一朝一夕之故不可以[illegible]之藥卞其
速効以[illegible]虛脫如愈後再感外風滿面虛浮用排風
[illegible] 幼科十 [illegible] 一百五十九
[illegible]和解仍服前救脾湯劑免致反復飲食之
[illegible]味[illegible]能益水者併其補生[illegible]
物亦宜[illegible]之[illegible]者三月須脾胃平復[illegible]
[illegible]然[illegible]於飲食中旋以[illegible]投則其病自不[illegible]
作故劉氏[illegible]門治[illegible]非[illegible]所忌者切須詳[illegible]
有經久不治者下[illegible]
南星腹皮散　主腫[illegible]欲愈未[illegible]之間脾胃虛慢氣
促痰[illegible]腹[illegible]消[illegible]小便不利面色痿
黃
南星[illegible]一　大腹皮[illegible]

陳皮去白 青皮去白 桑白皮
甘草 檳榔各半兩
右㕮咀每服貳錢水一盞薑二片煎七分無時溫服
香陸胃苓丸 治脾胃久不愈此藥大能實脾導
水多服取効
丁香去梗 商陸 赤小豆
陳皮去白 甘草炙各 蒼术米泔水浸
皮炒 蓬莪茂二兩半 赤茯苓去皮
豬苓去皮 白术各一兩半 肉桂去麁皮
厚朴去皮薑汁炙
右除丁香肉桂不近火餘藥剉焙同二味為末用
麵微炒米湯透煮糊丸菉豆大每服三十丸至五
十丸或七十七九空心溫湯下兒小者丸作粟殼
大吞嚥之粉數引下並如前法
沉香飲 主脾胃虛弱面貌浮黃或遍身作腫
飲食減少氣不升降小便赤色肚腹膨脹咳嗽有痰
及膀胱服神効加草果仁炮過木瓜煎投
赤茯苓去皮 蒼术米泔水浸一宿
枳殼麩炒 藿香和根 半夏湯泡七次
澤瀉 紫蘇和梗 厚朴去皮薑汁炙

陳皮去白各 甘草炙一兩
右剉每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫
服
三白散 解初中膀胱疾四肢腫脹大小便不利
并治膀胱蘊熱風濕相乘
白牽牛半生半炒 桑白皮剉炒 白术
木通去節 陳皮去白 甘草炙各半兩
右細每服二錢水一盞煎七分無時服
商陸丸 治水腫小便不通勿拘遠近
商陸一兩 淨黃連半兩
右焙為末薑汁煮麵糊丸菉豆大每服三十丸至
五十丸用淡紫蘇葉湯空心下或溫葱湯
消丸 治水腫及單腹滿脹氣促食減遍身面浮
大戟 芫花醋炒 沉香
檀香 南木香 檳榔
蓬莪朮 大腹皮洗焙 桑白皮剉炒各半兩
黑牽牛[illegible]一兩 巴豆去殼去心去油三拾
右除牽牛末巴豆外前為末因有沉香檀香木香
檳榔不過火餘五味焙乾同三香等為末就加牽

牛末和匀巴豆[illegible]切作[illegible]肉極細作入前藥末
同再杵匀水[illegible]丸[illegible]大每服十七丸淡
葱湯候溫五更初空心下[illegible]一日減用
十三丸次減作九丸再減至七丸湯使下法如前
溫退即止仍投南星腹皮散如單腹腫甚能飲食
氣壯者加甘遂末同丸取效仍忌有甘草藥餌相
反

演山翁治法

受濕腫（脚手面目虛浮） 食毒氣腫（腹肚胃腫急） 傷寒虛氣入
腹腫 瀉痢虛氣入腹腫 此四種所患病不相同
水病
皆脚虛得之受濕謂脾胃受濕冷久不能化氣浮四
肢頭面皆腫食毒氣由脾胃傷之冷積毒氣停留胃
脘致虛入腹作腫傷寒由下之太早乘虛入腹作腫
瀉痢之久脾氣亦虛是以致腫以上宜平調胃氣補
臟充實方可去腫先服四味理中[illegible]減半乾薑加白
朮桑白皮同煎傷寒虛腫加枳實作喘加淡豆豉瀉
痢虛腫加[illegible]氣調胃氣既壯以救生丹利之其腫
即退再調和臟腑用觀音散即不復矣

氣虛腫（[illegible]） 血虛腫（[illegible]） 榮衛俱虛腫（亦名氣血腫）

小兒所患腫脹一門最為要急前人少有究竟然腫
脹之作皆由水邪不[illegible]經絡[illegible]三焦流[illegible]
脈表裏俱虛邪正相[illegible]所以致受四大浮盛腹肚[illegible]
滿多由食[illegible]之飲食得之氣傷得之饑飽得之[illegible]
久不化[illegible]則多亂通下因而致
[illegible]得[illegible]已[illegible]為
[illegible]以攻擊一[illegible]不同[illegible]良
者[illegible]之[illegible]先
調榮衛之氣次服分氣飲子以散其滯斯病去矣
[illegible]飲子 調補榮衛氣血俱虛榮衛不和四肢頭
面手足俱浮腫以至喘急者並宜服之

熟乾地黃（[illegible]） 人參
白茯苓 川芎 白朮
甘草 白芍藥 枳殼
[illegible] 陳皮

右件等分㕮咀每服二錢水一小盞煎至半盞
去滓溫服不拘時候

議曰榮者血也流行於脈衛者氣也[illegible]於絡是
故榮行脈中衛行脈外陰陽相安循環無止自幼
至長不謂呼吸無此[illegible]其脈方調其氣乃順呼
吸之間[illegible]能有逆[illegible]流注經絡隱伏臟腑

百病皆由氣始此方氣與血分而小兒血少可與此症
壯其脾胃而氣衛順自和大概天戰而滿且脹
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

桔梗 白茯苓
陳橘皮 桑白皮
大腹皮 白朮
川當歸 紫蘇
半夏

右□□分㕮咀每服二大錢七分水一小盞生薑二小
片煎至半去滓温服不拘時候兼八
味丸中丸湯服 以上宜用救生丹通利
義曰濕氣□□止不可上□□下部受
之濕□□則水由降而下則多流注雖是乳子
呼吸□□脈之□□不通其數者亦同
人人□□小大受之□□已者也留滯其
脾□□不及□□治者□則分
之遲□□則□□之調理之法先宜

順氣大抵嬰孩氣順則易治此方分氣與分涤
之分者不同用者察之

大効神功救生丹 治小兒氣虛喘息四肢浮腫肚
腹脹急衛濕臟腑令熱作寒或瀉或秘皆由久停
虛積榮衛不順宜用推去其惡毒之氣

雄黃另研 朱砂各一分 巴豆二十一粒去殼
乾薑二分

右件用米醋一盞以巴豆煮令乾去巴豆不用將
巴出油和雄朱研勻蒸餅搜丸如麻子大每一歲
三丸並用酒浸亦爲藥以少許送下

薛氏治法

□曰□□者腎水也少陰者冬脈也其本在腎其末
在肺皆積水也又曰腎者胃之關也關門不利故聚
水而從其類也上下溢於皮膚故胕腫腹大上爲喘
呼不得臥者標本俱病也丹溪云惟腎虛不能行水
脾虛不能制水胃與脾合又以為水穀之海因虛而
不能傳化腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停
滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫也其狀
目胞上下微起肢體重着咳喘怔忡股間清冷小便
澀黃皮薄而光手按成窟舉手即滿是也古方有十

脉論證又有濕氣毒氣傷寒後瀉痢後氣血虛者亦五種及殲氣瘀積鎖肚物脹作膨悶氣虛冷積者之七脹亦當詳之其受濕氣者由脾胃之氣敷布四肢頭面皆腫也食毒者脾傷積毒在胸蓄於胃脾傷渠亦早者邪氣乘虛而入也瀉痢後者脾氣虛也皆宜先調胃氣次可治其脹七脹皆由血氣不足臟腑怯弱表裏俱虛邪正相亂以致四肢浮腫腹肚膨滿亦當先調榮衛分別陰陽治法宜補中行濕利小便凡有[illegible]可汗之身無熱者水氣在裏也宜下之腰[illegible]宜利小便腰已下腫宜發汗此仲[illegible]景之法也若遍身腫煩渴小便赤澀大便秘結此屬陽水遍身腫不渴大便溏泄小便清利此屬陰水陽水兼陽證者脉必浮數陰水兼陰證者脉必沉遲氣若[illegible]下宜用二陳加升提之藥如腹脹必加木香調之若[illegible]用四物湯加參朮夕用加減腎氣丸[illegible]陽虛朝用六君子湯夕用加減腎氣丸[illegible]陰陽俱虛朝用八珍湯主之與陽虛者[illegible]八味地黃丸夕用補中益氣湯若肚腹痞滿[illegible]飲食難化或大便泄瀉[illegible]此與陽虛與脾肺腎虛寒不能司攝而水

泛行也急用加減腎氣丸否則不治惟調補脾土多有生者

金匱加減腎氣丸

熟地黃八兩　乾山藥　山茱萸各肆

澤瀉　白茯苓　牡丹皮各三兩

肉桂　附子炮　車前子炒

牛膝各一兩

右為末米糊丸小豆大每服三四十丸空心食前白湯下

附雜方

治白文舉兒九歲身面皆腫尿多

山梔炒　桑皮蜜炙　黃芩

白朮　蘇梗

右㕮咀作三貼水一盞半煎至半盞食前溫服

陽退腫散氣方

赤小豆　陳皮　蘿蔔子

甘草炙各半錢　木香炮少許

右為麄末每服大小加減

又方

白朮炒　木香　甘草炙

宣積丸

青皮各半兩 巴豆三十粒去殼 青皮細剉同巴豆炒焦去巴豆不用

右爲末米飲調下

又方

用錢氏益黃散加木香去丁香加蓽茇一錢米飲調下

隨兒大小加減米飲調下

幼科證治準繩集之八

金壇王肯堂宇泰輯

疳

○內經曰數食肥令人內熱數食甘令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳若夫嬰孺中之乳子與四五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也父母不能調將惟務姑息舐犢之愛遂令恣食肥甘瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝餐暮啖漸至積滯脾胃以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋蟲痛瀉利而諸疳之證作矣 ○錢諸疳皆脾胃之病內亡津液之所作也因大病或吐瀉後醫又以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疳皆愚醫之所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母則法宜先補肝母肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大黃芒硝輩諸冷藥利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病發作寒熱飲水脇下有形硬痛治法當用藥漸消磨之醫反以巴豆硇砂輩駛藥下

之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端亦成疳病又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩躁亦能成疳也 小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疳以其有癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多即蕩滌脾胃亡失津液不能傳化水穀其脉沉細益不能飲食致脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣 湯氏曰兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞瘵與疳皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼闕乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生或三兩歲後乳食稍多過飽無度則疳以傷 或恣食甘肥粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉

之後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裹證冷熱太過渴引水漿變而生熱熱氣未散復為他邪傷之者又有病癖寒熱脇下痛硬或者不能漸與消磨遂以硬巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥坏病之過乎疳之為候頭皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口饞唇白兩眼昏爛揉鼻撏眉脊聳體黃鬭牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土而欲飲水者皆其候也

肝疳亦名風疳亦名筋疳 錢氏肝疳白膜遮睛筋疳瀉血而瘦 湯氏肝疳眼白青眼睛澀癢 聖惠搖頭揉目流汗偏身合面而臥面色青黃髮竪頭焦筋青腦熱渾身瘡癬腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦 曾氏曰生瘡疥或發際左臉多青或白睛微黃瀉利夾水或如苔色

心疳亦名驚疳 錢氏面黃頰赤身壯熱 湯氏口內生瘡 聖惠渾身壯熱吐利無常頰赤面黃胸膈煩滿鼻口乾燥目赤生瘡多久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚 楊氏小便赤澀五心皆熱 曾氏齩牙舒舌愛飲冷水喜伏眠於地

脾疳亦名食疳　錢氏面黃腹大食泥土　湯氏脾疳食不消胃瘦多吐　聖惠腹多筋脈喘促氣麤乳食不多心腹脹滿多啼咳逆面色痿黃骨立毛焦形枯力劣胸膈壅悶水穀不消口鼻常乾情意不愛睛瞳明暗腸胃不和利多酸臭　曾氏愛食冷物引飲無度身面俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹脚弱間或瀉癖肌瘦目慢昏沉夜啼不思乳食　錢氏又云肥疳即脾疳也身瘦瘦黃乾而有瘡其候不一種種異端今略舉之目澀或生白膜唇赤身乾黃或黑喜卧冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也　按此言脾疳證候多與餘疳相濫蓋疳為脾經本病因[illegible]之

肺疳亦名氣疳　錢氏氣喘口鼻生瘡　聖惠咳嗽氣逆皮毛乾焦飲水多啼咽喉不利[illegible]鼻中生瘡惡寒唇邊赤痒腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻泄痢糞中米出皮上粟生　曾氏鼻下赤爛手足枯細口有腥臭或作喘[illegible]

腎疳亦名急疳亦名骨疳　錢氏腎疳極瘦身有瘡疥骨疳喜卧冷地　湯氏齒爪黑　聖惠肌骨消瘦齒齦生瘡寒熱作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如冰吐逆既增乳食減少瀉利頻併下部開張肛門不收疳瘡痒痛　曾氏兩耳內外生瘡脚如鶴膝頭縫不合或不能行牙齒生遲其證與瘡傳作走馬疳之類

按五臟疳傷大抵然爾然而論之曰五疳由蟲曰蛔疳曰脊疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢曰疳腫脹曰丁奚曰哺露諸狀非一可不察然撮要而條析之乎方疳出蟲者疳傷之源雖起於乳哺不調然臟腑停積已久其不化而為蟲與蟲或如絲髮或如馬尾多出於頭項腹背之間黃白或赤者可治青黑則難療也蛔疳者失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔蟲縱橫多啼嘔吐清沫腹中作痛肚脹青筋唇口紫黑腸頭齒痒是也蛔雖食蟲蟲不可殺從口鼻出者難治脊疳者蟲蝕脊膂身熱羸黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頻齧爪甲是也腦疳者胎中受風熱生下乳哺失常頭皮光急滿頭生瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗顖腫顖高是也[illegible]乾疳者瘦悴少血舌乾多啼其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎脊焦皮燥大便乾

結其病在肺撘口瘡眼眊脣乾渴其病在腎細疳也
乾疳是也疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五
辛酒麪炙煿使小兒心肺壅熱日則煩渴引水乳食
不進夜則渴止是爾疳瀉者毛髮焦黃頰赤肚
脹腸鳴痢下糟粕是宿食停滯之所致也疳痢者挾受風寒暑
濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻下惡汁是
也疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故令腹肚緊
脹由是脾經受濕故令頭面手足虛浮是爾疳勞當補虛調氣
疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而發
渴盜汗骨蒸嗽喘枯悴是爾或渴而復瀉飲水惡食

肚硬如石面色如銀斷不可活無辜疳者腦後項邊
有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉不
速破之則蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體癰瘡
便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是因病或漸瘦
兒衣露於檐下為雌鳥落羽所汙兒著此衣蟲入皮
毛亦致無辜之疾兒衣已晚須微火烘之其若手足
極細項小骨高尻削體瘦腹大臍突號哭胸陷或生
穀癥是為丁奚虛熱求食頭骨分開翻食吐蟲煩渴
嘔噦是為哺露丁奚哺露皆因脾胃久虛不能化水
穀以榮血氣故肌肉消削腎氣不足復為風冷所傷

傷柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆
孚種類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患脅
疳肉虛不食甚者天柱骨倒治法當用錢氏地黃丸
加驢疳等劑仍與貼項塗筋若不識證謂之五軟非
也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝
疳伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發表成者
是肝風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝
疳當隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨
倒者難療故併及之
張氏家傳小兒二十四候　第一候瀉膿血日漸瘦

是冷熱疳　第二候腳細肚高胸前骨生愛喫泥土
酸鹹日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疳
第三候鼻下赤爛愛揉眼兼血痢是肺疳乃因哭
著不熱物或病妳所損心肺加之欬嗽更以服涼冷
藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭　第四候
皮虛皺面無顏色身上燥癢心煩　第五候毛髮稀
疎鼻生瘡是肺疳　第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝
疳　第七候牙變黃赤不定是腎疳　第八候頭髮
焦乾鼻下瘡生是肺疳　第九候咬指甲毛髮作穗
四肢沉重是心疳　第十候眉上筋生齒蟲是胃

疳證

槽疳　第十一候吐逆腹脹是胃疳又名嫉疳　第十二候齒齗臭爛面無顏色心煩不思食是脾疳又名口疳　第十三候愛合面臥多睡如醉腹脹氣急是腸肉喫生肉如此腹內有蟲是心脾疳　第十四候鼻內乾痛口中臭氣齒根有鮮血是肝肺疳　第十五候腳細肚高并脹上有青脈是脾疳　第十六候鼻下赤爛愛喫冷水是熱疳　第十七候皮膚上生瘡子如米出是脾冷疳　第十八候氣滿腹脹口乾是心肺疳　第十九候愛餐生米麪炭甑泥是脾胃疳　第二十候揉鼻揩眼及咬指甲愛飲水是肝渴疳　第二十一候多寒熱愛臥不起是骨熱疳　第二十二候愛飲水眼目不開是肝疳　第二十三候肌體或熱或涼發渴無時是急疳　第二十四候齒斷黑唇懶開開則亦是心疳積熱

疳癥

鬾惡凡小兒疳在內眼澀腹脹痢色無常或如泔淀日漸羸瘦此候可療若身下赤爛目揉頭上有瘡生瘡痛癢淋漓流引連於兩耳時時目赤頭髮稀疎頭皮光緊滿頭又項細脫髓羸瘦亦可治也若齒口傍齒爛齗作五色或黑齒黑舌下有白瘡上腭有瘡口中時有臭氣齒斷漸染欲爛亦可治也若下部開張有時亦爛瘡不可忍下痢無常亦可治也若疳伸脊背十指皆瘡自咬指甲頭髮作穗脊骨如鋸有時喫腹有時下痢若然治之無不痊也

肝疳

肝疳凡小兒肝藏疳若目睛帶青脈左脇下硬多吐涎沫眼角左右有黑氣所衝不可治也心藏疳若愛驚啼常好飲水便食辛味耳邊有脈舌上有黑靨者不可治也脾藏疳若肚大唇無血色人中平滿下痢無度不穀不消好喫泥土皮枯骨露不可治也肺藏疳若咳逆氣促多涕白沫身上有斑生如粟米大色若黑者不可治也腎藏疳若愛食酸鹹飲水無度小便如乳牙齒青黑耳腦乾燥有瘡骨枯不可治也又五疳有五絕候一襪着腳中指底不覺疼二抱着手足垂嚲無力三病未退遍身不暖四藏腑爲青淀及沫不止五與服藥展無力如此之候皆不可治也凡醫用藥切在審詳也

疳瀉

瀉疳者小兒疳瘠成久則瀉瀉皆緣投轉過之藥小兒易爲虛實致令脾胃虛損亡津液內發虛熱外消肌肉一概作泄瀉則脾胃受其病日脫肌腹脹痢色無常漸加瘦瘠久不瘥則是腸胃有風積法當宜風散調之後各以木通散補其母

錢氏諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸
熱則胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或
沫青白漸瘦弱此冷證也史君子丸主之疳在外鼻
下赤爛目燥鼻頭上有瘡不着痂漸漸延耳生瘡治鼻
疳蘭香散諸瘡白粉散主之　肝疳當補肝地黃
丸主之　心疳當補心安神丸主之　脾疳當補脾
益黃散主之　腎疳當補腎地黃丸主之　筋疳當
補肝地黃丸主之　肺疳當補脾肺益黃散主之
骨疳當補腎地黃丸主之　大抵疳病當辨冷熱肥
瘦其初病者爲肥熱疳久病者爲瘦冷疳冷者木香
丸熱者胡黃連丸冷熱之疳尤宜如聖丸故小兒
之臟府柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳凡有
可下量大小虛實而下之則不至爲疳也初病津液
少者當生胃中津液白朮散主之惟多則妙
[illegible]溫涼之冷熱者溫涼之此其要也[illegible]
[illegible]自外鼻下赤爛頭瘡濕癢五心煩熱掀衣氣[illegible]
引飲水病瘦[illegible]熱[illegible]冷[illegible]熱汗來皆熱疳也冷
疳多[illegible]其沫青白[illegible]飲[illegible]
[illegible]因地[illegible]熱狀[illegible]進滑泄無
[illegible]冷[illegible]加瘦弱此則[illegible]之冷

熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者
虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補
故錢氏又曰小兒易爲虛實脾虛不受寒溫服寒則
生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼幼之綱
領乎[illegible]此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶
[illegible]淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或
過當[illegible]不保其得也服積之法又當權衡積者疳
之母[illegible]積而虛謂之疳極諸有積者無不肚熱腳冷
[illegible]虛實而取之若積而虛甚則先與扶胃使胃
氣內充然後爲之微利若積勝乎虛則先與利導纔
得一泄急以和胃之劑爲之扶虛然取積雖當疏利
如白豆蔻蘿蔔子縮砂蓬朮消積等輩亦不可無勝
[illegible]亦虛中之候也先爽後熱飲水不食或因飲
水以致喘嗽或只有癖熱潮熱之說治法解散其熱
[illegible]頭下癖合是而觀[illegible]作不同療治不一又可無權
度於此哉　案大抵疳之爲病皆因過餐飲食於脾
家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾若脾家
病去則餘臟皆安苟失其治日久必有傳變然脾家
病宜温脾丸沉香檳榔丸或水晶丹烏犀丸
更察虛實療之有蟲者服史君子丸腹痛化蟲飲

如心腹痛吐清水蟲自下多投二聖丸……諸疳
證皆宜用何方方用……丸或萬應丸常服化積治
疳仍各投本臟調理之劑寧心用茯神湯……調肝
用青歸湯調脾用參苓白朮散……補肺用補肺散
補腎用調元散庶各得其宜則前證不致再作
演山積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有
治積不下其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒所患
疳證泄瀉無時不作風候者何惟疳瀉名熱瀉其臟
虛轉動有限所以不成風候錯瀉不風亦轉他證作
瀉虛熱煩躁下痢腫滿喘急皆疳候虛證去六疳虛
疳證……幼科……
用補虛是知疳之為疾不可更利動臟腑發作之初
名曰疳氣腹大脹急名曰疳虛瀉痢頻併名曰疳積
五心虛煩名曰疳熱毛焦髮穗肚大青筋好喫異物
名曰疳極……熱發形象形骨枯槁面無神采無
血色名曰疳勞手足細小項長骨露尻臀無肉肚脹
臍突名曰丁奚……分開作渴引飲蟲從
口出名曰哺露……又因多食生冷甘粘肥膩
積滯中脘不化久而成疳治疳之法量候輕重理其
積……其中……胃氣溫而納食益脾元
……化邪……令氣血與血脈相參壯

筋力與骨力俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安……
以漸攻之五臟……腸胃下去積毒取出蟲子雖曰
……非治法焉小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛
……則虛滿……下若……腸胃致虛由
虛成疳由虛……之孩難救矣 寶鑑
疳者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒為五疳在
大人為五勞總以調補胃氣為主
後列諸方其證候雖詳不能名為何等疳者即於通
……而疳方內檢之若證候的與五疳等條下證候對
者即檢本疳方分實熱虛實擇而用之常須識此勿
疳……
令誤也

肝疳 楊氏云肝疳者由乳食不調肝臟受熱所致也
若乳母寒溫不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒
邪氣不散遂以乳……成風疳肝者眼之候上膈伏
熱痰涎壅滯以致肝風入眼……生翳淚爛
癢揉擦……合眼亦名疳眼外證搖
頭揉目白膜遮睛眼青……肝熱甲
痒筋……汁多下痢疳瘡也 錢氏以地黃丸
主之 楊氏以天麻丸生熟地黃湯主之 曾氏
調肝用青歸湯

天麻丸　治肝疳風疳疳眼

青黛　川黃連　天麻

五靈脂　夜明沙（微炒）　川芎

蘆薈（各二錢）　龍膽草　防風

蟬退（去足各一錢半）　全蝎（二枚焙）　薄荷（少許）

乾蟾頭（炙焦三錢）

右爲末豬膽汁浸糕丸麻子大每服十丸薄荷湯下

生熟地黃湯　治疳眼閉合不開內有膝翳

生地黃　熟地黃（各半兩）　川芎

赤茯苓　枳殼（炒）　杏仁（水浸去皮）

川黃連　半夏麴　天麻

地骨皮　甘草（炙）　當歸（各一錢）

右剉散每服二錢生薑三片黑豆十五粒水煎溫服

當歸湯　治小兒[illegible]不快者及肝虛目視不明

黃耆（蜜水塗炙）　當歸（酒洗焙乾）　白芍藥

川芎（各半兩）　甘草（炙一錢）

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

[illegible]熊膽天麻丹　治驚疳[illegible]瘦搖頭揉目百[illegible]急

天麻　羌活　真熊膽

蟬殼　使君子（炮去皮）　胡黃連（各一兩）

蘆薈　乾蟾（各半兩炙黃）

右件搗羅爲細末粳米飯和如黍米大每服拾粒荊芥湯下量兒大小加減

[illegible]丹

烏蛇（酒浸去皮骨炙令黃）　蛇蛻皮（燒灰各一分）

胡黃連（爲細末次用）　真蘆薈

麝香　熊膽（各二錢研）

右件同研勻以粟米飯和如黍米大每服拾粒薄荷湯下乳前

張氏家傳治小兒風疳肝氣進飲食（[illegible]）

蘆薈（一兩別研）　[illegible]

[illegible]（[illegible]以皂角水磨）

右件藥一處搗羅爲末用[illegible]三錢以水二升接汁用生絹濾去滓入銀器內慢火熬成膏入前二味藥調和得所丸如菉豆大每服三丸至[illegible]丸薄荷湯吞下

漢東王先生家寶治小兒風癇氣攻項下生核子方

角骨方

兒角（大錢一燒存性） 糯米（一合炒焦色） 草烏頭（二兩生）

青皮（去白二錢炒）

右為末每服不拘多少以井華水調貼如未安須用水精丹取後用調氣觀音人參散等藥補仍再服藥與癇藥相間服

調氣觀音散 補虛調胃氣進乳食止吐瀉久不進食

白扁豆（微炒） 石蓮肉（去心炒） 人參（焙各壹分）

茯苓（壹分半焙） 甘草（炙） 香白芷

綿黃耆（蜜塗炙并炙） 木香（炒各壹錢）

神麴（一錢炒）

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢用水一藥注或半銀盞棗子半片煎十數沸服

人參散 補虛調胃氣進乳食止吐瀉

人參 茯苓 蓮肉（去心炒各壹分）

黃耆（半兩蜜水炙） 甘草（炙各一錢）

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢以水一藥注或半銀盞入棗子半片煎十數沸服

莊氏第六候亦生鬼毛髮稀焦乾肝劑方

肉豆蔻 蝎灰（全七個各一分） 桔梗（炮）

茯苓 大黃（煨各一兩） 龍腦

麝香（各一錢）

右為末軟飯丸如麻子大粟米飲下三丸只可兩服

治小兒手足動眼目不開有時語笑或即嚬怒兼多驚手指甲青狀形似鬼祟稱大鈎通神丸

茯苓 龍齒（各壹兩） 鉛丹

胡黃連（各一分） 銀箔（一片） 麝香（一錢）

鈎藤（一兩）

右為末錬蜜丸麻子大每十丸米飲下（莊氏第二十二條用此方）

第三風癇小兒手足拘攣眼目不開有時自笑或嚬怒驚叫手爪甲青狀似鬼祟之狀大瘲須服金箔茯苓散

金箔（伍片） 茯苓 牛膝

胡黃連（各一兩） 龍骨（一分） 木香

麝香（各一錢）

右件為末每服一字米飲下日二服忌油膩

按楊氏云由乳食不調心臟受熱所致也蓋其血
氣未定乳哺有傷易生壅滯內有滯熱未得疏通故
心神驚鬱而作驚癇之候外證身體壯熱臉赤唇紅
口舌生瘡胸膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴
齒齘虛驚是也　錢氏安神丸主之　薛氏用安神
丸以治心異功散以補脾　楊氏以茯苓丸錢氏安
神丸主之　曾氏守心用茯神湯

朱砂安神丸　治心府蘊熱心中痞悶

朱砂四錢　黃連　生地黃各半兩
生甘草二錢　蘭香葉二錢焙乾　銅青
輕粉各一分

右為末乾數丸

茯苓丸　治心府驚癇

茯神　蘆薈　琥珀
黃連淨　赤茯苓各三錢　鉤藤皮
遠志肉薑汁焙乾　犀角各二錢　石菖蒲一錢
麝香少許

右為末粟米糊丸綠豆大每服十丸薄荷湯下

茯神湯　治心氣不足虛而驚悸日常煩哭夜啼
丹下竊斑發驚宜與此同服自然有效

茯神去皮一兩　人參去蘆　當歸去蘆各半兩
甘草炙二錢

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服有
微熱煩躁入麥門冬去心同煎

天漿參黃丹　治驚癇挾熱夜啼驚悸

乾蝎二十一個微炒　天漿子乾者十四個微炒
人參　胡黃連各一兩　天竺黃半兩已上為末
次入細研
龍腦一錢細研並　青黛　朱砂各一分

右件一處拌勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒人參
湯下量兒大小加減

天竺黃丹

天竺黃一兩細研　晚蠶蛾微炒一兩　白殭蠶微炒
川黃連各半兩已上搗羅為細末次用
青黛　麝香各一分並細研　朱砂

右件拌勻粳米飯和丸如黍米大每服七粒至十粒
煎人參湯下量兒大小加減

仙人水鑑治小兒驚熱朱砂丸　五歲至十五歲並
宜服之

朱砂參錢研　青黛研一兩　黃連

鬱金為末 夜明砂用炒黃，各半兩
麝香一字 熊膽用冷水一雞子多浸一宿，各一分
右同研如粉，次入浸熊膽水和為丸，如菉豆大。空
心臨卧金銀薄荷湯下三丸至五丸。切忌生冷油
膩。神効。
萬全方真珠散 治小兒心癖，體熱黃瘦
真珠末 麥門冬去心，各半兩 天竺黃
金銀箔各五十片，研細，入諸藥末不同，臨和 牛黃
麝香各細研 胡黃連 甘草炙
羚羊角屑 川大黃炒 當歸微炒
朱砂 雄黃 茯神
犀角屑各一分
右搗羅為散，每服以薄荷湯調半錢，量兒大小服
之。
又治小兒肚大項小，俗呼是驚癖方
鈎藤 甘草炙，各三分 人參
麻黃去根節，一兩
右件為末，以水一茶盞入藥二錢，煎取六合，去滓
重煎溫服
五府八癖，心藏熱方

鬱金一分 鐵粉 青黛
香墨 [illegible]各一分 使君子一个
蝸牛去殼，和肉研 麝香細研，各一分
右搗末，研細，滴水為丸，如芥子大。生地黃汁化下一
丸至二三丸，薄荷湯亦得。錢氏第九方用此
又方 治小兒一切驚癖等病
[illegible]龍腦 胡黃連各半兩 木香
蟬蛻去頭足，洗，各一分 瓜蒂 龍腦
麝香 牛黃各一分，並細研
右為末，煉蜜為丸，如菉豆大。驚癖或秘或瀉，清
米飲下。小兒五七粒至一二十粒。疳，猪肝湯
下。疳渴，煿猪湯下；猪肉湯下亦得。驚風發搐，眼上
視，薄荷湯下一丸，更水研一丸滴鼻中。牙疳，口
瘡，研貼。蟲痛，苦楝根湯或白蕪荑湯送下。百日內
小兒大小便不通，水研封臍中。蟲候，乾漆、麝香
各少許，并入生油一兩點，溫水化下一大丸。慢驚
勿服。
睡驚丸 治小兒一切驚癖，食積風癎之疾
史君子伍十个，去殼 香墨 金銀箔各十片
膩粉二分

右先將史君子仁杵同蝎研細次入金銀箔乳鉢
內研次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如
桐子大陰乾每服一丸薄荷湯磨下一歲已下半
丸一名青金丹極効

治小兒因喫着患熱病妳次腹痛并及驚風毒妳便
乃下瀉吐逆又名妳疳

桃仁去皮炒　胡黃連各半兩　沉香
朱砂一分別研各　金箔伍片

右為末軟飯丸麻子大米飲下五丸妳汁下亦得

莊氏集第十一　嬰孺方

治小兒胃瘠及進食方

胡黃連　蘆薈各一分　肉豆蔻一个
檳榔　乾蟾半兩炙各　夜明砂半分炒
朱砂　麝香各少許

右為末煉蜜丸菉豆大一歲一丸米飲反乳汁下
亦得知是瘠盛次加二丸六　七丸取下蟲屎為驗
五日一服

[illegible]小兒冷積不熟牛脂挑化丸

[illegible]　朱砂半兩[illegible]

右擣末水浸蒸餅為丸如粟米大每水下三五丸服
旬日自然安好　莊氏集第二十　嬰孺方

[illegible]楊氏云由乳食不節脾胃受傷所致也或乳母
恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致吐或乳
多眠久則變為乳癖腹脹結塊亦為妳疳外證面黃
身熱肚大脚弱吐逆中滿之力呼喘水穀不消泄下
酸臭合面困睡減食喫泥是也　錢[illegible]益黃散主之
楊氏以靈脂丸同益黃散主之　薛氏用四味肥
兒丸以治疳五味異功散以生土　曾氏調脾用參
苓白术散不乳食

益黃散見脾

四味肥兒丸　治嘔吐不食腹脹成疳或作瀉不止
或食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱
瘦怯遍身生瘡又治小便澄白腹大青筋一切疳
證

黃連炒　蕪荑　神麴
麥芽炒各等分

右為末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滚
湯送下

靈脂丸　治脾疳食疳

白豆蔻仁　麥蘖炒　五靈脂
縮砂仁　蓬朮煨　青皮去瓤
橘紅　史君子炒　蝦蟆炙焦各一
右爲末米糊丸麻子大每服十丸米湯下
神効換肌丸　治脾疳肌瘦潮熱盜汗泄瀉糟粕頭
大腹急
川黃連炒　鱉甲酒炙　肉豆蔻煨
使君子　神麴炒　麥芽炒各半兩
訶子肉　麝香五分
右爲末糊丸芥子大米湯下
褒異木香煎　治食疳不知饑飽積滯內停腹大脚
細下痢無度
南木香剉　肉豆蔻去殼各一兩　乾蟾二箇酥炙
胡黃連　使君子去殼　五靈脂已上各一兩
巴豆
麝香半分別研
右件同杵勻滴水為丸□□□□□□□下和如黍
米大每服二丸至三丸溫生薑湯下乳食後看兒
大小加減
讚脂丹　能食不生肌肉宜常服
檳榔　木香　胡黃連各一
代赭石一分研已上各剉　香墨
麝香一分
右件通拌勻糯米飯和如黍米大每服二十粒煎橘
皮湯下食後量兒大小加減
□□丸　肌瘦挾積常服尤佳
肉豆蔻去殼　使君子去殼　青橘皮炒黃各一兩
牽牛子炒黃一分已上搗　蘆薈研一分
麝香研
右件一處拌勻用糯米飯和如黍米大每服十粒
生薑湯下食後量兒大小加減
□惠木香丸　治小兒食疳腹中多痛大腸或剩鼻
□□□□□□身有虛熱
木香　胡黃連　蟾頭炙令焦黃
蘆薈　青黛
麝香別研　熊膽各一分
使君子炒
右件藥搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥
飲下五丸量兒大小以意加減
訶黎勒丸　治小兒食疳不消心腹脹滿好喫

泥土肌膚虛弱

訶梨勒皮（各三分） 肉豆蔻（一枚去殼） 青黛

麝香 蘆薈 朱砂（細研各一）

熊膽（研入各一分）

右件藥搗羅為末都研令勻用豬膽汁浸米飯和丸如黍粒大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小增減服之

桃花散 治小兒食疳羸瘦

桃花（一分） 乾蟾（一分塗酥炙令黃） 肉豆蔻（去殼）

黃柏（細銼） 赤芍藥 紫笋茶（一分半）

右件藥搗細羅為散每服以溫粥飲調下半錢看兒大小臨時加減

張氏家傳治小兒脾疳方

胡黃連 史君子 五味子

檳榔（各一） 南木香（半兩）

右為末粟飯丸如菉豆大飯內與五七丸日三服

大蘆薈丸 治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米不思飲食多睡亂啼藏府或溏或秘肌膚或瘦毛焦髮豎或飲水五心煩熱能發進飲食兼治瘡癬常服不瀉利

胡黃連 黃連 苦楝子（兩）

白蕪荑（去扇秋炒三分） 乾蟾頭（燒灰研一分）

麝香（一分研） 青黛（一分半研） 蘆薈（一分研）

右先將前四味為細末豬膽汁和為劑每一丸如雞頭大入巴豆仁一枚置其中用油單紙一重裹之同米一升許蒸米熟為度入後四味為丸少入麪糊丸如麻子大與十丸或十五丸清米飲下食後臨臥日三服

大黃茯湯又名梔子茯苓湯 治黃疸土色小便不利大抵髮黃脫落

乃錐疳鼻下斷作瘡者土逆行營氣能乳者置中有喜食土者胃氣不足面色黑者為寒大便青為寒褐色血黑色血中有熱治法當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔 黃連 麻黃

羌活 柴胡 茯苓（各三分）

黃柏 甘草（炙各二分） 大黃

白朮（各五分） 防風（各二分） 當歸（四分）

右件判如麻豆大作一服水一盞半煎至一盞去柤空心熱服食前

治小兒脾疳面黃多睡手足浮腫方

桑白皮炒　漢防己　人參

茯苓　胡黃連炒　麝香各一分

右為末煉蜜丸如麻子大用米飲下五丸一日三服

莊氏第十脾疳方

莊氏第二候腳細肚高胸前骨生愛喫泥土酸鹹日久通身黃腈瘠吐逆下痢腹內疼痛是脾疳宜服

虎睛一對炙　牛黃　朱砂

麝香各一分　桔梗炒半兩

右為末煉蜜丸麻子大薑湯下三丸至五丸

治小兒脾疳瀉血肚大氣喘方

丁香　白朮　龍腦

乾蝎　胡黃連　明砂炒各一分

右為末軟飯丸米粒大蕪荑湯下

治小兒通身黃瘦大小便結澀脾所召也

漢防己炒　甘草炙各一兩　桑白皮

[illegible]一兩　木香各半兩　檳榔一個

胡黃連二分

右為末每服一錢水七分入生薑少許煎至五六分溫二服

治小兒疳氣泄飲食黃瘦散

黃耆　五味子　厚朴薑汁炙二

白朮　蒼朮　芍藥

甘草炙　陳橘皮　乾薑

[illegible]蝎　當歸各一兩　木瓜二兩

右為末每服半錢米飲調下

治小兒喫泥

石膏　黃芩　陳皮

茯苓　甘草　白朮

右為散煎服

治小兒喫泥及腹肚

膩粉壹分用沙糖搜丸如麻子大空心米飲下三丸（丸瀉出土是驗也）

莊氏第十九候愛食生米麵炭甎瓦是脾胃疳蘆薈丸（治小兒驚風疳）

蘆薈　胡黃連　牛黃

天竺黃　青魚膽　茯苓各半

龍腦　麝香　人參

川大黃　雄黃各分　生犀各二分

右為末煉蜜丸菉豆大每服三丸薄荷湯下溫

亦得化下亦無妨

小兒脾疳常喫泥土日久遍身通黃醫人不識或呼為陰黃宜服虎睛丸

虎睛一个 牛黃二錢 桔梗

麝香 胡黃連各一錢

右件為末煉蜜為丸麻子大每服三丸食前米飲下日二服

鼻疳 楊氏云由乳食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺所通其氣不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤癢瘡濕名為鼻疳其瘡不痛

汁所流處隨即生瘡亦名疳䘌外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻癢流涕咽喉不利頤爛吐紅氣脹毛焦泄痢等證併是也 錢氏主補脾生肺以益黃散主之 楊氏以消肺飲化䘌丸錢氏阿膠散主之 薛氏用清肺飲以治肺熱瘡湯以生金 曾氏用補肺散

地黃清肺飲 治肺熱疳䘌咳嗽氣逆多啼壯熱惡寒

桑白皮炒半兩 紫蘇 北前胡

防風 赤茯苓 黃芩

當歸 天門冬去心 連翹

桔梗 生地黃 甘草炙各二錢

右剉散每服二錢水煎食後服次用化䘌丸

化䘌丸

蕪荑 蘆薈 青黛

川芎 白芷梢 胡黃連

川黃連 蝦蟆灰各等分

右為末豬膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十丸食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽泡湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連蘆薈等分雄黃少許細末入鼻斂瘡

補肺散 治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心

阿膠一兩半炒 白茯苓 馬兜鈴去老梗

糯米各半兩 杏仁去皮尖

甘草炙四錢

右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服

張渙麝香丹 治小兒肺疳皮毛枯燥欬嗽上氣

胡黃連一兩 牛黃 紫蘇子微炒

五味子各一分 乾蟾

麝香細研 蘆薈細研 朱砂一分細研

右件一處拌勻以豬肉和如黍米大每服五粒至
七粒米飲下量兒大小加減

靈砂丹 因嗽成癖最宜服之

人參去蘆半兩　甜葶藶炒　五靈脂
胡黃連各一分　巴豆上搗羅為細末　辰砂細研半兩
麝香細研　蘆薈細研　杏仁去皮尖麩炒各一分

右件一處拌勻以粳米飯和如黍米大每服十粒
煎人參湯下量兒大小加減

五靈脂丹 久嗽恐成癖常服尤佳

五靈脂半兩　蟾頭一枚塗酥炙黃　蟬殼微炒
款冬花各半兩已上搗羅為細末　青黛細研
雄黃一分細研

三十三

右件藥一處拌勻糯米飯和如黍米大每服十粒
煎人參湯下不拘時候量兒大小加減

藥金方治小兒肺癖不欲乳食時復腹痛胡黃連丸

胡黃連　當歸炒焙　訶梨勒皮
木香各半兩　青橘皮湯浸去白焙　紫蘇子
杏仁湯浸去皮尖麩炒黃各一分　麝香一錢研入

右件搗羅為末用粟米飯和丸如綠豆大每服三丸
以粥飲下量兒大小加減

家國材肺癖方

真珠七十粒　辰砂半兩　人參
甘草炙二錢　麝香半錢　膩粉五錢
白附子一個

右件先將人參甘草剉碎炒熟白附子炮碾末次
研入真珠辰砂麝香輕粉勻淨每服半錢或一字
用金銀薄荷煎湯調服日進一服久後只三服其
癖自愈

王氏第三候鼻下赤爛受揉眼夜啼是肺府乃因
喫著乘熱物或飛炸所積心肺加之咳嗽更以服
涼冷藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭

三十三

龍腦　朱砂各一分　鉤藤
玄參各一兩　胡黃連半兩　麝香一錢

右件為末煉蜜丸如黃米大米飲下三丸至五丸

治小兒以項細心腹脹滿疳盛乾皺毛髮焦黃鼻下
赤爛口舌生瘡漸漸羸瘦

大蟾[illegible]
[illegible]
麝香　熊膽　蘆薈各半兩

右一處細研如泥麵糊丸如麻子大米飲下三丸

乳汁亦得三歲以上加丸

理小兒五疳八痢腹脹羸瘦頭髮焦乾口鼻生瘡

黃連　白蕪荑（同黃連炒焦）

夜明砂（用水淘五次各一兩）

右為末獖猪膽汁和丸如菉豆大三丸至五丸不計時候麥門冬熟水下如久瀉不止服藥無效或肚脹氣促不能飲食米飲下取出疳蟲即差（莊氏家傳）

蟲蝕楊氏云凡乳哺不調臟腑伏熱所致也凡甘味入於脾而動蟲蟲動則侵蝕臟腑遂使孩提心下攫悶者上蝕齒齗則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下蝕肛爛濕癢生瘡瘡治不蚤精髓消耗難以有瘳疳蟲多因疳傷久痢腸胃受濕得之其狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名者言齒蝕腎主骨齒受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齦爛名曰潰槽熱血迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復生外證腮熱脈側手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒齦生瘡爪黑面黧身多瘡疥是也　錢氏地黃丸主之　仍當

參生脈散中多加黃耆以補肺　曾氏用調元散

調元散　主稟受元氣不足顱顖開解肌肉消瘦腹大如肺致語遲行遲手足如分何神色昏慢齒生遲服之効

乾山藥（去黑皮五錢）　人參（去芦）　白茯苓（去皮）

茯神（去皮）　白术　白芍藥

熟地黃（酒洗）　當歸（酒洗）　黃耆（蜜水炙各二錢半）

川芎　甘草（炙各三錢）　石膏

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時溫服如嬰孩幼嫩與乳母同服

九味地黃丸　治腎疳

熟地黃（焙四分）　赤茯苓　山茱萸肉

川楝子　當歸　川芎

牡丹皮　山藥　史君子肉

右為末煉蜜丸桐子大每服八十丸空心溫酒下

張渙蘆薈散　治急疳蟲蝕傷臟腑上蝕口齒生瘡爛世呼為走馬疳

黃礬（炒令汁盡）　蝦蟆灰　白礬（枯各半）

牛黃（另研各一分）　熊膽（一錢研）

麝香　蟾酥（一分各）

右件藥一處拌勻爲細末每服一字煎荊芥湯調下如有瘡處宜蔥餳之如鼻癢即取少許送口吹鼻中日三兩上

熊膽膏 截急疳病

真熊膽十兩 蚺蛇膽各末 蘆薈研

牛黃研各一分 龍腦 麝香各研一分

右件藥都細研以井華水一小盞攪和勻以磁器盛重湯慢火熬成膏每服一豆大薄荷湯化下並塗患處

聖膏 治急疳侵蝕

人乳汁半合 黃蘗一栗大 白礬一栗大

石膽大一豆

右件藥都研細以綿裹內乳汁中浸經一宿然後右味慢火熬成膏每用少許塗於口裏如鼻中有瘡滴入少許若有惡肉少許以針刺破除去惡血然後即塗此藥

二金散 治急疳出血

砒霜一分 麝香半兩

右件藥先將砒霜於紙上炒過後入麝香同研令細每用一字以雞羽掃在瘡上日便三兩度

張渙藥無名[illegible]方

治小兒肝疳并疳氣[illegible]

沒藥炮 甘草炙一兩 雄黃

木香半 胡黃連各一兩

右件為末用豬膽肉丸如麻子大每服荊芥湯下一二丸

劉氏家傳用此方

張渙五疳保童丸 治小兒乳食不揀傷於肥膩恣食甘鹹臟腑不和生疳

黃蘗 苦楝根皮 夜明砂

五倍子 蘆薈 黃連

龍膽草 白蕪荑 乾蟾炙令焦

麝香少許 蟬蛻去土 豬膽

右件藥末煮糊為丸如麻子大一歲兒三丸不拘時米飲下日三服忌豬肉

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連 黃連 白蕪荑去扇

蘆薈 木香 青皮

白雷丸 鶴蝨微炒 麝香

右為末粟米飯丸綠豆大每服一二十丸米飲下

[illegible]肝疳[illegible]

頸項結核或耳內生瘡肌體消瘦發熱作渴飲食
少絕肚腹膨脹或牙齦蝕落爛壞腐臭或陰囊生
瘡或胸脇小腹作痛並効肉青皮以龍膽草
錢分之劑各不用尤効
蘆薈丸 主五疳八痢蚘蟲臟腑虛羸身體羸瘦頭
髮焦疎腹脹青筋小便白濁渴水[illegible]不肝
熱皮乾化瘡身瘦瘡疥神色乾燥且羸大能不食壯
氣止痢除蟲長肌
南木香　丁香各一錢半　訶子煨去核
肉豆蔻麵裹各半兩　使君子肉　蘆薈各一錢
[illegible]子肉壹兩剉用巴豆慢火炒黃
右除使君子肉蘆薈切於乳缽內極細杵停勻前
次將前四味微炒焦候香熟取出地上候冷去
巴豆不用同研和勻細末再入乳缽內研[illegible]
一兩打爛為丸作麻仁大每服一二十丸至三五十
丸溫米湯送須是空心服之兒小米湯化服
萬應丸　治諸疳諸熱有效飲食不進瘦弱發熱
面色萎黃
五靈脂　[illegible]　胡黃連　青皮去白
陳皮去白　黃柴　神麴

麥芽炒黃　三稜煨　蓬朮煨
蕪荑　檳榔　龍膽草
川楝子肉　使君子各一兩
右除檳榔不過火麥芽二味外餘十一味剉碎炒
令微焦色候冷同前檳榔麥芽研為細末水煮麵
糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸或七十丸溫
米清湯無時送下或空心兒小者丸粟殼大粒數
下去同前
濟方五疳金丹　治小兒一十五種風疾五般
疳氣髮落燥熱使痢黃花叢腳細肚脹肚上青筋
頭髮稀疎多喫泥土搔髮毛咬指甲四肢羸瘦瘡
蚘咬心攢痢血伏饑饉多嗽瘡蝕口鼻赤白瘡痢
眼雀目恣皆能治
青黛研細如粉上等者一分　雄黃一分研細良方二分
龍腦少許研細良方一分　朱砂一分研細良方一分　膩粉一分良方十字
胡黃連[illegible]　熊膽[illegible]
白附子二枚良方一分　[illegible]
麝香研少許　蟾酥一皂子大[illegible]
水銀[illegible]
右件一十三味細研杵羅為末後再都入乳缽內

右為細末研令勻用豶豬膽一枚取汁熬過浸蒸餅少許
為丸如黃米大曝乾於瓷器內收密封或要旋取
每服二丸各依湯使如後小兒患驚風天吊戴上
眼睛手足搐搦狀候多端但服藥一丸用温水化
破滴入鼻中令嚏噴三五遍後眼睛自然放下搐
搦亦定更用薄荷湯下二丸小兒久患五疳四肢
瘦小肚高聳眉咬土咬指甲髮稀疎肚上青筋粥
飲下二丸小兒變蒸寒熱薄荷湯下二丸化破服
小兒久患瀉痢米飲下二丸小兒久患疳蚘咬心
苦楝子煎湯下二丸小兒[illegible]亦[illegible]

并口瘡等用兒孩子奶汁研二丸塗在患處小兒
患疳眼雀目用白羊子肝一枚以竹刀批開內藥
二丸在肝內以麻縷纏定用淘米泔水內煮令熟
空心服喫仍令乳母常忌毒魚大蒜雞鴨豬肉等此
藥常小兒常服三兩日喫一服永無百病不染橫
夭之疾凡有患[illegible]

蟾死紅丸子 治[illegible]

郁李仁 [illegible]

麝香 [illegible]

右先研郁李仁細爛次入膩脂麝香同研用粟米

[illegible]出血附肌肉不收毛髮焦黃並是疳疾細研

乾蝦蟆 [illegible] 胡黃連 [illegible]

[illegible] 肉豆蔻 [illegible] 白皮一

雷丸 蘆薈 [illegible]

[illegible]

右為末麵糊為丸菉豆大雄黃為衣每服十五丸
飲下

張氏香蟾丸 治五疳殺蟲消肚脹上瘡生瀉痢

鳳膽 [illegible]

乾蝦蟆 [illegible] 大黃連 [illegible] 蕪荑仁

蘆薈

右件等分為末豬膽麪糊為丸如桐子大每服四
十粒用飯飲吞下不拘時一日二服至三服忌生
冷宿食毒物

任氏[illegible]甘丸

熊膽 [illegible] 蕪荑去皮各壹錢 麝香壹字

胡黃連 [illegible] 大乾蟾 [illegible]

[illegible]

右件先將熊膽細研次入[illegible]得香次入胡黃連[illegible]
研令勻[illegible]將熊膽以沸湯鎔化再入前[illegible]

細為丸如麻子大每服三丸至五丸一日三服
溫水下量兒大小臨時加減丸數
張氏蝦蟆丸　治五疳羸瘦不長皮毛焦疏揉鼻咬甲好
食泥土腹大頸細痢如泔澱乳食不消小便白濁
綠礬半斤　棗去核一升
右先用醋五升并礬并棗熬後入黃連肆兩訶子
去核貳兩史君子貳兩夜明砂貳兩乾蝦蟆肆箇
燒灰存性同搗碎入前藥內攪勻直到乾焦為度
再搗羅為末棗肉丸如黍米大三四歲每服二十
丸米飲下乳食前

錢氏夜明丹　治五疳腹脹目澀多睡
夜明砂微炒一兩　胡黃連　草龍膽
苦楝根各半兩　乾蝦蟆五箇燒存性研細末後用並
蘆薈　青黛　麝香一分各研
右件一處拌勻粳米飯和丸如黍米大每服十粒
米飲下不拘時候量兒大小加減
劉氏金蟾丸　治小兒五疳腹脹合面臥渾身青腫
肚大無度渾身壯熱口舌生瘡頭髮穗下臍凸心腹
脹滿喘粗不思乳食合面多啼喉嗌進飲食不化或
吐利增寒多渴咳嗽遍身赤腫十指皆瘡餘各啼齒

味更研令勻糊為丸如綠豆大每服三四歲十丸
四五歲十五丸米飲下食後服
丁氏保童丸　治五疳消化宿滯進食長肌肥按兒
胡黃連　草龍膽各半兩去蘆紫色
史君子　木香　蘆薈細研各一
大麥蘗半兩巴豆二十粒去皮心同炒麥蘗紫色去巴豆不用取麥蘗為末
川苦楝一分炒紫色
右為細末同研令細用醋糊為丸如綠豆大每服
十粒至十五粒米飲下不拘時候此藥大治小兒
疳腹脹

吳氏黃耆飲子　治小兒五疳或傷脾腹脹髮黃肌
瘦髮豎頭上虛汗日漸羸瘦或泄瀉
綿黃耆一兩　人參　陳皮去白不
白茯苓　白檳榔極大　甘草炙各半兩
肉豆蔻一箇不蛀
右為麤末每服三錢水一大盞慢火煎至七分去
去滓時時與服溫啜
趙氏家傳治小兒五疳退黃養肌肉解積熱壓驚消
飲進食
史君子二十箇　胡黃連半兩　五靈脂

蝦頭各一分炙令焦　麝香各研　蘆薈
熊膽二分各研
右為末燒粟米飯為丸菉豆大每服二十丸米飲
下
治小兒五疳面色黃瘦身體壯熱吹乳食不能消化
大便澀痛及胸膈痰壅愛食酸鹹當多瀉痢
胡黃連　母丁香　黃連去須炒
蘆薈　熊膽研　麝香細研各一分
蝦蟆一枚塗酥炙焦黃
右為末用牛膽和丸菉豆大如患心藏疳煎燕竅
甘草湯下二三丸食疳瀉血或赤白痢新汲水下三
丸肝疳不止及水瀉牛黃湯下眼疳羊子肝血與
酒和各半為引下二九[illegible]用此方
蘆薈丸　治五疳瀉痢腹脹羸瘦
胡黃連一兩　五靈脂
右為末積豬膽汁丸麻子大米飲下
[illegible]之新者為疳病[illegible]
[illegible]
[illegible]

又五疳新方久瀉內外因者
白檳榔木香丸
木香　青橘皮　檳榔
肉豆蔻一分　麝香半分研　縮砂仁一兩
三稜[illegible]
右末為丸如菉豆大每服三五丸至一二十丸粥
飲下食前
漢氏云小兒久用冷湯好將冷池頻躁啼叫飲食
不進漸成瘦瘠疳痢明有不癒者但大便洞泄
百藥不效是也因女子百藥俱試而無一[illegible]中者竟
與錢氏木香丸不數服而愈自後凡有此證無不
驗
治熱疳胡黃連丸
胡黃連　黃連各半兩　朱砂一分
右上二物為細末研入朱砂末都填入豬膽內用
淡漿煮於砂銚子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆
薈麝香各一分飯丸如麻子大每服五七丸至一
二十丸米飲下食後　一方加蝦蟆半兩不燒
[illegible]
無辜疳　巢氏病源論言　時壯熱飲食不生肌膚積

名曰月隱殄死者謂之無辜言天上有鳥名無辜晝
伏夜遊洗濯小兒衣席露之經宿此鳥即飛從上歇
而取此衣與小兒着并席與小兒臥便令兒生此病
此病小兒無辜腦後有核如彈丸捏之反下轉是
也凡小兒有此物如禽獸舌下有禁蟲若不速去當
損其命此核初生軟而不痛中有蟲如米粉得熱氣
漸長大大則筋結定定即蟲隨血氣流散所有停留
子母相生侵蝕藏府此肉作瘡或大便泄膿血致使
小兒漸漸黃瘦頭大髮豎手足細弱從茲夭折也
夫小兒無辜疳痢者大腹泄痢膿血毛髮皮膚枯槁

肌體日漸瘦瘠腸胃虛弱無時節故名無辜疳痢
也　漢東王先生云小兒無辜疾者古云天上有一
鳥名無辜因曬小兒衣物失取過夜遇此鳥過尿之
令兒啼叫諸病所生日漸黃瘦者非也此蓋是八邪
所傷得之其八邪者饑飽勞役風驚暑積謂之八邪
久則令人日漸黃瘦喫食不長肌肉夜間多哭身上
或發微微壯熱多渴喫食不知饑飽或生瘡癬是也
人朱氏八片錦歌孩子無辜病爲母作爲若人能
識護安得兒尪羸驚癇成風疳寒熱作氣疹須交除
病乳須更着重衣喫食無令早能言不怕避論中入

頭皮光皙皙毛髮蕭離
鼽眼胞黃久四肢瀉身生癮疹遍體是瘡痍爲痢無
休歇增寒少定時繞臍全不顧行焉豈能騎白量時
中現清涎口畔垂齦牙須咬甲舉手要揉眉夜夜登
瓜果朝朝食上泥傷腸肚狀亦當何妨　食無
休歇就眠似醉迷

肥兒丸　治小兒腦後項邊有物如彈子按之轉動
軟而不痛名無辜疳久服神效

胡黃連　神麴炒　麥糵各伍
檳榔煨　木香貳錢　肉豆蔻炮錢麪裹煨

史君子肉各參錢

右爲細末蒸餅丸如黍米大用米飲送服

聖惠鱉甲散　治小兒無辜疳頭細肚大毛髮乾立
作穗

鱉甲參分塗醋炙令黃去裙襴　檳榔參錢
沉香　漏蘆　牛蒡子微炒
史君子　赤芍藥　訶梨勒皮
甘草炙微赤剉各壹兩

右件擣羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分
去滓不計時候量兒大小分減溫服

治蝎虎尸…[illegible]蟲毒

乾蝎虎 燒存性 蝦蟆殼 燒灰

膠花 [illegible] 各一分 蜜陀僧 細研

麝香 [illegible] 龍腦 細研 雄黃 [illegible]

右件同研細末以煎米[illegible]和丸如黍米大每服[illegible]

以猪[illegible]下乳食後

香蘇湯 治[illegible]辟邪

漏蘆 [illegible] 沉香 [illegible] 牛黃 [illegible]

訶梨勒皮 [illegible] 安息香 [illegible] 鱉甲 [illegible]

乳香 各半兩

右件搗羅為細末同乳香拌勻每服一錢水八分入人參少許煎四分去滓放溫熱服量兒大小加減

張渙無辜疳痢[illegible]粉散 定痢截疳

胡粉 [illegible] 白龍骨 水磨雄黃 [illegible]

樗木根白皮 漏蘆 白馬夜眼 [illegible]

各半兩

右件為細末都拌勻每服一字至半錢以粥飲調下乳食前

治無辜[illegible]

地膽丹 蘆薈 一分 漏蘆 各一兩

胡黃連 地榆 [illegible]

雞肝 [illegible] 猪肝 [illegible]

右件同於石臼中搗一二百下成膏和丸如黍米大每服十粒[illegible]食前[illegible]量兒大小加減

梅肉散 治無辜疳痢不止日夜[illegible]身體浮腫

烏梅肉 炒乾 綿黃耆 乾薑 [illegible]

川黃連 蘇木 乾薑 [illegible]

甘草 炙各一兩

右件搗羅為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓放溫時時與服

藍葉湯 治無辜疳血痢不斷

藍葉 一兩 地龍 人參 去蘆頭

烏梅肉 冬瓜仁 黃連

赤茯苓 [illegible] 各[illegible]

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫服[illegible]

天竺丹 治無辜疳痢久不差

天竺黃 一兩 乾蝦蟆 [illegible] 胡黃連

蘆薈子 [illegible] 砒霜 一分

已上各事炒令黄同研於大炭火上焙令乾 赤石脂出陕令已上前藥研細末次入

麝香一分

右件都研勻，軟飯和丸如黍米大，每服五粒，乳汁下，量兒大小加減服之。

豆蔻湯 治小兒無辜疳痢久不止，手足逆冷。

肉豆蔻去殼 乾薑炮，各一兩 龍骨

當歸 厚朴去粗皮，生薑汁炙令香熟，各半兩

附子一枚，重半兩，炮，去皮、臍 丁香半分

右件搗羅為粗散，每服一錢，水八分一盞，入生薑三片，煎至五分，去滓溫服，乳食前。

朴附丹 治無辜疳痢，赤白相雜。

厚朴去粗皮，生薑汁炙令香熟 訶黎勒皮煨，去核，各一兩

附子一枚，炮，去皮、臍 龍骨 烏梅肉

赤石脂各半兩

右件搗羅為細末，煉蜜和丸如黍米大，每服十粒，米飲下，乳食前。

人中白散 治小兒無辜疳氣，發熱積滯不化，腹肚脹痛。

人中白一分 麝香半分 蝦蟆炙酥

蘆薈各半兩

右件藥細研為散，每日空心及晚後用熱水調下一字半錢，服後當下惡物，量兒大小加減服之。

朱砂丸 治小兒一切無辜疳，黃瘦腹痛，或痢有蟲，治之良驗悉主之。

朱砂細研，水飛，一分 雄黃細研，水飛，一分 蘆薈

胡黃連各一分 麝香一分，細研 乾蟾一枚，炙令黃焦

右件藥搗羅為末，都研令勻，用粟米飯和丸如麻子大，每服以粥飲化下二丸，空心午後各一服，量兒大小以意加減。

決明子丸 治小兒冷熱無辜疳，或時驚熱，或時夜啼，大便青黃白汁，頭熱身熱，頭髮作穗，四肢黃瘦，不多食物。

用馬蹄決明子貳兩，搗羅為末，煉蜜和丸如麻子大，每於食後以熟水下三丸，更量兒大小加減服之。

漏蘆散 治小兒無辜疳，肚脹，或時瀉痢，冷熱不調。

用漏蘆壹兩，搗細羅為散，每以豬肝壹兩，散子壹錢匕，少許相和，以水煮熟，空心頓服，粥飲下。

漏蘆丸 治小兒無辜疳痢，羸弱，不欲飲食，及腹內

蝸動作多則清水

漏蘆二兩　豬肝一兩焙乾　樗樹根白皮一兩剉

右件藥搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如彈子大每服以溫水研一丸不計時候量兒大小分減服之

聖惠又方用地膽子壹兩搗細羅為末每服壹錢以豬肝壹兩入鹽少許煮熟無時量兒大小分減食之

治小兒無辜疳痢不止方　幼幼新書　五三三

右用燕石子貳枚炒令赤黑色搗細羅為散以麵水調作餅子爐熟卻研為末不計時候以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

外臺秘要治小兒無辜疳痢方

當歸　龍骨　黃連

人參　赤石脂　甘草炙各壹兩

右六味搗篩蜜和丸服三丸日再以意為度大小增減服之

外臺秘要急療小兒瘦頭髮乾無辜兼痢方

右用蝸蝸兒搗絞汁服三合以差止

子母秘錄治小兒無辜痢赤白兼成疳方

右用胡粉熟蒸熬令色變以飲服之

[illegible]治一歲至兩歲小兒無辜痢方

右用夜明砂熬搗為散任意拌飯并吹食與喫三歲兒亦無辜

[illegible]聖惠五疳久而不差則腹內有蟲肌體黃瘦下痢不止宜服藥出之則疳氣漸退其蟲狀如絲髮或如馬尾多出於腹背及頭項上若蟲色黃白及赤者可治青色者不可療也

聖惠朱砂丸　治孩子疳痢辨蟲顏色定吉凶　幼幼新書　五三三

朱砂半兩細研　阿魏如豆大　蝙蝠血三兩

麝香少許

右細研入少許口脂調先用桃柳枝煎湯浴兒後看兒大小以藥如大豆許安臍中後用紙可臍中貼之用青衣蓋兒看蟲出若黃色輕青黑色重

聖惠乾蟾丸　治小兒五疳及驚風出蟲定生死

乾蟾一枚五月五日者良　蛇蛻皮一條　穀精草二兩

入瓶子內以鹽泥封燒令通赤放冷取出研　胡黃連

瓜蒂　母丁香　牛黃

龍腦　朱砂　雄黃

蘆薈　天竺黃　麝香各一分
青黛一兩
右件藥擣羅為末入乳鉢內研令極細用猪膽汁調麪
糊和丸如粟米大一二歲兒以溫米泔化下
五丸服藥後以桃柳湯浴兒以青衣蓋覆當出
蟲於上及背上髮如細毛或如麻絲黃白者易治黑
色者難治黃白色易治仍宜常服下二丸日三服
甚者半月內差
麝香丸　治小兒五疳羸瘦毛髮乾焦口鼻多瘡有
蟲
麝香　蘆薈　粉霜
朱砂各一分　蟾酥一皂子大
蛇蛻皮伍寸燒灰　蝙蝠三箇取血研入藥末　[illegible]三十燒灰
右件藥都細研以油蠟和丸如小豆大先以桃
柳湯洗兒後用藥一丸塗於臍中上以醋麪封之
良久即蟲出黃白赤者易治黑者難療
蘆薈丸　治小兒五疳四肢乾瘦腹脹氣麤頭髮[illegible]
服宜服此出蟲
蘆薈　牛黃　蟬殼各一分
膩粉　粉霜　硫黃[illegible]

麝香各一　田父一枚[illegible]
[illegible]去皮　蛇蛻皮一條燒灰
右件擣極細末令勻以粳米飯丸如菉豆大每服以
溫水下二丸良久煎桃柳水浴兒後以青衣蓋覆
身當有蟲出白黃色者可治青黑者難治
出蟲丸　治小兒五疳久不差羸瘦極甚
朱砂　麝香　牛黃
蝸牛子炒　夜明砂炒　熊膽各一分
蟾酥半分
右件藥都細研以麪糊和丸如菉豆大每服以溫
水下三丸更別以水研一丸滴向鼻中得嚏五七
聲良久當有蟲隨汗出立効
乾蟾丸　治小兒五疳出蟲
乾蟾一枚[illegible]　天靈蓋[illegible]　麝香半分
[illegible]　鱉甲[illegible]一分
右件藥擣細末用[illegible]和丸如黍豆大二歲已
下以蛤粉湯下一丸三歲已上至五歲二丸服藥
後續以桃柳湯浴兒後用青衣蓋之當有蟲子出
赤白者[illegible]黑者[illegible]
熊膽丸　治小兒五疳出蟲

熊膽　朱砂　麝香
蚺蛇膽　蟾蜍炙　瓜蒂各半
右件藥為極細末入研了藥令勻用豬膽汁和
丸如菉豆大先用桃柳湯浴兒了用粥飲下三丸
以青衣蓋當有蟲出也
定命散　治五疳有蟲
乾蝦蟆燒灰　蚘蛻皮燒　蟬殼各一分
右件為極細末入麝香末半錢研勻但是一切疳
每于時後以煖水調下半錢一二三歲即服一字後
煎桃柳湯放溫浴兒了便用青衣蓋當有蟲出即
効

幼幼新書卷　五十六

青黛丸　治五疳體熱乾瘦髮立鼻癢有蟲不欲飲
乳
青黛　蘆薈　人中白各半
豬牙皂角　蟬殼各半分　麝香一分
胡黃連三分　膽涎　人乳汁各少許
右件為末五月五日午時修合以粽子肉棗肉及
蝸涎乳汁丸如黍米大以桃柳湯浴兒後以米飲
下三丸後以青衣裹兒看有蟲子出頭黑者不
治白黃赤者易差

錢乙附方麝香丸　治疳氣疳蟲作
胡黃連　白蕪荑半　麝香一分
黃連　木香各一分
右末麪糊丸如菉豆大米飲下五七丸至三五歲
可十五丸無時
錢乙楡仁丸　治疳熱瘦悴有蟲久服充肥
楡仁　黃連各一兩
右為末用豬膽七枚破取汁與藥同和入甑內乘
上蒸九日每日一次候日數足入研麝香半錢湯
浸蒸餅和丸菉豆大每服五七丸至一二十丸米
飲下

幼幼新書　五十三

張渙小兒食乳後早食肉太早或腸胃怯者甜膩化
為蛔蟲數多啼叫涌沫腹中作痛肚脹青筋唇
口紫黑搖頭齧齒是其候也　不欲飲食惡心吐蛔
涎生積冷稍難行腐餐甜物并將果致得蟲生病轉
深　先用史君子散磨蟲丸取蟲後溫脾胃
史君子散　治小兒蛔蟲
史君子十枚去殼麪裹煨　甘草膽汁浸
白蕪荑各一分　苦楝子炮去核
右末每服一錢水調服

蘆薈丸　治小兒疳䘌

蘆薈　安息香　胡黃連

枳殼麩炒各一兩　史君子三錢去殼　蕪荑一分

定粉半兩　麝香少許

右末豬豬膽糊丸如菉豆大五七丸米飲吞下

殺蟲三根散　治蛔疳蟲動啼叫不止每至月初間

尤甚狀如神祟

貫衆根　棠梨根　醋石榴根各一兩

栗刺　故綿　乾漆各半兩

右件藥六味並燒灰存性搗羅為細末每服一錢

用水八分煎四分去滓放溫服不拘時候

化毒丹　此方治蛔疳不差傳染兄弟姊妹

鬼臼去毛一兩　苦參　青箱子

草龍膽各半兩　硫黃　雄黃

[illegible]　白礬各一

右件藥並燒灰存性搗羅為細末煉蜜和如麻子

大每服十粒用[illegible]洗香湯下量兒大小加減

豬肚丹　治小兒疳瘦盜汗多倦少力大便有蟲

經久[illegible]

川黃連　胡黃連　木香各一兩

[illegible]　蘆薈　肉豆蔻

[illegible]　白蕪荑各半兩

右件搗羅為細末用豬肚一個洗刮令淨先以

好香白芷酒內煮中極熟去白芷不用却入

諸藥縫合再蒸如泥取出同豬肚搗二三百下成

膏丸如黍粟大每服十粒米飲下不拘時候量兒

大小加減

殺精丹　治諸病下蟲如絲髮或如馬尾甚者便至

夭傷

殺精[illegible]

乾蟾[illegible]五月五日　皂莢

胡黃連　瓜蒂　丹丁香各半兩已上

粉霜　蘆薈

麝香各一分

右件都搗為末用豬膽汁和如黍米大每服十粒米

泔放溫下量兒大小加減

桃柳湯　服諸藥後用此法助之

桃枝　柳枝

右件[illegible]以水[illegible]大鍋煎數沸適寒溫浴兒甚[illegible]

浴兒單用一[illegible]之疳蟲自出為驗

小兒令肚皮無顏色啼聲小面狀似心痛往往口吐
發動有時醫人不識妄呼見是不知小兒食蟲
鴻肉化為蟲此方大効苦楝丸

苦楝根　鶴蝨　朱砂各一

檳榔叁箇　麝香一錢

右末麵糊丸如小豆大每服三丸白湯下日三服

忌生冷物

下蟲丸　治疳蛔諸蟲

新白苦楝根皮（酒浸焙）　綠色貫衆

木香　桃仁（浸去皮焙）　蕪荑（炒）

雞心檳榔（各貳錢）　鶴蝨（炒一錢）　輕粉（伍分）

乾蝦蟆（三个炙焦）　史君子（肉炒伍十個）

右為末麵糊丸麻子大每服一二十丸天明清肉
汁下内加當歸用連各貳錢伍分

聖惠蟲食脊膂身熱羸瘦積中乜熱煩渴下利拍背
如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頻齧爪甲是也

聖惠金蟾散　治小兒脊疳則大渴瀉細口服黃湯服

大胸蟾乙隻乾者

蟾（一隻大者塗酥炙令焦黃）　夜明沙（微炒）　桃白皮

樗根白皮　地榆　黃蘗（各剉）

訶梨勒（煨用皮）　百合　白鮮皮

人參（去蘆）　川大黃（剉碎微炒）　黃連（去鬚各一分）

胡粉三分　丁香（研）　檳榔一分

右件藥搗細羅為散每服用粥飲調下半錢日三
服

地骨皮丸　治小兒脊疳壯熱潮熱黃瘦以手指擊之背
如鼓響脊骨高兒也其肉嫉熱所致

地骨皮　紫參　黃耆

川大黃（剉碎微炒）　郁李仁（湯浸去皮尖微炒各半兩）

黃連（去鬚）　子芩　枳殼（麩炒微黃去瓤）

木香　豬苓（去黑皮）　海蛤（細研各一分）

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫
水研下五丸日三服量兒大小加減服之當得微
利為効

殺疳丸　治小兒脊疳日漸羸瘦腹中有蟲

波石子　瓜蒂　鶴蝨（各半兩）

蟾頭（炙令焦黃）　蘆薈（細研）　青黛（各半兩細研）

麝香（細研）　膩粉（各一分研入）

右件藥搗羅為末以粟米飯和丸如黍米大每服
以粥飲下五丸日三服量兒大小以意加減

蘆薈丸 治小兒脊疳腹大有蟲上攻背脊消瘦骨立

高肌蠶蘭澱

蘆薈 青黛 朱砂

麝香各細研 熊膽研入 胡黃連

龍骨 地龍微炒 黃連去鬚

蟬殼去足微炒 雷丸各半兩 蝦蟆壹枚灸令焦

右件藥搗羅爲末用蝸牛肉研和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小增減服之

朱砂丸 治小兒脊疳四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾疎時時煩渴脊骨如鋸

脊疳 幼科入 五二

青黛散

青黛 朱砂各細研 夜明砂微炒

定粉各壹分 蟾酥研入 熊膽細研

羚羊角屑 犀角屑各半分 黃連去鬚半兩

麝香細研壹錢

右件藥搗羅爲末用軟飯和丸如菉豆大每一歲以粥飲下二丸

第五脊疳十指爪甲瘡痛頭髮焦乾肚腹虛鳴脊骨如鋸時時下痢狀如青淀或膿或血朱砂丸

天靈蓋酥炙黃 柴胡 白朮

麝香壹錢各壹分 檳榔壹兩

右件藥肉爲丸如麻子大每服三丸米飲送下

米氏治小兒脊疳瀉血不止方

定粉 好棗肆個 頭髮少許

右件爲團以紙裹火燒通赤細研米飲下半錢

莊氏治小兒久下血不止謂之瀝脊疳方

用穿山甲米醋浸炙爲末每服一錢米飲調下食

空服

腦疳 胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗顋腫顋高是也

但入水鑑小兒一歲已下多隨臥合面在地者便是

脊疳 幼科入 六三

腦中疳氣宜服此方

黃葵花 菊花 釜下墨

消石 梧葉各等分

右爲散吹入鼻中米不合鼻外塗也吹鼻中有惡物如泥涕數條即便是腦中疳氣此是殺人之本

小兒腦疳乳母宜服此方

梔葉 桃葉 黃葵花

鼓子花 蟬殼 虎骨

檳榔 大黃各等分

右件十味爲末與蠟三升煎膏丸如菉豆大每服空

心飲下三九効

藥性論治小兒驚癎方

右研[illegible]不以多少為細末每用少許吹鼻中嚏

驚癎鼻中嚏

聖惠牛黃丸 治小兒驚癎壯熱[illegible]

牛黃 [illegible] 龍膽[illegible]

胡黃連 木香 犀角[illegible]

龍腦 麝香各細研 蟾酥[illegible]

青黛細研[illegible]

右件藥搗羅為末都研令勻以麪糊和丸如黃米

大每服以溫水下五丸日三服量兒大小以意加

減

龍腦丸 治小兒腦疳羸瘦煩熱

龍腦 麝香 雄黃各一分

胡黃連末 牛黃 朱砂

熊膽 蘆薈 乾蝦蟆[illegible]

右件藥都研令勻以水化熊膽和丸如麻子大

若要更入糯米飯同丸每服用薄荷湯下三丸

日三服量兒大小以意加減

吹鼻龍腦散 治小兒腦疳鼻癢頭髮作穗[illegible]

[illegible]

龍腦 [illegible] 蝸牛殼[illegible]

蝦蟆灰 瓜蒂 黃連[illegible]

細辛各一分

右件藥搗細羅為散入瓷合內貯之每取少許吹

於鼻中每日兩上用之

又小兒[illegible]目乾澀是因食與生肉如此腹內有蟲方

鶴蝨二分 茯苓一兩 木香一分

苦楝根三兩 檳榔[illegible]

右先將二味根用水一斗煎成膏然後將三味為

末拌和成丸如綠豆大每服二五丸米飲下

第七[illegible]心煩[illegible]肉生瘡頭髮自落

日夜啼[illegible]

[illegible] 木香 胡黃連

麝香 雄黃各一 [illegible]

金銀箔各[illegible]

右末煉蜜丸如麻子大每服一丸米湯下

通腦丸 治腦疳[illegible]

龍膽草　升麻　苦楝根皮
赤茯苓　防風　甘草
油髮灰[illegible]　杏仁[illegible]　黄連[illegible]
右為末，豬膽汁浸糕糊丸麻子大，溫漿湯下，仍
以蘆薈末入鼻。
腎疳：身體壯熱，或時憎寒，舌澀口乾，唾多盜汗，皮膚
枯燥，髮立毛焦，乳食雖多，肌肉消瘦，四肢無力，好臥
昏昏，目作[illegible]，[illegible]痒，兒耳[illegible]，瘦瘁少血，其
乾多啼，其病在心；目不轉睛，鑑啼無淚，其病在肝；身
熱尿乾，手足逆冷，其病在腎；齊焦皮燥，大便乾結，其
[illegible]
病在脾；搭口鼻，瞪眼，唇脫乾渴，其病在肺。
仙人水鑑：獨治乾疳方
天靈蓋　生鼈甲　波斯青黛
[illegible]
右並同研令細，日服一字，空心熱水下。若是濕疳
不治，乾疳治之不過三服即効。
聖惠天竺黄散　治小兒乾疳，心藏煩熱，眼目亦澀，
皮膚乾燥，夜多盜汗，羸瘦不能乳食。
天竺黄[illegible]　牛黄　雄黄
朱砂　蘆薈　麝香各細

[illegible]　[illegible]　犀角[illegible]
木香　[illegible]　鉤藤各[illegible]
[illegible]
右件藥搗羅為散，都研令勻，每服以溫水調半
錢，日三服，量兒大小以意加減。
治小兒乾疳，[illegible]熱，眠臥不安方
[illegible]　雄黄　蘆薈
[illegible]　丁香　黄連去鬚
[illegible]　蛇蛻皮灰　天竺黄
天漿子[illegible]　犀角屑各一分　胡黄連半兩
[illegible]　又方
[illegible]　麝香細研壹錢
右件藥搗羅為末，更研令勻，以煉蜜和丸如菉豆
大，每服以粥飲下三丸，日三服，量兒大小以意加
減。
青黛丸　治小兒乾疳，肌體羸瘦，皮毛乾焦，發歇寒
熱，昏昏多睡。
青黛細研　牛黄　蘆薈
朱砂　麝香　雄黄各細研
胡黄連　蛇蛻皮灰　龍膽去蘆
蟬殼微炒[illegible]　[illegible]

右件藥細研為末都研令勻用麪糊和丸如黍米
大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小臨時增
減

牛黃丸 治小兒乾疳煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸
瘦

牛黃半錢細研 雄黃細研 黃連去鬚
蘆薈 天竺黃各壹 龍腦
麝香各壹錢細研 甘草半分炙微赤剉

右件藥搗羅為末都研令勻用糯米飯和丸如菉
豆大每一歲以粥飲下一丸

胡黃連丸 治小兒乾疳瘦弱不能乳食髮立膚乾
肌體柴瘦

胡黃連壹兩 朱砂 波斯青黛
蘆薈各壹分 麝香壹分 蛇蛻皮壹條燒灰
蟾酥一杏仁大

右件藥都研為末用豬膽壹枚取汁湯浸一盞和藥
末都於銚子內熬如膏丸如菉豆大五歲至七歲
以粥飲下五丸日三服三歲已下三丸

蘆薈散 治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無
效者

青黛
地龍 夜明砂微炒 乾蝦蟆炙
熊膽各壹分 麝香貳分

右件藥都細研為散每服半錢空心以粥飲調下
更用少許藥吹入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒
衣蓋有蟲子出為效也

治小兒乾疳潮熱羸瘦心神煩躁少得眠
臥

牛黃細研 朱砂細研水飛過 子芩
犀角屑各 麝香細研各壹分

右件藥搗羅為末都研令勻以糯米飯和丸如麻
子大每服用粥飲下三丸量兒大小增減服之

按乾疳既是消渴之漸則當以人參白朮散加減
八味丸之類補而潤之若專恃已上諸丸藥恐無
濟理

肉疳 聖惠云小兒乳食不消心腹虛脹服用瀉藥體
熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦腐蝕肛腸日
月彌深痢轉不止故號肉疳　錢氏云疳在內則目
腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也

卷十九

消積丸　治癥積消瘦及痢疾下痢肚腹脹滿不消
乳食積聚及癖積消瘦肚脹　丁香
厚朴去粗皮薑汁炙　甘草炙　訶子
陳皮去白
青皮
右為細末煉蜜和丸如小豆大每服一丸米飲
化下兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下
元方無青皮
大順湯丸　治小兒失乳以食飼之不能剋化或
生腹脹四肢瘦弱或利色無常
陳皮　半夏　蒼朮
人參各半兩　藿香　枳殼
麵末各一分　青皮　厚朴各三
右為細末麵糊丸如麻子大每服十丸溫湯送
下忌飽食
保童金粟丹　治腹大瘤瘦好喫泥土泄利不調
乾蝦蟆五枚　川黃連　草龍膽各壹
母丁香　厚朴　蕪荑
夜明砂　蟬殼　訶子皮
麝香　好朱砂　青黛

好朱砂研
右件一處研勻用煉蜜一斗白麵糊一匙和如菉
米大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減
木香檳榔丸　治小兒宿滯癖塊發熱
莪朮　厚朴各一　白朮半兩
右為細末煉蜜丸如小彈子大每服一丸米飲化
下三歲已下半丸
小兒胃大泄瀉水穀不化與食不知飢飽
神麴炒　麥芽炒　三稜
青皮　香附　山查
厚朴　甘草　藿香
枳實　地黃　砂仁
黃連　麥芽各等分
右為末白湯調下當兒加減
肥兒木香丸　治小兒內疳乳食不調心腹脹滿肚
脹及瘦下痢無常
木香　蟬殼　麝香
黃連　胡黃連　熊膽
夜明砂　乾蟾　赤石脂
肉豆蔻　川芎

右件搗羅為末用水浸蒸餅和丸如麻子大每服
以溫粥飲下二丸量兒大小以意加減
麝香丸 治小兒內疳四肢痿瘦腹脹鼻癢皮膚乾
燥下痢不常
蘆薈 雄黃細研 沒石子
蟬殼去足炒 蛇蛻皮炙 丁香
熊膽研入 各 麝香細研 蟾酥一錢研入各
一分 黃連去鬚 各半兩
右件藥搗羅為末煉蜜和丸如黃米粒大每服以
粥飲下二丸日三服別研一丸吹入鼻中量兒大 七三
小以意加減聖惠又孜治疳方
蘆薈散 治小兒內疳下痢不止四肢黃瘦諸治未
差
蘆薈 蟾頭炙 蛇蛻皮炙
夜明砂微炒 蝸牛炒 青黛
沒石子各一 黃丹 定粉各一兩炒
訶梨勒用皮 各半兩
右件藥搗羅為散都研令勻每服以粥飲調下
半錢早晨午後各一服看兒大小加減服之
胡黃連丸 治小兒內疳下痢不止肌膚消瘦

胡粉微炒 青黛細研各 黃連
麝香壹錢
右件藥同研令細以豬膽汁浸取汁和丸如黃米
粒大不計時候以粥飲下二丸量兒大小以意加
減
張渙保命丹 治內疳
皂角去皮炙令黃色 雄黃兒斤 巴豆去皮細研
丸上出
右細末以粟米飯和丸如小豆大空心溫水下三丸
錢氏云疳在外則鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡
不著痂漸延耳生瘡今分走馬疳口齒疳鼻疳眼疳 七三
腦疳列諸方如左
論走馬疳蝕之極也乃五臟蒸熱上攻者即
作崩沙及牙齦肉腥爛口內氣臭身微有潮熱
吃食不得齒齦出鮮血常動搖或欲脫肉爛自消落
治之先以淡淡鹽湯洗口內即下紫金散摻之一
三次用救苦追肉內藏如大段甚即下秋霜散摻之
然後節飲食黃芪天竺黃散調理先或
以天竺黃散與地黃膏亦好如此調理即安如
調理不退先落齒一兩[illegible]不治相次[illegible]

齒消見骨而死　形證論先與追脾獨聖散吹齒
[illegible]丸服後用此藥貼斷上以大棗膏丸如小豆許
若入孩入砒在內燒灰存性臨睡時貼斷上數次効
[illegible]凡得此候多因氣虛受寒及有宿滯留而不去
[illegible]熱虛熱之氣上蒸或食甘酸醃濕之物而[illegible]
[illegible]滯日久齒黑上[illegible]致齒焦黑爛開出
[illegible]膿血[illegible]口齒臭[illegible]穿破
[illegible]不便[illegible]此[illegible]若走馬[illegible]治之之法
[illegible]大[illegible]用當歸散合[illegible]敗水調[illegible]投蒸
[illegible]凡[illegible]飲[illegible]以鹽[illegible]灌漱或軟雞翎蘸藥小掃
[illegible]　四[illegible]
[illegible]乾仍以燒鹽散內金散蜜陀僧散傳之若經
久不愈者傳於唇之上下乃成崩砂語或穴發滿腮
齒落[illegible]飲食減少氣促痰喘必致危矣
[illegible]金散[illegible]先生名[illegible]　治小兒走馬疳

黃丹　蛇床子[illegible]　地龍[illegible]
青黛[illegible]

右末[illegible]服一字[illegible]斷上一日三次揩

秋霜散　治小兒崩砂

好砒[illegible]　白礬[illegible]

右用水三分一盞先煎水令[illegible]砒後便下砒[illegible]

水乾[illegible]下白礬末同[illegible]乾為末取出入好
香少許[illegible]少許同[illegible]合為末每使一字用鵝
毛點揩牙斷上一日三兩遍揩[illegible]愈

心根秋霜散　治崩砂齒[illegible]欲落

砒霜　砒[illegible]　白礬[illegible]

右為末用北艾一大團裹定上作藥末以石灰滲
艾上[illegible]火燒盡細研以手捻少許揩齒
上用鹽湯漱口燒時[illegible]定恐走了藥氣

乳香丸　治走馬牙疳[illegible]

乳香[illegible]　輕粉[illegible]　砒[illegible]

右先將乳香研細入輕粉[illegible]砒共再研勻用薄紙
一韭葉闊去藥內[illegible]過[illegible]許[illegible]入臨
臥將[illegible]在患處至明則愈[illegible]食醬醋[illegible]物

錢乙龍骨散　治疳口瘡走馬疳

砒霜　蟾酥[illegible]一　粉霜[illegible]
龍骨一[illegible]　定粉[illegible]一[illegible]　龍腦[illegible]

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同
研[illegible]許傳之

右方皆犯砒[illegible]不用

[illegible]入水銀治小兒走馬疳蝕透損骨者方

右用天南星一枚當心剜作竅子安好雄黃一塊在內用大麥麪裹煨候雄黃鎔作汁以盞子合定出火毒一宿去麪研爲末入好麝香少許掃在瘡上驗

集驗方治小兒走馬疳

右用蠶退紙不計多少燒成灰存性入麝香少許貼患處妙

[illegible]小兒崩砂方

雞內金　蘆薈　白礬火煅

乳香　地龍　麝香

右各少許爲末候小兒睡着以藥末摻牙斷上

定命散　治小兒走馬疳

白礬　綠礬各等分

右同研勻用大麥麪伍錢葱一寸研爛將麪同搜和捏得所爲餅子將研勻者藥裹在中心用文武火燒存性於地坑內出火毒一宿又研如粉入銅綠二錢同研令細每用一剜耳許揩牙上一二遍

蟾灰散　治小兒走馬疳

乾蝦蟆[illegible]　五倍子[illegible]

麝香少許

右同研爲末用漿水調塗齒根上未止更用之

聖散子　治小兒走馬疳

砒霜　龍膽草[illegible]

右同於瓦瓶中煅煙盡略存性出[illegible]於地上

安金散　治小兒走馬疳

天南星[illegible]　綠礬壹兩

右件各排內在乾地上用礬與南星同處四邊以炭火燒煅紅爲度取出後研如粉入當門子壹[illegible]

[illegible]先含漿水漱口貼之

劉氏家傳李琥珀者散　治小兒走馬疳急用口臭牙齒損爛及攻蝕唇鼻頰爛累治不效者可用此方

麝香[illegible]　黃蘗[illegible]　青黛半兩上

銅綠[illegible]

右件研極細如有患者先以綿纏筯揩却齒上蝕損死肌以帛拭去惡血量瘡大小乾摻口二五次用之或血[illegible]作瘡不[illegible]加定粉半兩同研一用如前法

[illegible]散

龍膽草（剉） 青膽礬

右等分用甘鍋子一箇先入膽礬在內次入龍膽草用鹽黃泥固濟留一眼子週迴用炭火燒至眼子上煙斷為度放冷取出研細入麝香少許如有患人看瘡內大小乾摻貼之立效牙疼齒搖牙根有縫血出并腫爛牙搖之即愈

孔氏絲瓜散 治小兒走馬疳

麝香（別研壹分） 真蟾酥 綠礬（各半分）

膽礬 沒藥（各貳分）

右四味一同用大瓢一口擊中心作竅穴子（[illegible]）週迴使安內味藥在穴中週迴用紅着炭三斤燒過取出同麝香再研勻如有患者以雞翎後蘸藥末摻於小兒齒上立效

王氏千金方治小兒走馬疳口鼻生瘡牙斷腫爛諸藥不能治者

櫻桑（[illegible]） 麝香（少許）

右以麝香為末入醋調傅桑上炙乾又塗又炙凡塗炙數遍為末（[illegible]）乾摻

安師傳走馬疳藥方（此方[illegible]齒中不[illegible]）

右[illegible]燒灰止血時間令住[illegible]

又[illegible]為末貼之便水止

翁氏疳蝕散 治走馬疳牙根肉爛黑臭

橡斗子（不拘多少）

右每用大者兩箇入鹽[illegible]合成五六箇[illegible]於火內和鹽燒透取出[illegible]以碗蓋定存性候冷入麝香少許乳缽內研細[illegible]勻每以少許搽患處常收用小瓶盛貯勿使紙裹蓋能作潤

內金散 治牙疳肉臭爛黑色有蟲作痛

雞內金（[illegible]） 白芷

銅青（各半兩） 麝香（壹字）

右前三味剉曬或焙為末後以麝香乳缽內同研勻每用一字或半錢乾搽患處先用溫鹽水漱後傅藥

[illegible]僧散 治走馬牙齒焦黑爛

蜜陀僧（壹兩） 輕粉（[illegible]） 麝香（壹字）

右件為細末同研勻[illegible]缽內研勻每用半錢擦患處

走馬牙疳神效方

乾[illegible]白礬[illegible]子燒焦存性為末傅患處（[illegible]）

白礬乾為末入冰片少許搽患處立効

右白水銀乃以下不拘多少

治走馬牙疳用銅桐中自然火煅過每□錢入銅□

麝香分麝香壹分末傳之立愈

紅鉛散　治走馬疳

綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒灑拌勻再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以温漿水洗淨用指蘸藥有瘡處點之

演山蘭香散　治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩砂出血齒落者

輕粉壹錢　蘭香子末壹錢　密陀僧半兩

右研如粉傳齒及齦上立効

議曰□□□□□□□候多端良由氣熱□□□□分五藏内有腎經常虛得斯名之曰急以馬奔喻治療頗難此第一潘初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽又或血出名曰宣露重則齒自脫名曰腐根其根既已何由理之

一名將軍方見效於後

傳齦立効散

石研勻每以少許傳牙齒齦上又一方用蟾酥一字加麝香和勻傳之

議曰血之流行者榮也氣之循環者衛也鬱滯足以飲食之間深思有傷於榮衛而作衆疾其或氣□□□血傷於熱熱毒攻之虛藏所受何藏為虛□□□見腎之一藏常主虛不可令受熱毒攻及腎□□□筋骨惟齒受腎之餘氣故先作疾名曰走□□□□孫而作所宜服藥清露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以蘭香散立效散及麝酥膏傳之切□□□食熱毒之物此疳不同常證乃係無辜有作胃宜深究保全為上若用常方難擬愈活

□□□□飲子　治腎疳臭息候

天麻　木香　獨活

防風　麝香少許另研

石谷　錢重為末每服一錢七小者半錢麥門冬熟水調下

三黃散　治腎疳崩砂候

牛黃　大黃　生地黃

木香　壹錢

右等分爲末每服一錢七熟水調服

人參散 治腎疳潰槽候

肉豆蔻煨 胡黃連 人參

杏仁炒 甘草炙

右件各等分爲末每服一錢七小者只半錢溫熟水調服

[illegible]榔散 治腎疳宣露候

木香 檳榔 人參

黃連 甘草炙

右等分爲末每服一錢小者半錢熟水調服

黃耆散 治腎疳齦根候

黃耆蜜炙 牛黃 人參

天麻 全蠍炒 杏仁炒

白茯苓 川當歸 生地黃洗

熟乾地黃洗

右等分爲末每服一錢小者半錢七調天門冬熟水調服天門冬去心

地骨皮散 治腎疳齦爛牙齒肉爛腐臭鮮血常出

生乾地黃洗焙 地骨皮 細辛各等分

五棓子[illegible]

右件[illegible]之服良功効晚不妨

謂[illegible]所受良由其名

令逃腎疳一證[illegible]者最爲要急不可[illegible]常

此疾其中有五種候傳過疾可畏乃知走馬之號

不誣須發之時兒後口臭上干口齒頭[illegible]漸

潰爛所肉生瘡或成州其齒便黑又道從牙

內[illegible]作瘡[illegible]疳敗[illegible]也又[illegible]滿牙時時血

出[illegible]熱[illegible]久[illegible]六七歲孩落盡

不復更生皆可治療以並[illegible]方速與傳變而理

不待疾作而後藥也

漢東王先生朱砂膏 治小兒腎疳[illegible]

朱砂半兩 鵬砂 馬牙硝各一錢

真珠末一錢 玄明粉二錢 龍腦

麝香各一字

右件各爲末於一處拌和合用好瓷盒盛起不以多少每用成膏如小兒[illegible]候與藥一黃豆大常用金銀薄荷湯少許化開下如遍身潮熱用甘草煎湯下狂躁恐叫用生地龍自然汁化下一臟及一日日內小兒不過下藥可用藥使乳調塗在奶上令牙兒吮[illegible]

茅先生牛黃膏 治小兒驚熱及諸驚鎮心解熱

川鬱金(一兩用皂角巴豆煮乾不用皂角巴豆)
馬牙硝 甘草(半兩) 朱砂(壹錢)
鵬砂 寒水石(各半兩) 龍腦
麝香(少許)

右件為末煉蜜為丸如皂子大每服一丸麥門冬熟水化下

天竺黃散 治小兒諸熱

天竺黃 川鬱金(用皂角水煮乾) 茯苓(去皮)
麥門冬(各半兩) 蟬蛻(去足) 全蠍(去土拾肆個)
白僵蠶(各拾肆個) 甘草(炙壹兩) 朱砂(壹分)
龍腦 麝香(少許)

右件各淨洗研羅為末每服半錢一錢用蜜熟水調下

解牛黃散 治小兒潮熱實熱

白僵蠶 全蠍(去土) 防風
白附子 川黃芩 桔梗
川大黃 甘草(炙) 白茯苓
人參 川鬱金(用皂角水煮乾)

右前件各等分為末各淨洗細研每服半錢一錢用薄荷蜜熟水調下

黑眼地黃膏

天竺黃散 未散 二方並方初生門重舌條

形證論檳榔散

檳榔 大黃(蒸) 青皮(各貳錢)
黑牽牛(壹錢) 木香(少許)

右為細末每服半錢米湯調下一錢

消毒散 三稜散(宿食)
消宿丸 五福飲(驚熱)

牙疳 聖惠云其疾唇口邊漸牙齒斷黑乃上唇臭爛

乾熱候內爛漸臭齒皮膚……

孩此即走馬疳之輕而侵者聖惠所谷以太過治法宜清胃散甘露飲內服外用五倍子(燒)綠礬(煅)入中白等分入冰片少許搽牙或加檳榔末殺蟲亦可

譚氏殊聖治小兒大人牙疳諸惡瘡方

黃丹(飛過) 乳香 白礬(飛)
坯子胭脂(各壹錢) 輕粉 麝香(少許)

右件為細末若瘡大小臨時用藥先用漿水洗瘡淨上藥乾摻

聚寶方黃礬散 治大人小兒齒斷宣露骨槽風小

小兒急疳斷齦爛惡臭疳

黃礬（壹兩入甘鍋燒通赤） 生乾地黃

梧桐律 川升麻（分） 乾蝦蟆頭（炙焦）

右件為末每用半錢乾貼患處及咋津吐出以甘草水漱

口一兩服立効 一方用熟乾地黃及蟾頭燒灰

錢氏家傳方治小兒口中疳瘡牙斷下部有蟲燒大麻

仁研塗之

錢氏家傳治小兒牙疳壞爛方

白礬灰 坯子胭脂

右各等分為細末羅過貼患處

張氏家傳青霞散 治小兒口齒疳

蝦蟆（燒灰存性） 甘草（炙） 青黛（各等分）

右研為細末更入真麝少許或兒滿口有瘡臭爛

一落下牙齒者以雞翎掃上立効凡用先以鹽湯漱

口了乾拭用

安師傳治小兒口齒疳蝕斷疳瘡如白膜者

用輕粉黃丹等分乳汁和塗敷上即時如殼退下

治小兒疳蝕動脣齒及瘡生方

蟾頭（炙焦） 麝香半錢

右研勻如粉摻於上立効

治小兒脣口及齒根宣露牙斷生瘡臭爛方

蒼蘗（炙） 胡黃連（各貳錢） 黃丹（半兩）

右為末每半錢於牙斷上貼之不得嚥津[illegible]

治牙疳斷爛久不差者

[illegible] 輕粉（各伍分）

[illegible] 真珠（貳分） 龍骨（貳分）

右為細末用冷茶洗淨將藥敷上

[illegible]著肺之候若小兒乳食

不調上焦壅滯[illegible]鼻也其候鼻中赤癢

壯熱多啼皮毛乾焦肌膚消瘦咳嗽上氣下利無常

鼻下連脣生瘡赤爛故曰鼻疳者也

治小兒鼻下赤爛心胸煩熱[illegible]漸漸轉多及身

上焦躁口乾瘡痍[illegible]之方

訶子（半兩） 豆蔻（去皮） 黃連（各壹分）

防風（半兩） 宋砂（壹分）

右為末飯丸麻子大每服荊芥湯下三丸

湯氏五福化毒丹 治驚熱涎潮胸膈煩悶

玄參 桔梗 茯神 赤茯苓

人參 馬牙硝 青黛

甘草一分炙 麝香研各 一方有銅青

右除麝香外為細末次和麝香研勻每服[illegible]

水如無以燈心湯化下痧疹餘[illegible]

薄荷湯[illegible]鮮血宜[illegible]用

生地黃汁化下食後

滑石散 治小兒肺熱鼻衄[illegible]鼻下赤爛

川芎湯 甘草炙

山梔子仁各等分

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲一錢

甘草湯調下一日二服宜兼用青金散傅之

白栝杷葉散 治鼻瘡赤爛

枇杷葉去毛蜜炙 山梔子 各一兩 百部

檳榔各等分

右為細末每服三錢兒小者五錢更小一錢白湯

調下

田氏治法先用甘草白礬湯洗淨後摻瘡上黃連末

藥末日三傅 一方用米泔洗黃連末傅日三四

次亦佳

青金散

銅青 白礬生用各等分

右為末每用少許傅鼻下

錢氏蘭香散

蘭香葉菜名燒灰二錢 銅青半錢 輕粉二字

右為細末令勻看瘡大小乾貼之

張渙石膽散 治鼻瘡爛并瘡蝕於鼻下及連

唇生瘡赤爛

石膽一兩 地龍二分洗淨 頭髮一兩燒灰

莨菪子生用各半兩

右件搗羅為細末入麝香一錢同研勻每服一字

貼於瘡上

呂氏家傳治鼻下赤爛瘡方

青黛二錢 麝香少許 熊膽一錢

右末貼研以少許付鼻下

朱氏家傳治小兒鼻下瘡爛瘡方

右用大棗一枚去核以白礬包填內裹中文武火

煅存性細研塗瘡加蘇乾以麻油調塗

聖惠治小兒鼻瘡吹鼻蟬殼散

蟬殼微炒 青黛細研 蛇蛻皮灰

滑石 麝香細研各一分

右件藥搗細羅為散都研令勻每用綠豆大吹入

鼻中日三五次之病即瘥

錢氏白粉散　治諸瘡

海螵蛸骨末各七　白及末各七

輕粉各七

右末先用清漿水洗拭過貼之

聖惠龍木論治小兒疳眼外障此眼初患時皆因腦頭上有瘡或因經日多時瀉痢潛衝於肝淚出難開膈間伏熱氣肝風入眼初患此疳時癢澀揉眉咬甲致令翳生赤腫痛淚出難開臉硬白睛遮滿怕日合面臥不喜擡頭此疾不宜燒灸頭面恐損眼也切忌點藥宜服殺疳散退翳丸　聖惠論夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疳氣肌體瘦羸而臟腑挾於風熱壅滯不得宣通因其乳食過多胸膈痰結邪熱之氣上攻於目則令腦熱目癢或赤爛生瘡或生障翳漸漸遮睛久而不差損於眼目故號眼疳也

玉訣云此患先與涼腦後瀉肝次淋洗之即無悞也又云此患小兒肝熱宜瀉肝散蕤仁膏涼腦退熱又云小兒疳眼雀目因疳入眼者先與利膈退熱涼心經後與肝藥也

龍木論殺疳散

防風　龍膽　牡蠣

白芷　細辛　五味子各二兩

右為末每服一錢食後粥飲調下

退翳丸

紫參　防風各一兩　細辛

石決明　車前子各半兩　桔梗

黃芩各半兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大空心茶下十丸

玉訣瀉肝散

木賊　威靈仙　紫參

家菊花　羌活　蟬蛻去足

大黃　甘草炙　石決明各等分

梔子少許

右為末每用藥二錢豬肝一兩批開去膜摻藥在內綫纏米泔煮熟嚼下

蕤仁膏

蕤仁四十九粒去皮出油　腦子少許

右研成膏用燈心點少許

靈苑犀角丸　治肝肺積熱眼生努肉赤脈澀痛及赤眼障翳痛癢攻疼羞明及小兒風疳爛眼

神妙

羚羊角（鎊）　甘草（生）　白何首烏
茯苓（以砂糖各一兩洗）　生乾地黃（洗）
鬱金（火炮濕紙裹各二兩）
右件六味並細剉曬乾擣羅為細末煉蜜為丸如梧桐大每服十五丸用濃煎淡竹葉黑豆湯冷下食後臨臥服小兒丸如菉豆大每服七丸至十丸

錢氏殊聖退雲散　治小兒疳眼澀暗饒啼不住
草決明　土瓜根　大黃（炮）
玄參（各半兩）　甘草（炙）　宣連（去鬚）
砂石（井泉石是研各一分）（別本加人）
右細為散每服一錢水一盞同煎至七分去滓溫服與

張渙井泉石散　治眼疳邪熱攻於眼目漸生翳障致損睛瞳
井泉石（一兩）　晚蠶沙　夜明砂（各微炒）
石決明　甘菊花　黃連（去鬚各半兩）
右件擣羅為細末每服一錢用米泔一盞入生豬肝少許煎五分肝爛為度放溫時時服乳食後

張家傳豬膽黃連丸　治小兒疳瘦大治肝疳作眼疾白膜遮睛諸藥不瘥者
胡黃連　雄黃（細研）　夜明砂（細研各等分）
豬膽（數箇）　麝香（少許不入煎）
右為末以豬膽汁調藥稀稠得所都入元膽皮內以線繫緊口米泔水煮十七沸取出放冷先以麝香於乳鉢內研細却入藥一處同研（膽皮不用取出藥候）細用軟飯為丸如大麻子大每服十丸大者加至十五丸米飲吞下如疳氣盛須用陳米飲下

治小兒肝藏風熱眼中不見物及有汗方
石決明　乳香（各半兩）　龍膽（各一分）
大黃（煨）（別本加人）
右為末每服兩錢用薄荷湯水調下

錢氏云疳濕之病多因久利脾胃虛弱腸胃之間蟲動侵蝕五藏使人心煩懊悶其上蝕者則口鼻齒齗生瘡其下蝕者則肛門傷爛皆難治或時下利或因[illegible]好食甘美之物[illegible]致生此病也[illegible]大小兒皆食甘味多[illegible]致令侵蝕藏府此猶是[illegible]之物皆入於胃其氣[illegible]其所蒸之味而歸之脾與胃[illegible]其味甘而甘味先入於脾胃[illegible]蟲動

則從傳成瘡也但瘡內目而發故名之爲瘡也若蟲
蝕下部則肛門生瘡爛開名爲後日便死宜速療之
夫小兒乳食不節冷熱相乖傷於臟府致瘡氣也
若脾胃虛弱則哺乳不消大腸虛寒遂變泄痢因其
痢不止腸胃俱虛爲水濕所乘腹內蟲動侵蝕下
部故名痢濕𧏾也

千金除熱結腸丸　斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦
雜血肛中瘡爛坐𧏾生蟲

黃連　檗皮　苦參
鬼臼　獨活　橘皮
芍藥　阿膠各半兩

右八味末之以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至
十丸冬無藍汁可用藍子一合舂蜜和丸

藍湯千金治濕𧏾

生藍汁　白蜜叁合　黃連叁兩

右三味以水二升煮黃連取一升去滓內藍汁
更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

杏仁湯千金治𧏾

杏仁五十枚　苦酒貳升　鹽壹合

右和煮取五合頓服之小兒以意量服

治𧏾下部方

胡粉　雄黃

右二味各等分末著穀道中亦治小兒

張渙桃白散　治腸胃俱虛腹內蟲動侵蝕下部瘡
痢濕𧏾

桃木白皮　黃檗蜜炙　黃連去鬚各一兩
蛇蛻皮燒灰　乾蝸牛一分燒灰　青州棗五枚去核燒灰

右件同搗羅爲細末入定粉麝香各一分同研勻
每服一字粥飲調下乳食前

又方

乾蟾末炙　蟬殼半兩　蚺蛇膽
大棗去核燒一分　麝香各一分細研　黃丹
定粉

右件同搗勻用好醋一大盞熬搗二三百下成膏
如黍米大每服五粒至七粒米飲下量兒大小加
減或化三兩粒塗患處若蟲出乃愈

錢乙金華散　治小兒一切濕瘡癬疳

黃檗　黃連各半兩並爲細末　黃丹一兩火飛
輕粉一錢　麝香一字別研

右同研勻先以溫水洗後貼之

化蟲丸　治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹
痛唇口紫黑腸頭濕䘌
蕪荑　蘆薈　青黛 研
川芎　白芷梢　胡黃連
川黃連　蝦蟆灰各等分
右為末豬膽汁浸糕和丸麻子大每服一二十丸
食後臨卧杏仁煎湯下其蟲自下[illegible]
洗後預藥各進數服却用香油調塗亦小豆瓜蔕
地龍[illegible]
肥瘡 幼科 惡大小兒頭瘡生於頭上不癢不痛常有 九六
汁出汁所流處隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦
是風濕搏於血氣所以不癢不痛故名肥瘡也　錢
乙論瘡在兩耳下亦爛自擦鼻頭上有瘡不著痂者
是耳生瘡治鼻瘡爛蘆薈散諸瘡白粉散 二方並見鼻瘡條
主之
浪溪四珍丹　治諸瘡瘙瘦臣髮焦黃目昏生瘡
乾大蝦蟆一枚大者[illegible]
[illegible]
麝香 一錢　蘆薈 一兩
右件細研令勻以白麵糊和如黍米大每

服五粒至七粒溫水下量兒大小加減
熊膽丸　治疳瘡久不愈
熊膽　[illegible]　蟾酥 各
黃連 [illegible]　麝香
牛黃各一分　龍腦 [illegible]
右件細研勻以井華水三合攪勻盛銀器中重湯
煮成膏每用少許塗患處
治小兒一切瘡瘍杏膏方
苦楝皮　七姑葉　甘草
白蘞　蛇床子
幼科 九七
右為散每用水五升煮五七沸旋旋淋洗瘡處
如久患只兩服立效
譚氏殊聖治小兒瘡肥瘡多生頭上浸淫久不差及
耳瘡等悉皆治之
石綠　白芷各等分
右以生甘草水洗瘡後傅藥自愈
[illegible]曰凡治瘡不必細分五瘡
但虛則補之熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治
利積則治積蟲則治蟲不出肥兒丸一方加減用之
屢試屢驗

集聖丸

蘆薈　五靈脂　夜明沙炒

砂仁　橘紅　木香

莪朮煨　使君子肉各二錢　川連

川芎　乾蝦蟆三个　當歸

青皮各一錢

因於虛者加人參二錢白朮三錢去莪朮青皮　因於熱者加龍膽草二錢去砂仁莪朮　因於吐瀉下痢者加白朮三錢肉果煨訶肉各一錢伍分去青皮莪朮　因於積痛者加煨三稜川楝子肉小茴香各二錢去當歸川芎　因於瘧者加鱉甲醋炙二錢　因於蟲者加白蕪荑一錢伍分川楝子肉二錢去當歸川芎　因於渴者加人參白朮各二錢去莪朮砂仁

右爲細末用雄猪膽汁二箇和麵糊爲丸看大小服米飲送下　此方乃丹溪所定用夜明沙加黃連夜明砂砂仁不熱不寒補不致滯消不致耗至穩至妙

疳積散　治斷乳病乳夾乳夾與大病之後飲食失調或恣飲食過飽傷脾致成疳積面黃腹大小便色如米泔大便或溏或泄頭皮乾枯毛髮焦黃[illegible]

不可[illegible]

一補[illegible]

厚朴[illegible]

廣陳皮[illegible]　粉甘草[illegible]　木香各[illegible]

蕪荑[illegible]

[illegible]

旋復花[illegible]一　百草霜[illegible]二錢

右件勻和成劑用　每一歲用藥一分用燈心湯早上空腹時調服　服後病卽愈當再用肥兒丸調理如脾氣未實可啟脾丸或大健脾丸　如疳氣未盡用陳皮一兩白木香三錢白茯苓伍錢加好平胃散二錢陳米粥湯調服

疳眼方　用生雞肝一具不拘大小雄雌　一二三歲者只用半具以去衣內去筋膜研細如麵入疳積散若干調極勻加好熱白酒厚薄相和隔湯頓溫熱空心通口服用甜酒少加熱白酒亦佳　服至眼開翳散方止

疳瀉痢紅白和滯用散子加黃連酒炒肉果用濕麪包煨熟[illegible]燈心湯[illegible]加蜜少許調服　食積成疳砂仁湯

一調服

集驗方治小兒疳瘦不可療神効丹

綠礬 用火煆通赤取出用醋淬過復煆如此三次

右細研用棗肉和丸如綠豆大溫水下日進二三

服

元和紀用經蘆薈丸 主小兒疳瘦面黃髮直骨立

減食肌膚[illegible]

麝香研 蘆薈研 胡黃連末

右等分研勻滴水丸如黍米大一歲三丸三歲五丸

至七丸人參湯下日三服無比奇効一方胡黃連

肆分餘二物各一分療疳瘦溫瘧無比尤驗一名

通神丸疳黃百病無如此者小兒癇瘤驚風五疳二

蟲服之立見功効蚘蟲作疾枯瘦久痢不住鏡集

調護最難有以唯此名肺經以四味飲黑散依調

至聖散五加皮治不能行獨嘴飲介此麝香圓七

一方謂之芳嬰七寶紫陽道士亦名保子七聖丹貴

方略為一書若此是也

蘆薈金丸 治小兒一切疳久服令兒肥壯無疾

川楝子肉 川芎 各等分

右同為末豬膽汁和杵為丸如麻子大每服兒大小

加減丸數飲吞下日二服常服三丸食五

丸張氏家傳 綠豆大分五分用朱砂青黛為

衣粉光瑩 仍名為五色丸非時進米飲下孔

氏家傳治疳蟲 下蟲方 丙用臘月乾豬膽汁為丸

如綠豆大十丸十五丸肉湯下疳蟲

如髮便看即[illegible]化

太醫局蘆薈丸 治疳氣羸瘦面色萎黃腹脇脹滿

頭髮作穗揉鼻咬甲好吃泥土利色無定寒熱往

來目澁口臭齒齦爛黑常服去肌進食殺疳蟲進

乳食

乾蝦蟆 大皂角 [illegible]

青黛 蘆薈 麝香

朱砂

右[illegible]研勻湯浸蒸餅為丸如麻子大三歲兒服二

十丸不計時候溫米飲下量兒大小加減

錢氏蘆薈丸 治疳消瘦[illegible]止瀉和胃進食

膽黃 蕪荑 大棗

好醋 巴豆

史君子 黃連

訶黎勒 巴豆

已上五物同炒令黑約三分乾入後藥
夜明砂一兩　蝦蟆灰各五分　苦楝根皮一兩末生
已上三物再同炒候乾同前四物杵羅為末却同
前膏和入臼中杵千下如大硬更旋入棗肉亦
不可多恐服之難化太濕即入温水可丸即圓如
小麻豆大每服五丸至七丸米飲温水下不拘時
西京丁左藏蝦蟆丸　肥孩兒常服得効
乾蝦蟆大者一枚　陳皮去白各二
胡黃連一兩　雷丸　蕪荑仁各半兩
右為末於陶器內用豬膽汁和令稀稠得所作於
飯上蒸熟為度取出丸如菉豆大常服五七
丸陳米飲下
張氏神麴散　治小兒諸般疳
神麴　陳橘皮不去白　大黃煨熟
芍藥　桔梗　川芎
厚朴　白茯苓各二
人參　甘草炙
右為細末每服一錢入薑一片如茶法煎服無時
治小兒一切疳瓶消渴瀉痢不止日身羊豬水穀

蝦蟆灰　白礬　烏賊魚骨
蘆薈各二　麝香各二
右為末煉蜜丸如菉豆大温水下三丸聖惠方同
但麝香用半兩（張氏第五）
治小兒一切疳方（張氏第十四）
蟾頭一枚　胡粉　豆豉
蕪荑　黃連各二
右為末軟粟米飯為丸麻子大日晚米飲下三丸
蘆薈　胡黃連　朱砂
青黛　麝香各二　蟾酥
右為末飯為丸如芥子大每服空心臨臥温熟水
下五七丸
洪州張道人傳治小兒一十二種疳肝疳急疳風疳
肉疳骨疳口疳腦疳食疳蛔疳猪疳脾疳腎疳心疳定
生死有此候者取得蟲青者死黃者可治須服定
命丹
木香　丁砂　麝香各一
螺蚬三分　胡黃連　金箔
銀箔

右件爲末米飲丸如麻子大空心米飲下二三丸日
三服忌鹹酸油膩

第一[illegible]小兒斷飲乳漸與食肉尤愛酸鹹只服定
命丹次服此藥

檳榔二個　枳殼炒去穰　茯苓
胡黃連各半兩　大黃　甘草
丁香　麝香各二錢

右爲末每服一字米飲下日兩服久者五服効

演山史君檳榔丸　治小兒食肉太早傷及脾胃米
穀不分積滯不化夜作疳痢等候並宜服之

[illegible]

肉荳蔻一個　生檳榔一個　黃連
胡黃連　陳皮　青皮
川楝肉炒　蕪荑炒去皮　神麴
麥蘗並炒　木香　夜明沙炒等分
蘆薈　川芎各一分　麝香一字

右件爲末猪膽汁浸蒸餅爲丸如麻子大每服二三
十丸溫飯飲下

議曰積是疳之所以有積不治乃成疳候又有
治積不下其積存在臟虛成疳尤重大抵小兒所
患疳諸濕瀉無時不作屎候者何俱疳瀉名熱瀉
其臟腑轉動有限所以不成風候瀉瀉不減[illegible]
疳證作渴虛熱煩躁下痢膿滿喘急皆疳候虛證
古云疳虛用補虛是知疳之爲疾不可更利動臟
腑發作之初名曰疳氣腹大脹急名曰疳虛瀉痢
頻併名曰疳積五心煩熱名曰疳熱毛焦髮稀肚
大青筋好喫異物名曰疳極[illegible]寒熱往來形
容枯槁而無神采無血色名曰疳勞手足細小項
長骨露尻臀無肉[illegible]名曰[illegible]
頭皮分開作渴引飲[illegible]名曰[illegible]此皆疳
候又因多食生冷甘肥積聚滯中脘不化久亦
成疳治疳之法量候輕重理其臟腑和其中脘順
其三焦使胃氣溫而納食益脾元壯以消化則臟
腑自然調貼榮氣肌肉血脈相參則筋力骨力
俱運得清氣爽疳消積化漸次安愈者以攻之
五臟疎和[illegible]下大積再取出[illegible]
非治法若小兒臟腑虛則生熱虛則積滯虛則疳
氣虛則腹滿[illegible]下[illegible]更轉[illegible]致虛[illegible]虛
成疳疳虛證候乃作無辜疳氣之後難救矣
胡黃連丸　[illegible]一切疳候及一切瘡瘍但[illegible]藥無
功此藥神效

胡黃連　蘆薈　宣黃連
肉豆蔻（麵裹煨）　柏心　人參
朱砂　史君子（去殼）　木香
鉤藤　龍齒　白茯苓（以上各一錢）
麝香（研，半字）
右件各生用，爲細末，取豬膽二枚，瀉汁和末令勻，却入膽內，繫之，用線繫定，交湯煮半日取出，切破袋子，加蘆薈半兩，黃丹二錢，一味另研如粉，入前藥細勻，搗五百杵，丸如麻子大，但是府癖用粥飲下五七丸，至二九，不吃粥飲，乳頭令吮，能治一十二種癖疾，惡者功效非常。

議曰：癖之疾危矣，於瘰癧之後，進傳自於延久，爲初見其輕者，前後知其重者之猛，是以胸癖皆由積毒嬉之日服，肉虛以致虛，肉虛而傷害。嘗工見有此，見癖疾病家欲得便捷，買熱性急藥，惡取治療，剛逆不成，癖極而臟下，或熱盛而於作渴，或煩躁四肢，或飲食一時嘔吐，常方不能安愈，胡延傷和，五服此。

祕傳聖效丸　治小兒一切癖氣，肌瘦體弱，神困力乏，皆可服，及疳蟲積滯，開胃進食。

黃連（去鬚）　川楝肉（炒）　川芎（各）
陳皮　香附子（各二兩半）　乾木香（二兩）
右件爲末，水煮麵糊爲丸，如麻子大，每服三五十丸，溫飯飲下。

議曰：驚癇積癖，各分證候，用藥今有小兒患癇虛困，又作痢疾，一飲相川消，瘡之之極熱，後可療，乃虛受之然，不及所見其證，不得良方以何對治，雖得其方，不審其證，亦難療也。良由脈與病同，藥與證對，醫工進巧，扶而起之，必得安樂，胡黃連丸無以加矣，肥兒良方亦佐勝焉。

漢東王先生論小兒發熱，形瘦，食不長肌肉，皆謂之癖熱。湯氏云：癖熱宜服進食丸，疳積仍開服化蟲丸，後服鱉甲散退熱，次服肥兒丸。

湯氏鱉甲散　治癖熱骨熱
鱉甲
白芍藥（各一兩）　生熟地黃　地骨皮
當歸　人參（去蘆，各半兩）

右㕮咀每服二錢水半盞煎服

花蕊丸 治疳熱

白蕪荑 黃連 神麯

麥芽 各炒等分

右末糊丸如黍米大空心米飲下豬膽汁丸佳

豬肚丸 治骨蒸疳勞肌體黃瘦

木香 半兩 黃連 生地黃

鱉甲 [illegible] 銀柴胡 [illegible] 青皮 各一兩

右為末豬肚一枚入藥於內以線纏之於沙礶內懸胎煮熟取出細研和豬肚為丸如麻子大米飲送下量大小加減不拘時服

龍膽丸 治疳病發熱

龍膽草 黃連 使君子肉

青皮 各等分

右為末豬膽汁和丸如菉豆大每服三十丸臨卧熱水下量兒加減

世傳烏犀丸 治小兒疳熱腹內生蟲肚大手足瘦弱

丁奚乾蟾 [illegible]

黑牽牛 二兩 使君子 肉半兩 青皮 二[illegible]

雷丸 二錢 苦楝皮 [illegible]

鶴虱 [illegible]兩

右同入[illegible]炒焦為末麪糊丸黍米大三歲兒十丸米飲下[illegible]

二丁丸 治乳癖兼疳熱

白丁香 半兩 丁香 [illegible] 檳榔 各一[illegible]

輕粉 一錢 硫黃 三錢

右為細末糊丸如小豆大 歲兒十丸日晡時米飲下飲乳者乳汁下次日當下[illegible]惡物熟即隨退加黃鷰屎一錢尤妙

譚氏殊聖金瓜丸 治小兒疳熱身多壯熱黃瘦又服令肥

黃連 黃柏 甘草 炙 青皮 各等分

右為末入麝香少許用豬膽一枚入藥膽內線紮定入石器中漿水煮五七沸取出風乾一宿丸如菉豆大每服五七丸米飲下量兒加減王氏方同外以朱砂為衣仍治脾疳傳濟方同劉氏家傳方亦同云或添胡黃連名阜兒服史君子丸晚服金瓜丸永無疳病[illegible]長肌肉莊氏家傳方同仍加夜明砂一味[illegible]趙氏方亦同名京疳藥長沙采同理以為有神效

蘆薈丸　治小兒驚熱疳不思食

蘆薈　熊膽　朱砂各二錢

青黛七錢　訶梨勒煨取肉二錢　麝香一錢

右為末糯米飯為丸如麻子大空心隨歲數加之

用沙糖水送下五七丸

生柴胡散　治小兒疳熱四肢如柴不能起止

柴胡　知母　貝母去心

茯苓　茯神　乾葛

甘草炙各等分

右為末每服用小麥一匙頭藥一匙頭水一盞同

煎[illegible]分去滓服

六物黃芩湯　治少小腹大短氣熱有進退食不安穀為之不化

黃芩　大青　甘草炙

麥門冬去心　石膏碎各半兩　桂皮一錢

右每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

莊氏胡黃連丸

胡黃連一兩　[illegible]　宣連

天竺黃[illegible]　朱砂二錢　麝香一錢

肉豆蔻二個　牛黃半錢研

乾蟾一枚端午日取者酒浸

右件除研藥外為末再同研勻蒸豆粉煮糊丸如芥子大每服空心夜後熟水下三丸恐蒸豆粉難和用豬膽汁作糊亦得

王氏史君子散　治疳熱

右用史君子不拘多少爛乾為末空心米飲下大者一錢小者半錢取蟲出為度

肚黃連丸　治疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹或渴

用雄豬肚一個洗淨　宣連五兩剉細水和潤納肚中線縫放五升粳米上蒸至爛入臼中加少蒸飯搗杵丸如梧子大每服二十丸米飲下仍服調血清心之劑佐之

柴胡飲　治骨蒸疳氣五心煩熱日晡轉盛口乾無味渴多身瘦胸滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡去蘆淨洗　人參去蘆　當歸酒洗

黃芩　赤芍藥　甘草炙一兩

大黃生用　桔梗　北五味子去梗

鱉甲[illegible]各一兩

右剉每服二錢水一盞烏梅一個豆豉二十粒煎七分

煎稍溫服

即用丸治肺骨蒸兼諸咳嗽盜汗等證是也湯氏

鱉甲散豬肚丸皆骨蒸之藥

乾地黃煎 治小兒疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦

生地黃汁 酥 生薑汁

白蜜 一 鹿角膠

右先以地黃汁入鐺內慢火煎手不住攪約五六沸下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎後如稀餳即住火每食後兩度與一匙頭忌諸

毒物

王先生雞肉煎丸 治小兒十歲以上疳勞壯熱形瘦

宣連 銀柴胡 秦艽

知母 史君子 子芩 一

蕪荑 川鶴虱

右爲末以黃雌雞一隻重一斤專以大麻子飼之至五日後宰只七令淨於肋後開孔去腸肚淨洗拭乾入前藥末於雞腹內以線縫之取小甑先以黑豆鋪甑底厚三寸安雞在甑中四傍以

黑豆圍裹上亦以黑豆蓋之勿令出氣蒸令雞熟冷取雞去腹中藥及筋骨頭翅以淨肉研勻和得所如乾人酒麵糊爲丸如大麻子及小菉豆大每服十丸十五二十丸以意加減空心煎麥門冬熟水送下如小兒疳勞骨熱十五歲以上溫酒下

忌豬肉

錢氏三和飲子 治三焦[illegible]氣逆痰涎米食後嘔逆大腸秘澀及治山嵐瘴氣吐逆不美飲食[illegible]小兒疳勞吐乳及大人小兒久病年安神氣未復寒熱往來並皆救療

紫團人參 甘草 一兩半

綿黃芪 一

右件三味同入木臼內用木杵搗爲麤散每服三大錢生薑三片水一盞棗三枚同煎八分去滓服不拘時候

犀角散 治小兒骨蒸

銀州柴胡 川大黃 甘草

川芎 茯苓 芍藥

鱉甲 桑白皮 地骨皮

酸棗仁 黃芩 貝母 各七兩

右為末每服壹大錢水壹盞入青蒿[illegible]枝小麥[illegible]
粒煎七分温温服之大段有患更入麻黄連翹[illegible]
味與前藥等分為末煎服之効[illegible]

鼈血煎 治疳勞
蕪荑 柴胡 川芎各一兩
人參半兩 史君子二十一枚去殼 胡黄連
宣黄連各七錢
右用鼈血一盞吳茱萸一兩和二黄連淹一宿次
早炒乾去茱萸并血用二連入餘藥為末粟米粉糊
丸麻子大食前熟水下

黄連丸 治疳勞
黄連[illegible] 石蓮子 瓜蔞根
杏仁湯浸去皮尖 烏梅肉各二[illegible]
右為末牛膽汁浸糕糊丸麻子大煎烏梅湯
下

聖惠天竺黄散 治小兒疳多渴體熱煩躁少
得眠卧
天竺黄細研 黄連去須 馬牙硝
梔子仁 栝蔞根各半兩 甘草炙微赤剉
牛黄細研 茯苓 紫菀洗去苗

犀角屑 [illegible]
[illegible]件藥[illegible]羅為散都研令勻不計時候以蜜水
調下半錢量兒大小加減服之

治小兒疳熱渴不止方
乾蟾頭炙焦黄 蝸牛[illegible]
胡黄連 [illegible]各半兩
右件藥搗細羅為散每服以竹葉湯調下半錢不
計時候量兒大小臨時加減服之

無比丸 治小兒渴疳
豬膽 狗膽 牛膽
鯽魚膽 蝟膽各等分
右件藥以[illegible]入牛膽內懸北後簷候稍乾
可丸即丸如[illegible]米大每服以新汲水下或丸以飲
水[illegible]量兒大小加減

胡黄連散 治小兒[illegible]
胡黄連 [illegible]
羊子肝 [illegible]
右件藥[illegible]
羊肝汁[illegible]
藥[illegible]量兒大小加減服之

黃連丸　治小兒消渴煩躁

黃連去鬚　[illegible]　半夏各細剉

甘草炙　麻子仁　款冬花

鐵粉研　紫菀去土　犀角屑各[illegible]

川朴硝半兩　竹瀝貳合

右件藥搗羅為末先用竹瀝拌和更入煉蜜和丸如菉豆大每服以新汲水研破伍丸服之日四五服量兒大小加減

聖惠又方

右用蝸牛叁伍拾枚淨盆內以物蓋一宿即有銀泥[illegible]和搜作丸如黍米大不計時候以溫湯下貳丸

又方

杏仁[illegible]湯浸去皮尖　膩粉壹錢

右件藥研杏仁如膏入膩粉相和令勻用麵糊和丸菉豆大空心以粥飲下叁丸

錢乙龍粉丸　治疳渴

草龍膽　定粉微炒　烏梅肉焙秤

黃連各貳分

右為細末煉蜜丸麻子大米飲下壹貳拾丸無時

[illegible]丸　治小兒疳渴引飲不休肌体羸瘦

胡黃連　蘆薈　朱砂

鶴虱各等分

右為末猪膽汁和丸菉豆大每服叁丸米飲下

劉氏治小兒疳渴方

猪胞[illegible]　甘草[illegible]

右以水[illegible]甘草將胞焙乾末之每服貳錢以叁錢[illegible]下大人亦可服

張氏治小兒渴疾方

右用蛤粉[illegible]以粉塗頂上刮下涎入粉同研丸雞頭大每服壹丸更用活小鯽魚壹尾木半盞浸涎木壹藥注子化下一丸立止便與和氣散方見[illegible]壹貳服補之

又方　治疳渴不止

井泉石　太陰玄精石　馬牙硝

右各等分為末入牛[illegible]以生米泔水調下

吉氏家傳方

乾葛　胡黃連　甘草炙

黑參　麥門冬去心各[illegible]分

右件為末每服壹錢水半盞薑壹片煎肆分服

治小兒疳渴常服五疳不生方

乾蝦蟆貳枚長流水內浸去肚腸以法酒叁升醃內煮令稠去骨研如膏

黃連別為末 硃砂研各壹錢 麝香研半錢

右先將蝦蟆膏與黃連末同研後更與麝香硃砂等研勻作丸如菉豆大每服拾丸陳米飲下如患疳渴黃蠟茶清下如難丸入些少酒麪糊不妨

治小兒一切疳熱渴方

蛤蟆壹兩大者 [illegible] 蝸牛壹兩半 [illegible]

已上貳物 [illegible]

疳痛者 [illegible]

黃連 [illegible] 麝香 [illegible]

右為末麪糊丸如芥子大每服叁丸至伍丸米飲下 [illegible]

治小兒疳渴方

人參 葛根

柴胡 甘草炮各壹錢 黃芩

右為末每服壹錢水半盞 [illegible] 煎至五分去滓候冷分為伍服每 [illegible] 冷水不拘時候

之方治疳 [illegible]

聖惠防己丸 治疳嗽不止

防己 牽牛子 馬兜鈴炒

甜葶藶隔紙炒各 [illegible]

右為末煉蜜為丸如菉豆大每服拾丸煎糯米飲下與溫肺散相間服

溫肺散

蘇孫根半兩 甘草炙 [illegible]

右為末每服壹錢蜜熟水調下

小兒肺疳多是吃食熱果食及病妳傷損心肺便生喘嗽悶悶不辨冷熱以藥攻之變成黃腫漸覺 [illegible]

沉香服杏仁散

杏仁 [illegible] 甘草 [illegible] 款冬花各 [illegible]

麝香 [illegible] 胡黃連各壹錢 半夏 [illegible]

右件為末每服壹字煎湯調下日進貳服

疳癥 [illegible] 身瘦肚膨脹頭髮立身熱肚中 [illegible] 此門所論 [illegible] 傳為 [illegible] 候治之先用勻氣散醒脾散 [illegible] 取下疳積 [illegible] 下了勻氣 [illegible] 常服 [illegible] 丸 [illegible]

訣云疳氣腹脹 [illegible] 先與 [illegible] 胃氣後與取虛積 [illegible]

被疳藥

人乙牛黃丸 治小兒疳積

雄黃研水飛　天竺黃研各貳錢　牽牛[illegible]

右同再研麵糊為丸粟米大每服叁丸至伍丸食
後薄荷湯下兼治痢消積消疳凡治大者加丸數

張渙[illegible]丸子　治小兒痢氣腹脹如鼓及奶癖食癖

[illegible]半兩　黑牽牛[illegible]　胡椒[illegible]

木香　莪朮[illegible]各壹分

右為細末麵糊為丸黍米大每服貳拾丸煎[illegible]人
參湯下

換骨丹

陳粟米壹合　陳橘皮剉　青皮剉

黑牽牛各半兩　巴豆去殼貳[illegible]

右件一處同炒[illegible]焦黃色揀去巴豆不用却入木
香半兩為細末麵糊為丸黍米大每服拾丸橘皮
湯下

莊氏參苓散　治小兒因積成痢久致脾胃虛弱不
思飲食

人參　茯苓　[illegible]各壹[illegible]

甘草　芍藥　黃芪各半兩

青皮去白[illegible]

右為細末每服壹錢水壹小盞煎至伍分去滓[illegible]

香甲丸　治小兒積[illegible]盜汗[illegible]瘦[illegible]手足心
熱服之皆效輕骨長肌　[illegible]家[illegible]翁若黃瘦
不食多汗喜啼哭服之[illegible]

木香[illegible]錢　鱉甲[illegible]　檳榔

史君子肉　柴胡[illegible]　黃連[illegible]各

右為末猪膽汁和丸菉豆大每服貳拾丸日中
臨卧米飲下久[illegible]無力者服之即効

趙氏青蒿丸　療小兒久[illegible]漸漸羸瘦面黃頭
髮作穗好食土吃[illegible]及取
疳蟲退[illegible]小兒[illegible]身香為効

白[illegible]　黃連[illegible]

夜明沙[illegible]　太陰玄精石

麝香　小蔥子炒　朱砂各半錢

蘆薈　天竺黃　青黛各壹錢

右將後七味同研細[illegible]四味一處再研勻令極
細取青蒿自然汁[illegible]火熬[illegible]膽壹枚取
汁同搜藥丸如粟米大每服伍丸至柒丸並用米
飲下[illegible]亦得[illegible]一[illegible]服
取蟲[illegible]

吉氏治五疳傷積方

蕪荑　黄連各壹兩　神麴半兩

史君子（連殼炒，取肉）貳兩

末之，豬膽汁麵糊為丸，菉豆大，每服拾丸，米飲下。

青金膏　治疳氣

青黛　朱砂　蘆薈

蟾酥各壹錢　麝香半錢　蜣螂壹箇

蛇皮（項後）壹寸

右為末，水化酥丸如粟米大，每服兩丸，倒流水送下。又水化孩兒，汁於身中，須臾背上白蟲出，便安。

[illegible]

豆蔻散　治疳積或冷，肚腹大，脚小，身熱，面無顏色。

肉豆蔻貳箇　胡黄連壹錢　史君子肆枚

青黛　楝根　蕪荑

厚朴（薑汁炙）　甘草（炙）半兩　麝香少許

夜明沙（炒）壹錢半

右末，每服壹錢或半錢，米飲或粥飲調下。

知母散　治諸般疳積，肚腹大，時瀉痢，或時壯熱，狀如瘧疾，大效。

知母　青皮（去白）　柴胡各貳錢

甘草（炙）　紫參各三錢　訶子（煨，取肉）三枚

右為細末，每服壹錢，水半盞，煎至三分，溫服，有熱則退，有痢則除，有結則通。

正傳經驗檳榔丸　治小兒疳病積氣成塊，腹大有蟲等，證其効如神。

檳榔壹兩　三稜（煨，去毛，切，醋炒）　蓬莪茂（醋炒）

青皮（去穰，炒黄色）　陳皮（去白）　雷丸

乾漆（炒煙盡）　麥蘗（炒）　神麴（炒黄色）

山查肉各半兩　鶴虱（各炒）　木香（不見火）

甘草（炙）　胡黄連各壹錢　蕪荑

良薑（陳壁土炒）二錢　砂仁壹錢

右為細末，醋糊為丸，如菉豆大，每服三拾丸，空心淡薑湯下。

瀉：寒先用青金丹（方缺），服下疳積後，用勻氣散（不見）、香連散、乳香散（方缺），調理瀉止，服常服保童丸（方見一切）。

石壁經云：疳瀉因不依飲食，或食冷氣，致然腹中有片子，或如雞子，又如三二指大，所以作瀉，糞出如糟，毛髮硬，面無光，或青黄色，目多淚，和當分水穀，乃須溫和藥和氣，即安。若變熱，則作腫不死。寒瀉而多食，為蟲疳，宜殺蟲藥。瀉而少食，為冷疳，宜溫藥。

仙人水鑑粉霜丸 治小兒疳一切瀉方

粉霜 白丁香各壹錢 巴豆貳拾伍粒去皮油

右爲末爛飯爲丸如小菉豆大每服井華水下貳丸

錢乙三聖丸 治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦成疳宜常服此方

川黃連去鬚 黃蘗去麁皮各壹兩

右爲細末將藥末入猪膽內湯煮熟丸如菉豆大每服貳參拾丸米飲下量兒大小加減無時

劉氏胡黃連飲子 治小兒疳熱作渴無時飲食進退面黃体黑日漸瘦瘁

胡黃連 黃耆 人參

甘草炙 白朮微炒 秦艽

柴胡各等分

右各味用淨㕮咀每服貳錢匕水壹盞嫩桃柳枝各柒寸烏梅少許同煎捌分去滓溫分作四早食後小空一服臨卧再服以小便澄赤爲驗候小便清住藥便生肌膚能進飲食大抵小兒羸瘦並宜服此十五歲以下皆可服

莊氏黃連丸 治疳瀉疳痢

黃連剔淨研爲末 大蝦蟆一箇乾研爲末各等分

右二末一處和勻糯粟米和煮稀粥爲丸小菉豆大量兒大小三歲柒丸至拾丸三歲以上拾伍丸至二拾丸空心陳米飲下日進三服

錢乙如聖丸 治冷熱疳瀉

胡黃連 白蕪荑去扇炒 川黃連各二兩

史君子一兩去殼秤 麝香半錢別研 乾蝦蟆伍枚酒煮杵膏

右前藥爲末用膏丸如麻子大每服人參湯下二三歲者伍柒丸以上者拾丸至拾伍丸無時

博濟方胡黃連丸 治小兒疳痢瀉痢

胡黃連 丁香 蜜陀僧各半兩

肉豆蔻一個 檳榔一枚 紅雪一兩

訶子二枚一枚炮一枚生用

右件七味同研細入麝香一錢半和勻入紫豆末少許同水和爲丸如麻子大兒二歲以下一丸三歲以上伍丸後下瀉痢[illegible]及赤痢黃連湯下脾疳羸瘦疳痢四肢虛弱[illegible]棗湯下肝疳眼澀生瘡甘草湯下冷痢冷熱[illegible]食上[illegible]茶湯下常服米飲下肺疳上氣喘[illegible]陳皮湯下筋疳瀉血鹽湯下蛔蟲及[illegible]生薑湯下

香連丸 治痢瀉

黃連 肉豆蔻 木香

訶子肉 砂仁 茯苓 各一

右為末飯為丸麻子大米飲下

錢氏木香丸 治時時下利脣口青白

木香 青黛 另研 檳榔

肉豆蔻 去皮各二錢半 麝香 另研一錢半 續隨子 去殼一兩

蝦蟆 三箇先用罐燒存性

右為末蜜丸如菉豆大每服叁伍丸至一二拾丸

薄荷湯下食前

沒石子丸 錢氏 治泄瀉白濁及疳痢滑腸腹痛者

木香 黃連 各二錢半

薏苡仁 二兩 訶子肉 三箇 沒石子 一箇

右為細末飯和丸麻子大米飲下食前量兒加減

聚寶方黃龍丸 定小兒痢冷瀉

朱砂 研 龍腦 研半字

雄黃 二錢半 硫黃 一兩

右用甘鍋子一隻盛雄黃在內用盞一隻盛水半

盞坐在鍋子上炭火燒甘鍋其藥飛在盞底上刮

下與朱砂硫黃同研入蒸餅丸如米粥丸如黃米大

每服二三丸食前椒湯下

吉氏麝香丸 治疳瀉不止不思飲食腹脹

丁香 肉豆蔻 去皮 木香 各一兩

右三味用麪裹慢火中煨熟去麪取出入通入麝

香 史君子肉 同為細末稀糊為丸如黍米大

每服拾丸至貳拾丸米飲下

湯氏治休息痢及疳瀉痢遷延日月百藥俱試飲食

不妨傾痢不止用雞子一枚打破鑄黃蠟一塊如指

大以雞子和炒 [illegible] 自効無不獲安

本事方治小兒疳痢垂死者取益母草炙食之取足

指南 [illegible]

瘥止甚佳

錢氏大蘆薈丸 [illegible] 胡黃連麝香丸

榆仁丸 [illegible]

良方吳婆散 治小兒疳瀉不止日夜不計遍數漸

漸羸瘦

桃根白皮 [illegible] 蕪荑 去皮

黃連 [illegible] 木香

檳榔 丁香 各一 沒石子 一

樗根白皮 [illegible]

右為末每服一字至三錢以上半錢五六歲一錢

紫霜丸米飲調下乳食前一日三服

曾有患瀉百餘日瘦瘁皮骨百方不差有醫兵鈐轄君見之曰何不服吳茱萸散立可差也乃求方合與兩三服便効又孫男亦病瀉勢甚危因再服遂定若病深者服一兩日間決差此藥若是痢瀉無不驗者藥性小温暴熱瀉者或不相當

丹溪治一富家子年十四歲面黃善啖易飢非肉不食瀉一月求治脈之兩手皆大從不甚瘦倦以多濕熱當肆困而食少今反形健而多食且不瀉予意其疾必有蟲作痢也取大便視之果蛇所為遂令其他處有一小兒醫者側教其用治蟲藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看診而止痢也倘勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治蟲而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉物三年當自愈

斗門經治小兒疳瀉方

右用赤石脂杵羅為末極細如麵以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙

莊氏家傳治疳瀉久不差方

赤石脂　綠礬　石灰各二

硫黃半兩

右研勻入罐子內燒令焰盡去火放冷取研每服壹字或半錢煎小黃米飲放冷調下食前服

又方

史君子炮　五倍子炒黃　沒石子各等

右為末每服半錢陳米飲調下

錢氏□方解小兒疳熱痢殺蟲用青黛不以多少水研服

外臺治疳痢曉夜無度者取樗根濃汁及粟米泔各一雞子殼許以竹筒吹入下部再度差

治疳痢大孔開利不止以黃連末入麝香少許和勻取竹筒吹入

聖惠治疳痢以地榆煮汁如飴糖與服便已

□□治小兒疳痢方

右用樗木根取白皮□搗和粳米伍拾粒葱白壹握甘草二寸炙黃合以水壹升煮取半升頓之小兒以意服之樗根與皮切爪皆同

治小兒疳痢不止下部瘡青黛散

青黛 蝦蟆灰 胡粉微炒

黃連去須微炒 麝香細研各一分半 赤石脂半兩

訶梨勒皮微煨一兩

右件藥搗羅為散每服以乳汁調下半錢日三四服量兒大小加減

殺蟲丸 治疳痢不止

雄黃 蟾酥 牛黃

麝香 朱砂各細研 龍骨燒赤色

蜜陀僧燒紅細研 胡黃連各一分半 青黛細研半兩

金箔拾片細研 肉豆蔻二枚去殼 蟾酥一錢二分半熱水化如泥

右件藥搗羅為末入研藥及蟾酥研令勻以粟米飯蒸餅和丸如黃米大每以溫水下叁丸煎黃連湯參湯洗身上用青衣蓋出蟲便瘥

白龍骨丸 治疳痢不止

白龍骨 白石脂 雞屎礬燒令汁盡

黃連去鬚微炒 胡粉微炒 白茯苓

訶梨勒煨用皮各半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大小加減

肉豆蔻丸 治小兒疳痢不吃乳食四肢瘦弱

肉豆蔻去殼一枚 木香半兩 人參去蘆頭

訶子肉煨 朱砂 麝香細研各一分

右搗羅為末都研令勻用軟飯和丸如麻子大每服以米飲化下叁丸日三四服量兒加減

黃連散 治小兒疳痢久不瘥肌肉消瘦面黃髮焦啼叫不常

胡黃連末 白礬燒令汁盡 白龍骨末各一兩

胡粉微炒二兩

右件藥同細研為散一歲兒每服以米飲調下一字二歲每服半錢量兒大小並病輕重加減

燕荑丸 治小兒久疳痢不瘥

燕荑末半兩 豬子肝一具

右先以子肝切作片子以燕荑末摻在肝內線纏合米泔中煮令熟搗爛糯米飯和丸如麻子大每以粥飲下伍丸早晨晚後各一服量兒加減

孔氏第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳宜服八香丸

胡黃連一分 膩粉 麝香各半 牛黃一分

蘆薈一分半 蟾酥作捻子作 白花蛇酒浸

右為細末豬膽丸如黄米大每服伍丸米飲下
如患甚仍用生米泔調竹瀝半錢服日二服
治小兒腸胃滑泄痢口鼻乾燥有鮮血日夜疼方
白术 炮　硫黄 各二分半　枳殼 炒
胡黄連　當歸 各半兩
右為末每服半錢漿水調下
張道人第二方治小兒疳痢下赤色膿血下部脫肛
雖有積肺命在須臾但服此沉香丸方
沉香　人參　蝸牛

胡黄連　乳香 各一分　龍骨
甘草 各一分
右件棗肉為丸如麻子大每服叁丸米飲下日二
服久患七服効
木香丸 治疳痢
黄連　木香　紫厚朴 薑汁炙
夜明沙 各隔紙炒　訶子肉 炒一分
右為末飯丸麻子大微炙生薑煎湯食前下
張渙腹痛白术散 治小兒疳痢腹脹疼痛日夜

二十行

白术 一兩微炒　當歸　地榆
木香　赤芍藥　甘草 炙半
右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至
伍分去滓不計時候量兒大小分減
胡黄連丸 治小兒疳痢腹痛不止
胡黄連 半兩　沒藥　木香 各二分半
右件藥搗羅為末燒米飯和丸如綠豆大每服粥
飲下伍丸日三四服量兒大小加減
張渙[illegible]散 治小兒五疳入痢及髮焦黄肚脹手足瘦細
肚上筋脈起揩眼鼻癢乾疳不甚口咬指甲或下部生
瘡及大小便不通宜此療之

蘆薈　夜明沙 炒　蛇蛻 炙
黄牛角腮 各一分　蟾酥 少許
右為末更入麝香少許煉蜜丸如綠豆大每服二
丸用米飲下服藥間仍用桃柳葉湯浴兒了將青
兒衣蓋之更用藥一丸至貳丸安兒臍中便著醋
麵糊與青皂帛貼之候蟲出為度如無蟲但汗出
為妙服藥三日後宜減一丸
治小兒疳氣腹脹有似水氣方
肉豆蔻 一个　木香 炮　麝香

朱砂各一分　胡黃連半兩

右為末飯丸麻子大米飲下二三伍丸（湯氏第十八候用此方）

古氏家傳治疳肚如鼓方

密陀僧　風化灰各一　黃丹半兩

右為末以豬肉炙一片用藥半錢糝上與喫如不食以乳母嚼與

御苑匀氣散　治脾肺氣逆喘咳面浮胸膈痞悶小便不利

桑白皮二兩　淨陳皮一兩　桔梗炒
甘草炙　赤茯苓各一兩　藿香半兩

右[illegible]木通[illegible]水煎服

疳瘕天柱倒　治腎疳天柱倒條

疳氣入陰　湯東王先生家傳治小兒疳氣灌入陰黃

亮色烏金膏

通草　黃皮　大黃各二錢

右各燒存性為末每用一錢猪猪膽調成膏於陰上塗如未退煎蛇床子湯洗後再調敷之

虛疳

胃氣不足則肌瘦肉極　巢氏論小兒疳瘦不生肌膚皆為脾胃不和不能飲食致血氣衰弱不能榮於肌膚也挾熱者即溫壯身熱肌肉微黃其挾冷者即時時下利唇口青白　小兒經諸大病或驚癇或傷寒或溫壯而服藥或吐利發汗病差之後氣血尚虛脾胃猶弱不能傳化穀氣以榮身體故虛羸也　錢氏虛羸冷者木香丸主之夏月不可服如有證則少服之熱者胡黃連丸主之冬月不可服如有證則少服之[illegible]　薛氏云更當審其形色辨其見證[illegible]面赤多啼心之虛羸也面青目劄肝之虛羸也[illegible]或耳下結核肝經虛火也頸間肉裏結[illegible]脾之虛羸也面白氣喘[illegible]之虛羸也目睛多白腎之虛羸也仍審相勝而藥之　又寒熱二證不可不辨若腹痛泄利清白不渴喜熱飲[illegible]宜木香丸身熱煩躁渴利[illegible]作渴[illegible]在冬月宜胡黃連丸皆[illegible]之治法也　錢氏論用藥識證云鄭人齊郎中者家好收藥散施人其子忽病熱[illegible]

青三服併一服而愈又服[illegible]三劑痊愈[illegible]
腫痛言子雖多亦[illegible]一服又減一二[illegible]
白苔而身熱發[illegible]有微熱未盡又與清金[illegible]
二用藥[illegible]不[illegible]氏曰[illegible]
熱多前白术散時時服之後用香[illegible]
湯見耳本 丸見汁
薛氏治一小兒十三歲[illegible]赤[illegible]發熱
咬牙體瘦不時面白噯氣下氣[illegible]保和丸
及清熱等藥余曰面赤驚悸心神怯也面白噯氣心
火虛也大便下氣脾氣虛也此皆稟心火虛不能生
脾土之危證前藥在所當禁者不信又服枳术丸[illegible]

驚[illegible]而[illegible]益甚大便頻數小腹重墜脫肛痰涎
飲食日少余先用六君子湯為主佐以補心丸月餘
飲食少進痰涎少止又用補中益氣湯送四神丸而愈
畢姻後病復作時至仲冬面白或黧色手足[illegible]
食胡椒熱物腹中不熱脉浮按之微細兩尺微甚乃
用八味丸元氣[illegible]而愈[illegible]年至二十[illegible]寒
面目赤色發熱[illegible]亦裂[illegible]之物[illegible]
[illegible]痰[illegible]甚[illegible]或如無或[illegible]
寒氣遏陽於外內真寒而外假熱也[illegible]用八味丸而
愈 一小兒八歲面常青[illegible]赤目閉

目劄夜睡咬牙一年餘矣服清肝降火之藥益甚形
氣日羸求治於余[illegible]肝[illegible]入心則赤入則青
蓋肝屬木[illegible]火用而為陰為水
氣稟肝腎[illegible]血不足虛火內[illegible]而生風
[illegible]火[illegible]自劄等[illegible]非外風也[illegible]用地
黃丸以滋[illegible]水生肝木兩月[illegible]咬牙[illegible]又三月
[illegible]而元氣亦充矣凡[illegible]經之證者用木[illegible]
[illegible]生風[illegible]或肺金實熱而[illegible]木者宜用清肝降
火之劑以瀉其邪氣若肝經風熱而目直等證用柴
胡梔子散以清肝火加味四物湯以養肝血若腎虛

而咬牙者[illegible]用六君子湯以健脾土六味地黃丸以
滋腎水則愈 一小兒脾氣虛弱飲食停滯發熱作
渴服[illegible]不時[illegible]余先用保和丸一服而熱[illegible]但
不食惡心而[illegible]又用六君柴胡升麻[illegible]
[illegible]黃[illegible]發熱小[illegible]
[illegible]用補中益氣湯加[illegible]二劑[illegible]
脾[illegible]若發[illegible]渴飲[illegible]或泄瀉[illegible]不
露[illegible]俱實宜用[illegible]
乾[illegible]或泄瀉[illegible]
功散[illegible]之[illegible]脾氣下陷[illegible]

瀉黄散肝木尅脾者六君子湯加柴胡若目
熱抽搐吐瀉不食宜用秘旨保脾湯凡小兒諸[illegible]凡
當調補脾胃使根本堅固則諸病自退非藥所能盡
述也　一小兒五歲形氣虛羸睡中咬牙夜間遺尿
手足時熱數余以爲稟腎氣不足用補中益氣湯加補
骨脂地黄丸加鹿茸以補脾腎而愈至畢姻後小便頻
數作渴發熱日晡益甚脉洪大而數知爲稟腎虛也以滋陰
降火後患腎痿倒床年許余因考績北上仍用前藥
兼其調攝半載而痊　一小兒年十一歲面白或赤
足軟不能久行用地黄丸加鹿茸年許而痊至畢姻後

兩目羞明兩足發熱用前丸及補中益氣湯而痊後
病復發增口渴足熱兩頰赤觀物見大此腎虛陰
火散大而然也服前藥遂痊再則愈因不自保終是
腎水虧損陽光先生云此證屬髓不足不能采養
宜用地黄丸補之有年七八歲或十四五歲氣血既
感而自食若縱恣色欲[illegible]其天真亦能盡其壽矣
一小兒形瘦不時咳嗽自用參蘇飲一劑更加喘
急驚搐面白或黄余以爲肺不足而形氣虛
因前劑峻利外邪雖去而肺氣益虛肺虛則宜補脾
先用異功散加桔梗鉤藤一劑喘急頓定乃去鉤

藤加半夏當歸而驚搐亦去又加酸棗仁治之而
安　一小兒十五歲發熱吐痰或作渴面赤形體羸瘦用地黄
丸加五味子及補中益氣湯各百餘劑而形氣漸壯
若以爲陰火用黄蘗知母等藥復傷生化之源其亦
不治者矣　一小兒五歲面飲乳可前後頸間予缺
盆以手推尋其筋結小核如貫珠隱於肌肉之間小
便不調面色青黄形氣虛羸此稟肝之用火爲患用
九味蘆薈丸五味異功散加山梔柴胡與兒飲之又
以加味逍遙散與母服之尋愈　一小兒患虛羸耳
出膿水左手尺關洪數而無力余爲清肝補腎耳中

膿出將愈未全畢姻後恩慕遂欲[illegible]服[illegible]黄柴知母之類
夜[illegible]元氣不勝寒暑勞役無日不發[illegible]余大
補脾腎滋養元氣而愈　一小兒患[illegible]如前夜熱消
黄面色痿黄大便溏泄此脾虛食積用[illegible]肥兒
丸五味異功散治之而愈　一小兒九歲[illegible]肌
發消瘦腹中作痛余謂食積[illegible]丸而愈
後腹中漸痛[illegible]保和丸[illegible]而飲食
所傷也當調補脾胃以杜後患不信後變[illegible]余
用五味異功散二劑因[illegible]用平胃散[illegible]腹脹
消滿余仍以異功散加木香治之而[illegible]

之劑若損元氣多致虛羸慎之

參苓白术散（方見乳食）

地黃丸（加減八味丸　加味生地黃丸）　治小兒肝經虛熱血燥或風客淫氣血凝滯或四肢發搐眼目抽動痰涎上涌又治腎疳肌體熱消瘦手足如冰寒熱往來滑瀉肚脹口臭乾渴齒齦潰爛爪黑面黧遍身兩耳生瘡或兩耳出水或發熱自汗盜汗便血諸血失音等證其功不可盡述（即六味地黃丸　方見腎臟）

補中益氣湯　治中氣虛弱體瘦食少或發熱煩渴等證

人參　黃芪各一錢　白术

甘草　陳皮各五分　升麻

柴胡各二分　當歸八分

右薑棗水煎空心午前服

愚按前方若因勞役元氣虛損惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脈洪大按虛或微細軟弱右寸關獨甚者宜用之凡久病或過服克伐之劑虧損元氣而虛證悉具者最宜前湯有因脾胃不足之證或服峻劑而致見諸證者尤宜用之

八珍湯（即四物四君合劑）

錢氏異功散　治脾胃飲食少思吐瀉不食凡虛冷證先與數服以正胃氣（即四君子加陳皮　方見異功）

愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母脾胃虛兒患此證亦當服之

外甦散　治兩五歲兒因食及在胎中宿滯乳母飲食厚味辛熱乳汁不調兒啼不寐肌膚心腹脹滿疾甚煎磨四肢冷發熱或吐服之令充悅方

芍藥（炒各四分）　黃芪　鱉甲（炙）

人參（各四分）　柴胡八分　茯苓六分

甘草（炙）　乾薑（炮二分如無以枳實代）

右八味搗羅為末和煉蜜丸如大豆服五丸日二服忌如常法午後有大黃無者服一丸一歲以上乳服三丸七歲兒服十丸日二

聖惠黃耆丸　治小兒疳癆骨蒸熱面色痿黃不欲乳食

黃耆（炒）　赤芍藥　人參（去蘆）

甘草（炙）　鱉甲（醋炙）　麥門冬（去心）

鱉甲（塗醋炙微黃去裙襴）一兩　柴胡（去苗）三分

右件藥搗羅為末，煉蜜和丸如麻子大，不計時候以粥飲下五丸，量兒大小以意加減

秦艽丸　治小兒蒸熱，羸瘦，心神煩悶，小便赤黃

秦艽（去苗）　桑根白皮（剉）　枳殼（麩炒微黃去瓤）一

地骨皮　黃耆（剉）　人參（去蘆頭）

赤茯苓　甘草（炙微赤，剉）　犀角屑（各半兩）

龍膽（去蘆頭）一分　柴胡（去苗）三分

右件藥搗羅為末，煉蜜和丸如菉豆大，不計時候用粥飲下五丸，更量兒大小增減

麥門冬丸　治小兒雖食不著肌膚，羸瘦，骨熱，小便赤黃

麥門冬（去心，焙）一兩　人參（去蘆頭）　黃耆（剉）

青蒿子　黃連（去鬚）　桑根白皮（剉）

枳殼（麩炒微黃去瓤）　地骨皮（各半兩）　柴胡（去苗）三分

右件藥搗羅為末，煉蜜和丸如菉豆大，不計時候以熟水研五丸服，量兒大小以意加減

燒黃瓜丸　治小兒羸瘦，骨蒸，乳食全少

黃瓜一枚（大者）　陳橘皮（湯浸去白瓤焙）　黃連（去鬚）各半兩

鱉甲（[illegible]）　胡黃連

柴胡（去苗）

右件藥搗羅細為散，以黃瓜一枚割頭去瓤，內藥末令滿，以切下蓋子蓋之，用白麵和搜固濟，可厚三分，於塘灰火內燒令麵焦黃為度，取出去麵，放冷，入麝香一錢，都研和丸如菉豆大，每服食前以米飲下七丸，更量兒大小以意加減

大黃丸　治小兒胃氣不調，不嗜食，不生肌肉

大黃　乾地黃　茯苓

當歸　柴胡　杏仁（各等分）

右為末，蜜丸麻子大，飲下五丸，日進三服

[illegible]丸　解小兒肌熱，或泄瀉，及有積滯，不思飲食，肌肉消瘦

鱉甲一兩（同童子小便并醋共一升熬，皮炙焦為度）　白朮

黃耆（各一兩）　胡黃連　人參（去蘆）

青橘皮　紫菀（去土）　桃仁（湯浸去皮尖雙仁）

木香　甘草（炙，各半兩）　柴胡（去蘆頭）一兩一分

右件藥搗羅為末，入在猪肚內，繫定，煮令極爛為度，取出與藥同杵，令得丸，如梧桐子大，每服二十丸，不計時候，溫水飲下

香甲丸　治男子婦人童男室女氣血虛，寒熱，肌膚消

瘦百節疼痛作溫五心煩熱四肢逆冷不思飲食
中滿氣滯婦人經血凝滯建脾胃暢神氣充肌膚
潤顏色

柴胡　生乾地黃　京三稜各三分
草豆蔻　神麴　杏仁
熟乾地黃　麥糵炒各一兩　牛膝
木香　蒲黃　當歸各一兩
白朮　川芎各一

右為細末白麪糊丸如梧桐子大每服十丸空心
茶清下或米飲亦得

右八方挾熱者宜之

訶梨勒散　治小兒羸瘦脾胃氣弱挾於宿食
不欲乳食四肢不和

訶梨勒皮　陳橘皮湯浸去白焙　人參去蘆頭
黃耆　白朮
藿香　桂心　白茯苓各一分
甘草炙微赤剉半分

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞入生
薑少許棗一枚煎至五分去滓溫服日三四服量
兒大小以意加減

溫脾散　治小兒脾氣不和食少無力肌膚羸瘦

訶梨勒皮　人參去蘆頭各三分　白朮
木香　黃耆剉　白茯苓
藿香　陳橘皮湯浸去白瓤焙　桔梗去蘆頭各半兩
甘草炙微赤剉一分

右件藥搗細羅為散每服一錢以水一小盞入生
薑少許棗一枚煎至五分去滓不計時候量兒大
小溫服

五香煎　治小兒脾胃久虛不食減少四肢羸瘦

丁香　沉香　木香
藿香　白朮各一兩　麝香三分細研入
白茯苓　陳橘皮湯浸去白瓤焙　黃耆剉各
訶梨勒皮　甘草炙微赤剉各半兩

右件藥搗篩為散以水五升慢火煎至一升以布
絞汁却入鍋內煎麝香及蜜三合生薑汁一合棗
肉二十枚慢火熬成煎每服以粥飲調下半茶匙
量兒大小以意加減

右三方挾冷者宜之

湯氏云小兒羸瘦其狀渾身瘦瘁骨如鼓腹脊骨如
鋸乃積滯而生熱成疳也宜服蘆薈丸麝香丸

龍膽草　　黃連　　蘆薈　黃蛀皮炒焦入

麝香二錢木香六錢炙　蘆薈各一兩

右為末另入蘆薈麝香豆分和勻爛飯丸如黍米大三

歲兒服三十丸空心米飲送下

黃耆散

黃耆蜜炙　　胡黃連　　地骨皮

柴胡各等分

右為末煉蜜丸如芡實大隔宿酒浸露一宿次日

濾去酒薄荷湯浸服之

聖惠方　入幼科

橘連丸　治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳皮一兩　　黃連去鬚一兩半

右為細末另研入麝香五分用豬膽七箇分藥入

膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度煮粟

米粥和丸如菉豆大每服十丸至二三十丸米飲

下量兒加減無時

二聖丸　治小兒藏府或好或瀉久不愈羸瘦宜常

服

黃連去鬚　　黃蘗去粗皮各一兩

右為細末入豬膽內重湯煮熟丸如菉豆大每服

二三十丸米飲下量兒加減頻服無妨

驚涎金粟丹　方見身

香蟾丹　治疳瘦面黃頰尚腳細

乾蟾　　胡黃連二兩

蛇蛻皮一兩燒灰　　天竺黃

蟬殼各一分　　地龍半兩炒　　朱砂半兩細研

麝香一分細研

右件都一處研勻糯米飯和丸如黍米大每服十粒

米飲下不拘時候量兒大小加減

聖惠方　入幼科

眞人方雷丸丹　治小兒一切疳肚脹腹滿手腳枯

細眼目口鼻生瘡身體壯熱痢下泔淀日漸羸瘦

面無光澤

雷丸生　　鶴蝨生　　使君子去殼生

胡黃連　　蘆薈　　麝香

蟾一枚酒浸　　木香

肉豆蔻一　　蕪荑　　縮砂

右件藥搗羅為末用豬膽四箇取汁

傾入盞中外以湯浸過和藥為丸如黍米大

每服五丸至七丸麥門冬熟水下早晨日午空心

臨臥服

孔氏神聖丸　肥小兒疳藥常服永無腸臟之疾

胡黃連去皮　宣連去毛　白蕪荑去皮

木香　蘆薈各一分　史君子二十個

右除蘆薈一味外五味銼碎內用豬膽汁熬成膏後入蘆薈同丸如菉豆大每服五七粒空心日午臨卧米湯下神効

豬肚丸　治小兒疳熱而瘦

柴胡　黃連　秦艽各一兩

鼈甲二兩[illegible]醋炙黃去裙[illegible]入用

[illegible]分研入

右用豬肚一箇淨者破開淨洗入前藥三味末於內以酒半升童子小便一升煮乾舂令得所放蕪荑末又舂勻丸如桐子大每服二十丸飲下

王氏手集治小兒疳瘦大人五勞七傷方

宣黃連半斤去鬚[illegible]　獖豬肚一箇去脂[illegible]

黃連末[illegible]入[illegible]於二[illegible]蒸爛度

右件取出爛作丸如粟米大風乾隨兒大小加減日三服三歲兒每服五七丸至十丸大人服如桐子大每服二十丸空心米飲下

趙氏脊健丸　治小兒疳久服肥白

乾蝦蟆一枚　白礬　膽礬

綠礬各半兩[illegible]入罐子[illegible]　京三稜

石三稜　雞爪三稜　萆薢

鶴虱　雷丸　淡蕪荑

黑狗脊　木香各半兩　沒石子三個

史君子拾枚　蘆薈　熊膽各一分

右為末醋煮乾蝦取肉爛研入少麪糊和藥極熟丸如菉豆大每服米飲下

玉柱杖散　治小兒疳瘦

黃耆二兩　白茯苓半兩　人參

[illegible]八分[illegible]　[illegible]

白术各一兩

右為末以水一盞煎[illegible]煎[illegible]分溫服

蘆薈丸　治小兒諸疳羸瘦不生肌肉

蘆薈　木香　紅芍藥

沒石子各半兩　史君子十枚　胡黃連各二錢半

肉豆蔻二個　人參一錢

右為細末入麝香半錢同研令細與藥拌勻蜜水打麪糊為丸每服拾伍丸米飲下空心食前服

曾氏益兒丸　治小兒一切疳瘦夜多盜汗肌肉熱

人參　白术　茯苓

柴胡去苗　甘草炙　陳皮去白
鼈甲醋炙去裙襴　京三稜煨　蓬莪茂煨 各等分
右細末煉蜜圓如雞頭實大每服壹圓米飲化食
前日二服
朱氏家傳肥兒丸
白蕪荑去殼　黃連去鬚　神麯
麥蘗各等分
右爲末用豬膽煮麵糊圓如大麻子大每服叁拾
丸食前米飲下張氏家傳莊氏家傳方皆同或治
煩熱治消瘦
六味肥兒丸　治疳多因缺乳食肉太早或臟腑
胃虛蟲動諸般疳[illegible]化蟲治疳消瘦用急消疳退疳熱可
常服
黃連[illegible]　陳皮去白[illegible]　神麯炒[illegible]
麥蘗[illegible]　川楝肉炒
白蕪荑[illegible]
右爲末神麯糊丸[illegible]大每服叁拾丸空心米飲
吞下　薛按前方又治[illegible]飲食少思肌肉消瘦
肚大頸細髮稀成穗項[illegible]結核發熱作渴精神困倦
患大便酸臭嗜食泥土口鼻頭生瘡肚見青筋

飧齒下利便白五疳用此丸加乾蟾壹兩[illegible]
錢氏妙
秘方肥兒丸　消疳[illegible]
黃連[illegible]　木香[illegible]　神麯
麥蘗[illegible]　肉豆蔻[illegible]
檳榔一枚　[illegible]　白朮一兩
右爲末麵糊丸如黍米大空心米飲下量兒加減
朱氏家傳治小兒[illegible]
右用黃連[illegible]用黃連末與豬膽[illegible]
用杵[illegible]然後露一宿[illegible]
爲丸如小綠豆大每服[illegible]丸熟水下
㬉古云小兒疳病肌瘦血氣不足同大人勞瘵之疾
治之　按以察古此論言之不拘冷熱虛實皆用四
君子地黃丸與前藥相兼服爲得也然有胸膈積熱
不受參朮地黃之補者[illegible]取積之藥然後補
劑可施故備載[illegible]以示之一變應多端
非拘一隅[illegible]無病不治者鮮
不以爲然[illegible]
鑒　嚴氏[illegible]
利小兒疳[illegible]灸[illegible]於脊下端尾

脊骨尾上灸參壯

小兒羸瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾翠骨上三寸骨陷中灸參壯

小兒身羸瘦賁豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴各灸柒壯

鶴節

湯氏云小兒鶴節由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦瘠則骨節皆露如鶴之足蓋腎虛不生骨髓之故治法宜錢氏地黃丸加鹿茸牛膝

地黃丸 治顖顱不合體瘦骨露有如鶴膝皆腎虛不足亦治腎疳天柱傾倒腎主骨也

熟地黃〔八錢焙〕 澤瀉〔各二錢〕 牡丹皮〔去心〕

白茯苓〔各三錢〕 山茱萸肉 牛膝

鹿茸〔酥炙〕 山藥〔各四錢〕

右為末煉蜜丸梧子大三歲已下三二丸温水空心化下

子143-491

丁奚 疳脹見名

巢氏云小兒丁奚病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也哺食不消則水穀之精減損無以榮其氣血致肌肉消瘠其病腹大頸小黃瘦是也若久不差則變成穀癥傷飽哺露病一名丁奚三種大體相似輕重立名也　其候見九小兒或因吐而瀉久不差或病退不能行脛大腿細號曰丁奚七歲已下號□隨風十五已下名疳勝風蓋此並是風冷傷於腎氣致腎主骨故也　湯氏疳脹丁奚辨證云小兒腹大如有青筋見即曰疳脹也如無青筋乃名丁奚是因過飽傷食而得之　諸丁奚者亦久積成疳之證皆因飲食過傷於脾胃□□不能磨化飲食飲食漸減無以生其氣血面色痿潮熱往來腹大而多青筋手足如筒顱顖開解頸項小而身黃瘦乾枯萬應丸　次參苓白朮散　早晨一服與萬應丸相及醒脾散進食食後下烏犀丸　三粒至五粒助脾化食此即用通奇之法間投醒脾散　沉香檳榔丸木香枳朮丸　次第調理有瀉瀉腹痛下金箔自好者脾氣稍和飲食漸進再以化癖丸　快活丸常服或用烏犀丸略下二三行勻氣散　痛止消食寒熱往來柴胡飲　主之腹脹投南星腹皮散　有餘熱麥芽柳枝煎湯調二解散　有蟲下史君子丸　斯疾得之非一朝一夕然施治之法亦須漸漸令其平復欲求速効則難矣凡雞酒羊麪魚鮓甘甜生冷毒物宜忌之

治丁奚哺露神効

檳榔　枳殼炙炒　青皮
陳皮　三稜炒　蓬朮炒
砂仁各半兩　丁香　木香各一
香附一兩

右為末神麴糊丸如黍米大空心食前米飲下百丸一方去香附砂仁丁香三稜枳殼加五靈脂白蔻史君子蘆薈蝦蟆川芎

醒脾散　治吐瀉後調和脾胃消進飲食及丁奚哺露虛熱煩渴氣逆心煩

陳皮去白　縮砂仁　厚朴
人參　麥芽　烏梅
良薑　乾葛　烏藥
荳蔻仁　甘草炙

右件每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎八分去滓
七分空心溫服
快活丸　治丁奚瘠瘦脊骨露如柴肚大青
筋小便白濁頭面煩躁消渴常服健脾化積
進食肥肌
蒸餅一兩去頂剜空入青礬半錢重分以蒸餅屑緊塞上用水紙固定炭火中煨透取出放冷用之
右件剉焙爲末別以肥棗用米泔水浸經一宿飯
上蒸少時去皮核用乳鉢爛杵如糊同前餅末等
分再杵勻丸麻仁大每服三十丸至五十丸温米
奚　幼科入　百五六
清湯無時送下兒小者亦以米湯化服其蒸餅不
拘箇數大約以每箇入青礬半錢重爲定下常如
前法製半斤作一料役人切勿以見方不重棗爲
誤余嘗屢試屢驗其餅如南饅頭樣者是也
聖惠赤芍藥丸　治小兒丁奚雖食不生肌肉腹大
食不消化
赤芍藥　川大黃各炒　鼈甲醋塗炙令黃去裙襴
各三分
柴胡去苗各　桂心　赤茯苓
右件擣羅爲末鍊蜜和丸如麻子大每服煎蜜
湯下五丸日三服
嬰孺芍藥丸　治小兒百病有寒熱大腹食不消化
不生肌肉瘦瘠
芍藥　茯苓　大黃各伍
柴胡四分　鼈甲三分炙　桂心二分
人參一分一方二分
右爲末蜜丸三歲已下服三小豆大不知加之七
八歲三桐子大不知加之若腹堅大者加鼈甲一
分渴者加栝樓二分病甚者服二十日効已試大
良一方有杏仁二兩人參叁分
十漢　幼科入　重三
張渙大麝香丹　治小兒尩羸瘦腹大見青筋及丁奚
等病
麝香研　朱砂細研水飛　粉霜研各半兩
五靈脂　肉豆蔻仁　乾蟾全者酥炙一兩
夜明砂　白礬灰研各半　乾地龍炒一分
乾蜣螂炙去翅足各一分
右件擣羅爲末以朱砂粉霜同研勻細煉蜜和如黍
米大每服三粒至五粒温米飲下量兒大小加減服
之
似寶鑑治小兒腹如蜘蛛四肢瘦者用黑骨雞子破

頂入蜘蛛一枚於內以濕紙裹煨用文武火煨熟
去蜘蛛食其肉下藥効必效依方愈
服後方服生雞根以豬脂煎稍稍服　或熟炙鼠肉
補之亦治哺露

哺露

哺露者因乳哺不節脾胃虛弱漸不能消血氣減
損肌肉不榮柴骨羸露吸吸苦熱謂之哺露也宜蘇
香通氣丸（方見脾疳）
哺露者亦由乳哺不節損於脾胃脾胃虛而飲食
減損容貌瘦則臟腑之氣不能宣通時間有熱謂之
哺露此候與丁奚相似大不遠但食多吐逆臟氣虛冷
腸滑泄瀉無度甚中有蟲治法同前丁奚諸藥雜加養
脾胃湯服之（方見赤白痢）

人參丸（萬全方）　治小兒哺露失衣當風濕冷水浴苦
腹大時痢或寒熱如瘧不欲食縱食不生肌肉或
不消化四肢羸瘦

人參　麥門冬（去心焙）　半夏（湯洗七遍去滑）
黃耆　川大黃（微炒）　白茯苓
柴胡　枳殼（麩炒）各三分　訶梨勒皮（煨用）
甘草（炙微赤剉）　鱉甲（塗醋炙令黃去裙襴）各一兩
芍藥（半兩）

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如麻子大一二三歲兒以
粥飲下三丸四五歲五丸日三服量大小加減

宿食 食積寒熱二痢

傷食論人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之宜大承氣湯傷寒然同一發熱而傷食者[illegible]噯酸見夜間潮熱尤傷積之明驗也 小兒宿食不消者胃納水穀而脾化之兒幼不知撙節胃之所納脾氣不足以勝之故不消也 脾胃[illegible]傷者傷化之物皆[illegible]生發之氣[illegible]而三稜莪朮乎況又進而牽牛大黃巴豆乎脾氣一受傷於食再受

傷於藥至於下之而氣已一脫矣所存幾何故夫克食之藥不可多用下積之藥尤不可不審其證之可下與不得不下而後用也 錢氏論食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

保和丸 治飲食停滯胸膈痞滿噯氣吞酸或吐瀉腹痛 加白朮一兩名大安丸

神麯炒 山査 半夏
茯苓各一兩 陳皮 連翹
蘿蔔子炒各五錢

右為末粥丸桐子大每服三十丸白湯送下

愚按前方行氣克滯之劑若元氣無虧暴停乳食而致斯證者宜用此消導之若元氣虛弱而乳食所傷者必調補胃氣為主而佐以消導若乳食已消而作嘔者乃胃氣被傷當用異功散補之不宜仍用前藥重損胃氣治者審之

木香大安丸

木香二錢 黃連 陳皮
白朮各二錢 枳實 山査肉
萊服子炒 連翹 神麯炒
麥芽炒 砂仁各一錢

右為末神麯糊為丸陳倉米湯下

消食丸 又名消乳丸 治宿食不消

砂仁 陳皮炒 三稜炒
神麯炒 麥芽各半兩炒 香附一兩炒

右末麯糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減

七聖丸

三稜 蓬朮 川楝
青皮 陳皮 芫花
杏仁

右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬稜

同炒赤色又入陳緑豆再同炒一次令微焦□去
為末前藥如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖
雙仁不用細研入巴豆二十粒去油和勻糊丸
如黍米大一歲兒常服二丸臨卧温熟湯送下使
日間所飧之物一夜而化永無疳疾能使黄瘦子
頓作化生兒今之小兒可去巴豆只入杏仁名七
聖丸是也

三稜散 治諸般停滯疳積發熱瀉痢酸餿水穀不
化常服和脾胃進飲食長肌肉益神氣

人參去蘆 三稜炮剉 淨香附各一兩半
青皮去白 益智仁 陳皮去白
枳殼去穰麩炒 神麯炒 穀芽洗焙
半夏製 莪朮醋煮透焙乾剉 大黃半生半炮
紫蘇去老梗各半兩 甘草一兩半生半炙

右銼散服二錢水一盞薑三片倉米百粒煎七分
無時温服氣虚者加白茯苓一兩

莪朮丸 和脾益胃消進飲食寬膈快氣悦色清神

莪朮煨剉 三稜炮剉 淨香附各一兩
陳皮去白七錢 檳榔一兩 生牽牛末另研和一兩
青木香去蘆 穀芽洗焙 青皮去白各半兩

雞蘇 丁香 南木香錢

右除檳榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味剉
焙仍同檳榔木香丁香為末臨入牽牛末和勻水
煮麵糊丸菉豆大每服三十丸至五十丸無時用
淡薑湯下温茶温酒皆好兒小者丸粟米大粒數
下法如前

丁香脾積丸

三稜煨去毛 莪朮去皮 神麯炒各七錢
青皮 巴豆霜 小茴香炒
陳皮各五錢 丁香 木香各三錢

右為細末醋調神麯糊為丸如菉豆大每服五七
丸生薑湯下

三黃枳朮丸 治傷肉濕麪辛辣味厚之物致填塞
悶亂不快

枳實麩炒五錢 黃連酒浸炒 大黃濕紙裹煨
白朮各一兩 黃芩炒五錢

右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服五十丸白
湯下臨時量所傷多少加減服之

聖惠訶梨勒散 治小兒宿食不化少欲飲食四肢
瘦弱腹脇多脹

[illegible]橘皮 三分　人參　白朮

麥蘗 微炒令黃　陳橘皮 去白　檳榔 各半兩

甘草 微炙 一分炙

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫服日四五服

木香丸 不拘時候　小兒氣調胃進食

人參　白茯苓

陳皮　肉豆蔻 各一兩

三稜 炮 一兩

右為末麵糊丸麻子大每服十丸薑湯下

傷食

朱氏洗心散 治小兒乳食傷心作壯熱喘息不調咳嗽多睡

甘草 炙 一錢　麥門冬 半兩 一分　皂角 半兩 [illegible]

[illegible]

右剉作不羅每服二錢水一盞煎至八分作五服

將息[illegible]

養脾丸

人參　白朮　當歸

川芎 各一錢半　木香　青皮

黃連　陳皮 各一錢　砂仁

山查肉　神麴 炒　麥芽 炒各伍分

右為細末水調神麴糊丸如麻子大每服三五十丸陳倉米飲下

[illegible]時小兒食積者因脾胃虛寒乳食不化久而成積其證至夜發熱天明復涼腹痛膨脹嘔吐吞酸足冷肚熱喜睡神昏大便酸臭是也有前證而兼寒熱者名曰食積寒熱若食在胃之上口者吐之胃之下口者消之腹痛痞脹按之益痛者下之下後仍痛按之則止者補之夾食傷寒者先散之用參蘇飲若便秘者先利之用大柴胡湯如無外感但只傷食不至於甚保和丸調之蓋脾為至陰之藏也故凡脾病者至夜必熱熱而兼寒則又見所勝者侮所不勝矣食未消者消之已消者[illegible]補之則實熱自痊若手足並冷[illegible]此中州虛寒也宜溫之大便欲去不去脾氣下陷也宜升之若夜間或侵晨泄瀉者脾腎俱虛也用四神丸　手足並熱作渴飲水者脾胃實熱也用瀉黃散　大便秘結用大柴胡湯　手足指熱口不作渴大便不實者用白朮散　仍[illegible]腹痛腹脹積痛積滯治之

傷食[illegible]有食飽傷脾脾氣稍虛物難消化留而成

積滯敗爲痢腹肚微痛先調胃氣次理積却止痢則病根自除和中散（見前）理虛養胃三稜散（見前）烏犀丸（見前）助脾化積沉香檳榔丸（見前）守中湯（見前）進食止痢仍忌生冷粘膩等物不致復作

千金治小兒食不知饑飽方

用鼠屎二七枚燒爲末服之

痞結

此痞在腹內與心下之疾名同

痞者塞也結者實也此熱氣結於胸膈之間因飲聚於腹腸之內於是氣滯不能流行藏府不能宣通由服濕而致痞結若使然耳此熱實之證也時或發熱壯熱宜用甘遂散主之此藥治小兒痞結雖服湯藥而小兒利而濕實不去心下堅脹按之即痛內有伏熱及結候併成此疾宜疎利大便破結散氣後宜常服進食丸　按進食丸有巴豆豈宜常服甘遂有大毒瀉水如決江河非十分見實十分危急十分水氣三者俱備未可輕用今以爲痞結主方誤矣蓋痞癖既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣爲主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑亦損其脾土脾土既虧必變證百出矣當參各類及隨見證而主治之　一小兒患痞癖服檳榔蓬朮枳實黃連之類痞益甚余曰此脾經血虛痞也不可剋伐遂用六君子加當歸數劑胃氣漸復諸證漸愈乃朝用異功散加升麻柴胡夕用異功散加當歸芍藥而愈　一小兒患痞結服剋滯之藥余謂屬形病俱虛當補中氣彼不信仍行剋伐遂致虛火上炎

齒齦作□□□余用大黃甘草湯及異功散□□
用之而安 一小兒□□□□而四肢消瘦肚腹漸
大食熱渴□作渴引飲用白术散為主佐以四味肥
兒丸月餘諸證漸愈又以異功散加當歸升六味地
黃丸又月餘而愈 一小兒患疳結身熱如火病狀
多端不可盡述朝用五味異功散夕用四味肥兒丸
月餘諸證稍愈佐以地黃丸白术散 一小兒□用地黃
丸夕用異功散及蝦蟆丸數服而愈

聖惠前胡散 治小兒腹內疳□□熱瘦多啼 一

前胡　川大黃(微炒各二分)　枳殼(麩炒去穰)

犀角(屑)　郁李仁(湯浸去皮尖微炒)

赤茯苓

鱉甲(塗醋炙令黃去裙襴各半兩)

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓看兒大小分減溫服微利為度

聖惠甘遂破結散

甘遂(煨令黃色二分半)　青皮(浸去白焙)　黃芩

川大黃(剉細炒各半兩)

右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫和服量大小加減得通利即止後以冷粥補之

進食丸 治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腹鳴泄瀉米穀不化或下痢赤白腹痛後重□食癥乳癖痃氣痞結並皆治之小兒胸膈熱實腹內有留飲致令榮衛痞塞脾臟之氣不得宣通其病腹內氣結脹滿或時壯熱見兒有此疾當疏利大便破結散氣

巴豆霜(二十分)　當歸(去蘆洗一錢炒)　朱砂(炒)

代赭石(火煅醋淬)　枳殼(炒)　木香(各一錢生)

麝香(少許)

右為末麪糊為丸如麻子大一歲兒一丸溫米飲下更量虛實加減食後服治食積發熱瘦肚大青筋痞積肚疼哺露

給事戶部張侍郎小娘子患此症積結聚已經年矣其證腹滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱調補或作胃寒不食治然既不食大小便自然少又欲作疳熱治□藥俱試而無一中勢已窘迫招予視之問曰令□□□各曰當服甘遂大黃張驚駭曰前諸醫皆曾用□□此女不進食久矣不宜利動腸胃予答曰信我者生逆我者死張曰更有□□遂而次於此藥方者可否予令即服大承氣湯 □□□大□諸之尚有餘滯積實其證必過數日而□□□□□□

可除利數日後果有閉脹滿痞結再投此藥

斧

右疎利大便偽形氣俱實者宜之

枳术丸

白术 土炒　枳實 二兩

右爲末荷葉包煨爛飯爲丸梧子大每服四五十丸空心白滚湯下

枳實理中丸

枳實 麩炒　茯苓　人參

白术　乾薑 炮　甘草 炙各二兩

右爲末煉蜜和丸如雞子大每服一丸熱湯化下連進二三服胸中豁然渴者加括蔞根一兩自汗者加牡蠣二兩煆過下利亦加

快膈湯 理胸膈不快飲食少進亦能順氣和中消導宿滯

人參 去蘆　青皮 去白　縮砂仁

烏藥　良薑 炒　香附子

甘草 炙各等分

爲細末每一錢溫鹽湯空心調服

參术調胸湯

人參　白术

橘紅　半夏 各一錢　瓜蔞 全用研爛各三錢

黃連　甘草 各五分

右用水一鍾半生薑三片棗一箇煎七分溫服

滚吞六飲食不進四君子加芍藥煎

積

漢東王先生家寶小兒積病有可醫者九　面上虛腫是積已者是脾之所係脾主身之肌肉故應面故知是脾積其脾係土也無正形故早晚浮腫不定多則早浮其腫則脾不與土而作浮若病後此證則是虛中積宜用調脾消積行氣等藥　面合地卧是積何以合地其受積在脾是冷積何以知之其脾好土故知在脾其冷者屬陰故知傷冷硬食得之宜下熱積氣藥　腹脹是積其積在肺何以知之其肺主於氣絡當受積其氣便冷腹脹滿氣急故知在肺如腹脹先宜調氣後轉轉後更宜調氣　小便如泔是積其積在小腸何以知之其積受於脾已當傳心已不受觸則入小腸小腸是心之腑故知在小腸則節其水道小便如米泔油相似也　髮黃是積是積氣傷心已主血脉流遍身已是被積氣所干則髮黃故知是積傷心宜下空心微冷氣積藥此人必時後發熱也　赤白痢是積其積在肺受傳大腸及有外傷冷而得何以知之其肺主西方庚辛金其色白後亦則是外邪作知肺傳大腸則為赤白痢也宜取後調氣

兩眼黃赤睛青是積其積在肝何以知之肝主東方甲乙木色青却被積氣所干即黃赤睛青者眼屬五藏肝是其主脾若受積故令眼睛青是肝受積若傳膽其人口苦不要喫物宜凉藥退之　遍身虛腫是積其積不在藏只在府何以知之為其積曾取後被藥發動即不在藏故出皮膚之間為腫也只宜下取虛中積藥然後補之　多瀉白糞是積是受冷積在脾何以知之脾主化受冷積在脾冷滑而瀉白糞故知在脾宜先轉後熱藥補之　積痢不可醫者六

喘急是肺[illegible]則肺絕其人當面白全無血色故不可醫也　面黑是腎積其人面黑者是腎絕也人當不辨好惡眼直無光只得一日而死也　吐熱氣是榮積其不醫者是血絕不可治也血主心心不能管故出熱氣不止耳　手脚心生瘡是衛積衛者氣也胃氣不生故手足生瘡若衛絕則氣不回只得半日也　惡心吐乾嘔是胃積何以不醫胃主化食其胃熱則惡吐故不治其人必食乳不化不食亦乾吐嘔而色青黃無血色也　瀉久住又瀉是積咬脾爛何以知其脾爛其人當瀉白糞爲食不消化了却放糞亦黑而死即知脾爛不可治

寶鑑論小兒五積爲藏氣不行蓄積一處不動故曰
積夫心爲伏梁在臍上上攻其心下攻胃口脾爲痞
氣在胃口上橫之肝爲肥氣在臍之左邊肺爲息賁
在臍之右腎爲賁豚在臍下各有定所非食之所
成乃氣積也秋錫以爲在一處而不動也 聚謂六
腑之氣留聚也府屬陽氣運轉不停故其聚不定
一日後發而腹痛積聚之候皆面黃瘦劣喉間不生肌
肉[illegible]發有或肌膚浮腫腹急多困多爲水氣
嬰孩寶鑑虛中積候凡驚中虛積者謂因驚取復驚發
動是也所下糞青穢凡虛中有積者因傷食而瀉又
吐如此漸虛其病未瘥故曰虛積也又虛中之積有
積而頻頻取轉却取轉不著致其積潛伏故亦曰虛
中積若驚積取下則糞隨驚青如是食積則糞成塊
子凡癖中虛積者因癖病轉爲虛而癖不退故虛中
爾所取下糞裹白色也
寶鑑凡嬰孩所患積證皆因乳哺不節過餐生冷堅硬
之物脾胃不能克化積停中脘外爲風寒所襲或因
夜卧失蓋致頭疼面黃身熱眼胞微腫腹痛膨脹足
冷肚熱喜睡神昏飲食不思或嘔或噦口噫酸氣大
便腥臭此爲陳積所傷如覺一二日先以百傷[illegible]

發表次當歸散[illegible]煎服溫動積滯方下
痞丸六聖丸重則鉤利沿用勻氣散調補湯凡
有積滯須辨虛實兄孩兒虛瘦長短眾南北古今
不同不可一槩論也予今之法實者可服進食丸虛
者微白及痞瘦者宜服肥兒丸 醫初
患元氣未損之時或腹脹作痛大小便不利者先用
白餅子或木香檳榔丸下之下後以白术散或五味
異功散和之若加[illegible]不退或作
嘔作瀉飲食不思此脾胃傷也用六君子湯手足
指冷喜飲熱湯此脾胃虛寒也前方加炮薑木香面
色黃白目無精光脾肺俱虛也用四君子加柴胡升
麻腹痛泄利下重或小便不利者用四逆散發熱晡
熱或瀉未已脾氣下陷也潮熱口渴大便不調欲變
疳證也並用補中益氣湯佐以肥兒丸經云邪之所
湊其氣必虛留而不去其病乃實必以調脾爲主而
以消導佐之古人所謂養正積自除正此意也
千金紫雙丸 治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹
滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無
異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒
熱唯此丸治之不差更可重服小兒欲下是其蒸

飲嚙食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉
宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方 隱居等評
崔氏中凡云服紫丸者即前變蒸篇中四味者是也云服紫丸不下者服赤丸赤丸差駛病重當用之方多紫丸無赤丸而此用朱砂者[illegible]
巴豆去皮 杏仁去皮尖熬各卅銖 甘草炙卅銖
牡蠣火熬 赤[illegible] 黃蠟各[illegible]銖 甘遂
朱砂各二銖 麥門冬去心廿銖
右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘艸
已上六[illegible]牡蠣麥門冬下篩訖研杏仁令極熟乃內
散更擣二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半

八 幼科八 頁三三

歲兒服如荏子壹雙一歲二歲兒服如半麻子壹
雙三四歲者服如麻子壹丸五六歲者服如麻子
大貳丸七歲八歲服如小豆貳丸九歲十歲微大
於小豆貳丸常以雞鳴時服之至日出時不下者
投粥飲數合即下丸皆雙出也下甚者飲以冷粥
即止
孔先生青金丹 小兒諸積病悉主之
滑石末 白丁香[illegible] 天南星各二錢
青黛[illegible]半錢 膩粉[illegible]重二錢
水銀[illegible]於鍋[illegible]內[illegible]

川巴豆[illegible]浸水[illegible]當風處吹乾研
右前件藥同研令用軟飯為丸如小菉豆大巴豆
不出油依形證用湯使下 傷寒後取積滾煎蔥
湯吞下 取痢藥用生肉氣汁下 驚風肚中緊硬面
青黑金銀薄荷煎湯吞下 因傷肚中久腹皮上
似熱肚脹夜間作熱似瘧又[illegible]面青黃色服
微黃此肢中有積用皂角子[illegible]燒灰火煅過用
米飲湯煎至半盞下 有積作瀉用[illegible]湯下 氣積炒
茴香湯下 凡下此藥周歲拾肆丸三歲拾捌丸七
歲貳拾肆丸量大小加減下須是四更初下至天

八 幼科八 頁三三

明通下積來盡時可依形證候下藥補之臨臥此
藥恐先吐下些小涎來亦不妨
萬靈丸 主小兒諸積依形證用之
木香 一[illegible] 黃連 蓬莪茂各半
陳橘皮 青橘皮各去白一分 檳榔一枚一分半重
右除[illegible]七味[illegible]錢用巴豆[illegible]去心膜用醋煮
巴豆[illegible]枚[illegible]藥令巴豆紫色用杏仁[illegible]枚去皮尖
將火上煨[illegible]一味[illegible]研[illegible]為丸如小菉
豆大每服[illegible]丸[illegible]九拾丸[illegible]湯吞下
錢乙消積丸[illegible]

丁香六枚　縮砂仁十四枚　烏梅肉四個
巴豆去心膜十枚去皮
右為細末麵糊丸黍米大三歲以上服伍丸已下
參貳丸溫水下無時
紫霜丸　消積聚
巴豆去心膜出油　杏仁二十一個去皮各研　代赭石二錢細研水飛
右為細末飯丸如粟米大每服參伍丸至拾丸煎
皂角仁湯下無時兒小者減
真珠丸　取小兒虛中一切積聚驚涎宿食乳癖治
大小便澀滯癖腹脹行滯氣

木香　白丁香直者　丁香末
輕粉各半錢留少許為衣　白滑石末二錢　巴豆十四粒去皮浸一宿研
膩粉
右為末研勻濕紙裹燒粟米飯丸麻子大一歲一丸
丸八九歲以上至十五歲服捌丸炮皂子煎湯放
冷下挾風熱難動者先服涼藥一服乳癖者減丸
數隔日臨臥一服
消堅丸　消乳癖及下交奶又治痰熱膈實取積
硇砂末　巴豆霜　輕粉各一錢
黃明膠末五錢　細墨少許　水銀沙子兩皂子大

右同研細末少入麵糊為丸如麻子大倒流水下
一歲兒服一丸食後
白餅子　治小兒腹中有癖不食但飲乳是也
滑石　輕粉　半夏湯洗七次焙乾
南星各一錢　巴豆二十四個去皮膜用水一升煮水盡焙乾
右同研巴豆後入眾藥以糯米飯為丸如小綠豆
大捏作餅子兒三歲已上三伍餅四歲以下一二餅
煎葱白湯下臨臥
[illegible]丹　治小兒脾胃久不和積服溫熱藥
皆不效此藥神妙

肉桂　川黃連　蓬莪朮各一
肉豆蔻仁　檳榔　陳橘皮去白焙乾
木香　丁香各半兩巳上爲細末
巴豆去皮心膜　杏仁去皮尖炒黃另研各二件
右件同內將拌勻滴水丸黍米大每服不周歲一
粒二三歲二粒三四歲三粒五七歲伍粒十歲已
上柒粒用生薑湯放冷下乳食後久積或乳癖並
宜常服
剪紅丸　磨癖積殺諸蟲進飲食補脾胃男女老幼皆
可服孕婦勿服

乾漆（炒盡煙）　紫芫花（醋浸炒，各一分）　巴豆（去殼心，不去油）
斑蝥（去頭足翅炒，同糯米炒）
右為末，酢糊丸梧桐子大，用紅紗包紅線綑定，剪
下，米飲服。若丸同後藥服之。
南木香　雷丸　三稜（生）
莪朮（生）　百部（炒，各半兩）　貝母
檳榔　大黃（各一兩）　史君子肉（肆拾枚）
（半生半炒）　牽牛（半生半炒，取頭末）
為細末，用皂角拾錠，捶碎，山楂，陳皮，
兩，水肆伍碗，砂鍋內慢火熬，去小碗，將前末搜

為丸梧子大，日晚小兒粟米大，每服貳錢半，重各
隨後證改湯使，引下五更初服，忌葷腥生硬油膩
物。此方與前方其功無異。小兒痰喘咳嗽，
桑白皮湯下。　取寸白蟲，煎石榴根湯下。　腳氣
腫，木瓜湯或蒼朮下。　取蛔蟲，苦楝沙糖
水下。　小兒一切諸證，蜜水或沙糖水下。　酒病
酒積，葛根湯下。　婦人血瘀不行，淡醋紅花湯
送下。　婦人血崩，烏梅湯下。　腸風下血，煎山梔
子湯下。　大小便不通，淡醋湯下。　食積氣塊諸
證，用溫蜜水或茶湯下。

局方進食丸　治乳食不化，心胸脹滿
木香（炮）　枳殼（麩炒，去白）　當歸
代赭石（火煅，各五錢）　硃砂（三分，另研）　巴豆（一分，去油膜）
麝香（五分，另研）
右為細末，麵糊丸如黍米大，一歲二丸，量兒大小
加減，米飲送下。
大聖丸（錢氏）　治諸積，和胃，大能主氣，厚腸，消府，快膈
莪朮（炮製）　淨黃連　陳皮（去白）
白薑（炮，各伍錢）　南木香（二錢半）
右除木香不見火，餘四味剉，焙，同木香為末，每一

錢用巴豆三粒，去殼膜心，存油，碎切，入乳缽細研，
同前藥再研勻，煮麵糊為丸麻仁大。每服拾伍粒
至貳拾伍粒，或叁拾伍粒，五更空心，淡薑湯下。利
三伍行，以白粥補止。　方曰：常服助脾化食，進食消
痞，除腫，以淨湯或湯酒下三粒及伍粒，每次止丸
藥末三錢，淨巴豆伍粒，為則不可多合，久則味敗。
烏犀丸（錢氏）　治諸積，溫脾胃，潤腸，消進飲食，
吐逆，醋酸氣，面黃肌瘦，不拘孩兒生後歲月遠近，
並宜可投。
烏犀（即皂角，剉三寸長，燒灰，火中見青煙起，烈，於盞中蓋定，存性，冷，用淨末）

真方五色丸子 治小兒一切所傷痰涎壅塞潮熱
不利乳食不消變生癖積脇肋片硬按之疼痛及
治一切急慢驚風發搐痰涎壅塞
青丸子 青黛 南星 巴霜半錢
紅丸子 朱砂 半夏 巴霜半錢
黃丸子 大黃 鬱金各半兩 巴霜
白丸子 白附子 寒水石 巴霜半錢
黑丸子 五靈脂 全蝎 巴霜半錢
右前五色藥各另研為細末入巴霜半錢同勻麵
糊丸粟米大一歲服伍丸乳汁送下量大小加減

荳湯下急驚金銀薄荷湯慢驚生薑全蝎湯
下積丸 治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉或
嘔
丁香二錢 縮砂仁 使君子肉
烏梅 巴豆肉
右為末爛飯丸麻子大每服三丸陳皮湯下
五珍丸 治消食積通用
青皮 乾薑 蓬朮
五靈脂 巴豆肉
右為細末便米飯丸如麻子大每服三五丸米湯下

硫黃 白滑石 陳皮
川烏 巴豆
右先研硫黃細除巴豆外餘藥同焙為末却將
巴豆細研同前五味藥末研勻用粳米飯包作
一大粽子小瓶盛水煮熟候冷取出沙缽內爛
研為兒緊絞出如餻糊安作別器內以藥末亭
分同杵細揉丸粟米大取此積每服拾伍丸或伍
丸或貳拾至叁拾叁丸並用淡薑湯泡冷飯
汁小盞五更初空心送下通利三五行以勻氣
散止補治積止有暗積氣每服叁丸至伍丸用淡
薑湯入米醋少許微溫空心下

水晶丹 治驚積食積蟲積腹脹煩渴心悶食減面
黃並宜通利此藥有頑積脾熏風緊涎多熱極乃
可服非常用之劑及急驚後風痰未盡亦生熱痰
宜再投
南星 半夏 滑石
輕粉 淨蕪荑 巴豆
右前三味焙為末拌和輕粉外蕪荑巴豆同碎切
在乳缽內細杵入前藥末再拌勻如烏犀丸內

糊丸麻仁大每服拾伍丸至貳拾伍丸或叁拾伍丸
丸糯米湯泡蔥白取汁小盞五更初空心下過三
五行進匀氣散調補下飯痰溪湯空心服
來寶方呷餅子　取一切積及虛中積下取涎癖取
病其效全不搜攪
輕粉　粉霜各肆錢　不蛀巴豆人各二拾伍粒去油為細末
延胡索人皆二…滴為末
右四味同研勻滴水和丸如大菉豆大仍放厚陰
乾每服壹餅先用熱水浸軟冷漿水調下臨臥更
深服後忌熱口此藥只取積滯並不損氣更臨時

加減若下驚積則每料更入朱砂半錢腦各半錢
重小兒一餅作四服或便捏成小餅子
青氏追魂散　治果子傷積
白丁香　輕粉　官桂各三錢去粗皮
右為末冷水調下半錢睡時服來日取下所傷物
用萬功散煎紫蘇木瓜湯調三服和氣萬功散方見後
沉香檳榔丸　和脾助胃進食消痞思胸快膈順氣
調中悅顏色壯筋骨理血滯疼痛虛虧瘦弱過食
生果停寒在裏氣癖腹脹作疼及治冷痢痢疾後
脾胃虛弱

沉香　檳榔　檀香
附木香　丁皮　三稜煨剉
蓬莪朮炒　莪茂炮　麥芽微炒
厚朴去粗皮薑汁炙　蒼朮米泔浸焙乾　史君肉焙剉尼去
青皮　陳皮各去白　縮砂仁
益智仁　淨香附　枳殼去瓤麸炒
良薑各半兩　甘草炙一兩半
右除前五味不見火餘十五味剉焙仍同沉香等
為末水煮麵糊丸麻仁大每服三拾丸至伍拾丸
溫米湯無時送下兒小不能吞嚥煉蜜丸如芡實

大每以一丸至二丸溫湯化服
集驗過朮丸　治乳食不化心腹脹滿一切所傷
三稜　莪茂並煨　淨陳皮
淨香附炒　蘿蔔子炒各…　砂仁
淨青皮　淨枳殼麸炒　胡黃連
廣香各三錢　胡椒二錢半
右細末糊丸黃米大每服三拾丸加至肆伍拾丸溫
米飲下日三二服忌生冷硬物
議曰其候但見吐下乳來有酸臭氣因啼叫未已遽
與乳哺停滯不化而得若先生先用丁香散吐瀉門

冐後下牛黃丸取下妳積後下勻氣散（不計）常服進（退）
脾散（煎不計）即愈　聖惠乳癖之候面色青黃發歇壯
熱吐乳多睡口内生瘡漸漸黃瘦腹内結塊不散由
乳母食飲無常醉飽過度便即乳兒或乳母偏卧一
向乳兒不能廻轉兒亦睡着乳滯偏于脇下因茲結
聚成塊而痛者是也

聖惠京三稜散　治乳癖結實或有滯悪停積不化
令兒日漸羸瘦面色痿黃吞食多變不欲乳食（一
京三稜　川大黃（微炒）　檳榔
鱉甲（...）　赤茯苓（各半兩）　枳殻（麩炒微黃去瓤二分半）

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓
分為二服日三四服逐下悪物為度

張渙三稜散　治小兒乳癖結實不瘥
京三稜（炮剉）　赤茯苓　當歸（洗焙）
鱉甲（醋炙黃去裙襴）　木香
白朮（各半兩）
右搗羅細末每服一錢水一盞入生薑二片煎至
伍分去滓放温時時滴服

聖惠化癖丸　治乳癖結塊久不消化諸藥無效
巴豆霜（半兩）　膩粉　朱砂（各一分細研）

黃鷹糞（...）　硇砂　雄雀糞（...）
右件都研如粉用糯米飯和丸如黍米大一歲兒
每服空心煎皂莢仁湯下二丸取下悪物為度

丁香化癖散（劉氏）　治乳癖
白丁香　密陀僧　硫黃（已上各一分）
硇砂（伍分）　輕粉（少許）
右研細末每一歲兒服伍分男病女乳調女病男
乳調出下黑糞為度後用通膈丸泄之

三丁丸（見積門中）

青礞石丸　治證同前

硫黃（三分）　青礞石　五靈脂
鍋底墨（各半分）　白丁香（去土一分）
為末米飯丸菉豆大捻餅子每服二捻餅温水下

玉訣銀白散　生胃氣取下後宜服此方
人參　茯苓　甘草（炙）
白朮（炒麫）　白扁豆（去皮）　藿香葉
右各等分末一錢紫蘇湯調下

張氏治小兒妳癖方
用芫花（一兩醋浸三日漉乾）　大黃（一兩）為末入蒜一斤同研（木）
研爛（...）左女右男用藥塗在乳母手心[illegible]

如□和匙入口中出藥氣即時取了少効

董氏家傳治小兒妳脾極効方

紫河車一兩　寒食麪三兩

右同為細末每用一匙許水調塗足心病在左塗

左病在右塗右塗於紅帛上繫之良久其病大便

中下夫枚入多矣大便盡洗去

孔氏家傳治小兒妳癖方

右用蜜陀僧不拘多少研極細以大蒜自然汁調

稠稀得所塗於有妳癖處隨其大小闊狹又不可

塗之太過須臾候兒口中有蒜氣息即是藥透

細以手揉之覺妳脾似消及五六分即用溫漿水

洗去切須量度不可令消盡恐藥毒損氣也如未

消藥先乾即以溫水潤之

譚氏殊聖治孩兒妳癖方

紫河車草　人參各等分

右為末用好醋調拍成餅子如大錢大如左畔有

癖者藥貼左畔脇心用緋帛扎乾後見効左右一

般使藥

食癖壯硬而熱於他處或瀉或嘔因飲食過飽後

而□而時故先生用牛黃丸取積後用白朮散調治

常服萬靈丸即愈錢氏消積丸真珠丸方見□

快膈消食丸

砂仁　陳皮　三稜

莪朮　神麴　麥蘖各半兩

淨香附子二兩炒

為末糊丸如麻子大食後白湯下看輕重加用

損藥一方加麥蘖芽

□其候面色黃白不進食腹痛夭矯啼叫利如蟹

渤此因縈衛不和三氣鬱悴日久得之　茅先生用

萬靈丸勻氣散醒脾散相夾調理

秘錄治小兒氣癖取三稜針作羹粥以米麪為之與

乳母食每日服一盞以大與兒喫亦得作粥與羹並

食之治小兒十歲已下及新生百日無問癇熱無

辜痃癖等皆理之妙不可言

食積面黃如土色或面帶虛浮臍上微痛肚皮熱

飲食減少纔食便吐或一父腹中痛所食不化頭微

熱此因先食硬物或冷物所傷宜用治之先下青金

丸觀取下脾中積後用勻氣散醒脾散調理常服醒

脾散萬靈丸即癒

□□□有時時時泄瀉□如生米汁是受傷而復傷

癖嘔吐嘈[illegible]常以牛黃名為驚積先解驚後理積錢氏
五苓散或百祥散甲乙檳三稜散或以牟丸及三解散
妙神麯生薑煎湯調服如甲冷積枳殼丸錢氏驚化
積壯氣和胃仍節冷乳自然平治

羅氏紫金丸　治大人小兒因驚積積聚痞塊物在
胸膈留滯用藥取不下變成虛中積大人與食壯
逆心腹脹滿夜有虛汗日漸瘦弱用生薑湯下柒
丸婦人血氣米飲下伍丸至柒丸小兒驚積體熱
面目重目不開丹參熱甘草桃仁薄荷湯化膩粉壹
字許下一歲上三歲下参丸小兒只可壹丸貳丸

蝎梢 叁錢　犀角末　銀末
朱砂 各一錢

右研極細末用水糊和為丸菉豆大依前湯使

羅氏歡金丸　治驚涎下積聚

青黛　膩粉　胡黃連
麝香 各二錢半　寒食麵 叁錢　史君子 叁箇
天漿子 叁枚

右七味研勻滴水丸梧桐子大每服壹丸用金銀
薄荷湯化下

錢氏進食丸　治小兒乳食不消癖積常服進食止[illegible]

馬牙硝　朱砂　茯苓
人參 各等分

右末之二歲服二字一歲一字三歲亦貳字四五
歲三字新汲水入少蜜調下蜜水約盞內三分許

湯氏云驚癖須用蘇合香丸可治之

虛中積　其候渾身微熱不思飲食昏睡神緩抱着一
似無力覺壯熱足冷者多因可瀉大病及攻擊之後
而得此候茅先生先用青金丸取積後用勻氣醒脾
散調理常服蘇感丸保童丸即愈

王先生靈砂丹　下虛中積藏府虛滑泄瀉久經取
轉或急後重久積惡痢暴瀉久不止神效

通明硇砂 一兩　顆塊辰砂 二兩

右二味參研極細用黃蠟半兩先於盞內鎔化入
去皮全巴豆三七粒煎候巴豆紫色為度漉豆出
細研入前二味再研勻於黃蠟內三分取一再鎔
成汁傾藥入內急攪令勻和入藥合收之每服藥
瀉惡痢旋丸三丸如菉豆大濃煎艾湯先呷三五
口然後吞下水瀉冷水吞下如取積每服三丸如
梧桐子大濃煎甘草湯放冷吞下臨卧服其久積

藥隨積下其小可不動便安

按既是虚即不宜用峻劑取積仍須用四君子益黃散之類相兼服之

嬰孺積其候大便不通風毒瘡疥喉閉痄腮咽中涎響

茅先生先用奪命散數錢吐下熱涎後用匀氣散醒脾散調理常服牛黃膏天竺黃散並見本卷鎮心丸即愈

錢氏仲陽云積痛口中氣温面色黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積而痛自除宜下積丸甚者白餅子下之後和胃氣用白术散

劉小沉香丸感應丸治之又有食積肚痛有熱者芍藥甘草湯方見驚加乾葛生者加芩更生者或加枳實亦效

六方並見本卷 百七三

小沉香丸 和中順氣進食消痰

砂仁 蓬莪朮各四錢 香附子去毛炒一兩八錢

䑕上丁香皮二兩 益智仁炒一兩 沉香六錢

甘松洗去土三兩 甘草炙一兩

右為細末湯浸蒸餅丸如桐子大每服三拾或肆拾丸食後溫薑湯下或嚼破更妙

積聚良方妙香丸 治小兒虛中積潮發寒熱心腹脹滿疼痛

辰砂一兩 牛黃 生龍腦

麝香各二錢半 金箔十四片 粉霜

膩粉各一錢 黃蠟二兩 巴豆一百二十粒去皮心

右丸如彈子大量虛實加減龍腦漿水下夜半後服取虛滑以龍腦水飲下每服三丸如小豆欲藥勢緩即按令扁以針刺作數孔以行藥力小兒取積丸如菉豆治小兒吐逆尤效此藥蒸下胸中痰及疳熱

要論治小兒自下後得寒熱血結成癖氣在左脇下或寒飲或冷食積聚氣動胸心留熱不下食飲關痰宜先服少飲子數氣下食後服紫雙丸去宿積自差

方並見本卷 百七三

溢也飲子方

柴胡 茯苓 人參

白朮 鼈甲醋塗炙香各半兩

右切如豆大水二升煮取六合空心分溫為肆服相去如人行一二里久再服食粥將息

茅先生論小兒生下五個月日上至七歲有結癖在腹成塊如梅核大來去或似卵大常叫疼痛者亦分數類在左脇下痛者名痃氣在右脇下痛者名癖氣下蓬莪茂散[illegible]建[illegible]與服[illegible]愈如見血

眼目直視口黑面身口冷手足冷不進食者死　錢
氏論小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲
水或喘嗽與潮熱相類不早治必成疳以其有癖故
令兒不食致脾胃虛而熱發故引飲過多即盪滌腸
胃亡失津液胃不能傳化水穀其脈沉細益不食脾
胃虛衰四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成疳矣　論
癖為潮熱　錢氏曰宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食
而飲水及乳不止衆醫以為潮熱用牛黃丸麝香丸
不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當下白餅子
後補脾乃以消積丸磨之觀此乃癖也後果愈何
以故不食但飲水者食伏於管內不能消致令發寒
服目前藥吐者以藥衝脾故也下之即愈　仁齋曰
癖者血膜包水側僻於脇旁時時作痛也惟癖為能
發潮熱能生寒熱故瘧家中脘多有黃水日久而復
結癖寒熱不已有是疾者以此小兒氣液相小榮衛
調暢則津液自然流通縱使多飲水漿亦不能為病惟
乳哺失調三焦關隔以致水飲停滯腸胃不能宣通
如冷氣搏之則結聚而成癖輕者用消癖木香丸重
者用取癖丸　曾氏曰嬰兒始生臟腑未完失於撫
養之不謹乳哺之不節外為六淫侵襲內因五臟氣

虛冷積久停於脾不能運化結成痃癖見於脇下或
左或右俗曰痞癖其疾皆因積滯然作致有寒熱或
腹肚疼痛或晝涼夜熱治療之法氣實者亦須溫正
胃氣後用烏犀丸或水晶丹下之如過一二次即以
補脾略見所作形證酌量方投補益之劑氣虛者
先與益脾胃固真元調和飲食進多如前法下
之若太虛則用三稜散化癖丸消之順調陰陽以
平為期然先補後瀉行迎奪之法則取去陳寒冷積
若面黃餘熱又發瘦乃為虛極不可輕下但徐徐
用藥消化調理為上若兒小者更令乳母常服藿香
散使藥從乳過亦小助也

寧先生達氣散　主小兒疳氣一切氣疾

蓬莪朮　青橘皮　益智各半兩
木香二錢　糯米一兩

右為末每服壹大錢用陳米飲調下日進四服

聖惠鱉甲散

用鱉甲壹枚塗醋炙令黃去裙襴　右擣細羅為末每服壹錢以
童子小便一小盞煎至伍分量兒大小分減服之
日三服神效

化癖丸　曾氏　主癖結氣塊在脇之間日久不化作疾作

脾臟不調米穀不消嘔氣喘促胸腹滿悶及理
丁奚哺露
　甫木香　陳皮去白　莪茂炮製
　三稜炮製　青皮巴豆拌炒去巴豆　去皮膜
　枳殼去穰麩炒　檳榔半兩米炒各　白朮
　丁香二兩各　細辛洗淨去苗
右除木香檳榔丁香不過火餘七味焙同前三味
為末麵糊丸作麻仁大每服拾伍丸至二十一丸
清米湯空心下有寒熱往來以柴胡飲間服為妙
燕生珍

木香丸　治吐乳瀉乳其氣酸臭由啼叫不已以乳
與兒停滯不化是為乳積肚硬熱渴吐瀉由飲食
無度過飽即睡是為食積腹痛啼叫利如蟹渤由
觸忤其氣榮衛不和淹延日久是為氣積瘧後脇
內結癖成塊
　木香　蓬茂　砂仁
　青皮去白　硃砂研細　代赭石研各
　大丁香　川巴豆肉各一錢去油
右為細末和勻飛白麵糊為丸麻子大每服一二
丸乳傷乳汁下食傷米飲下

取癖方　峻劑非實積危甚不用
　三稜醋炒　芫花炒　牽牛半炒半生研取末
　辣桂　蓬茂　青皮去穰
　木香　桃仁浸去皮炒　五靈脂各二錢
右為細末入去油巴豆霜半錢研和一分細飛麵糊
丸麻子大每服一丸煎湯下泄後冷粥
補例和胃
消癖丸　治乳癖痃氣脇中步痛
　木香　青皮去穰　蓬茂
　代赭石火煅醋淬　生地黃各叁錢　巴豆去殼去油
右為細末醋麵糊丸麻子大每服貳丸食後[illegible]
泡湯下
外臺必効療大人小兒癖方
右取車下李仁微湯退去皮及雙仁與乾麵相半
擣之為餅如猶乾和淡水如常溲麵大小一如病
人手掌為兩餅微炙使黃勿令至熟空肚食壹枚
當快利如不利更食壹枚或飲熱粥汁即利以快
利為度至午後利不止即以醋飯止之利後當虛
病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限小
兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不効甚病

重者李仁與麵相半輕者以意减之後服者亦任量力頻試著神効

聖惠前胡丸　治小兒癖氣腹痛

前胡　桔梗各去蘆　赤芍藥

赤茯苓　枳殼　川大黃

當歸　郁李仁湯浸去皮微炒各半兩　鼈甲醋炙令黃一兩

右件搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服空心以粥飲化破伍丸服量兒大小加減

嬰孺治小兒閃癖身體壯熱頻服冷藥冷氣浸心成癖下焦又冷腸結大便難方

茯苓　川芎　鼈甲炙

枳殼炙　芍藥各貳分　柴胡肆分

右劑以水壹大升煎至參合空心為二服去如人行五六里再服忌莧子

朱氏知母丸　治小兒腹痛不闕乘癖氣

知母陸分　鼈甲　牡蠣

枳殼各分　大黃

右件為末蜜丸如菉豆大米飲下伍丸大人以意分減服

治七八歲兒多睡或時壯熱日加瘦瘠雖不痛有時痛腹脹逆不食是癖氣之候其疾似瘧致人多不識此患方

柴胡　黃芩各壹　枳殼兩炒

甘草　芍藥各貳分

大訶梨勒煨取皮

右件為末水壹盞煎服

針灸　小兒癖氣久不差者灸中脘一穴章門二穴各柒壯章門在大橫外直臍季脇肋端側臥屈上足伸下足舉臂取之　中脘在上脘下一寸臍上四寸是心蔽骨與臍之中從髑骭下取病人四指是穴併灸脾俞　無不驗

渴

蒙古論渴有三種　一者實熱積於心肺煩躁大渴引飲宜白虎湯謂不因吐瀉大病忽然而作　二者因久病或因吐瀉津液虛引飲宜白朮散　三者因患瀉熱病熱結膀胱小便不利大渴引飲有表裏證者宜五苓散主之　[illegible]

渴紅甚焦黑則危篤若三焦虛煩作渴者用三黃湯傷寒後餘熱在者用白虎湯竹葉湯瀉痢作渴者用五苓散之類常治見者乃心脾煩渴引飲者用白虎湯下利脾虛作渴用七味白朮散熱結膀胱小便秘渴者用五苓散上焦虛熱者用四君子湯胃經積熱者用瀉胃散脾胃積熱者用瀉黃散中氣虛熱者用異功散腎水虛熱者用六味丸其餘雜證發熱各詳本證脫血所致者當各審其因若誤用寒涼降火脾胃復傷則腹脹而為敗證矣

[新增]白虎湯（方見發熱）

三黃湯

黃芩　黃連　黃檗（各等分）

右水煎服

[illegible]　治小兒心肺積熱渴不止咽乾痛

黃連　山梔　川升麻

白茯苓　麥門冬（去心）　玄參

甘草（炙）　桑根白皮　黃芩（各半兩）

右件為末每服一錢以水一小盞入竹葉七片煎五分去滓入蜜半合再煎一兩沸放溫時時服之

麥門冬散　治小兒心肺熱壅口渴不止

麥門冬（去心）　梔子仁　犀角（屑）

知母　甘草（炙）　黃芩（各等分）

右為散每服一錢水一盞入竹葉七片煎五分不計時候服亦可量兒大小分減服

[新增]銀液丸　治小兒熱渴不止

銀石　石膏　寒水石

麥門冬（各等分）

右件藥以水三升入銀石一[illegible]煎至二升去銀石次下諸藥煎至七合去滓每服半合不計時候溫服之量兒大小加減

[illegible]散　治小兒熱渴不止煩悶

栝樓根（半兩）　黃芩　知母（各一分）

右件搗羅為散每服一錢以水一小盞入小
粟米一百粒煎至五分去查不計時候溫服量兒
大小以意加減

又方

栝樓根 參分　黃芩 半兩　小麥 半合

右件以水三盞煎取一盞去查不計時服量兒大
小加減

又方

生葛汁　竹瀝 各[illegible]合

右件汁相合勻不拘時服半合量兒大小加減

茅先生胡黃連散 治小兒諸渴及病渴解諸般熱

胡黃連　麥門冬　乾葛

玄參　甘草 炙　枇杷葉 去毛

右各等分為末每服一錢水七分一盞生薑一片
同煎五分後放蜜三五滴同煎至四分溫服

聖惠蘆根散 治小兒壯熱不止

蘆根　黃耆　人參

甘草 炙　麥門冬　知母 各半兩

右件搗羅為散每服一錢以水一小盞入竹葉七
片粟米一百粒煎至五分去查不計時候量兒大

兒之大小以意加減

嬰孺麥門冬湯 治小兒夏天服藥大下後胃中虛
熱渴欲飲水

麥門冬　甘草　龍骨 各四分

枳實　黃芩　茯苓

人參 各三

右以水四升煮取一升半為三服服此湯後渴不
差取水芹煮濾汁飲之間湯服之甚者恣意與之
服

蘆根飲子 治小兒壯熱渴兼吐不止

生蘆根 切伍合　淡竹青皮　人參 各捌分

枇杷葉 伍分　知母 一分　粟米 三合

右以水五升煮之一升半量兒大小與之服

紫蘇湯 治小兒熱渴或吐下後虛熱渴

紫蘇 伍分　黃芩 分　知母

蘆根 各二　生米 一合　麥門冬 二合

右切以水五升煮二升如飲漿水度服之

錢氏白朮散

人參 切去頭　白朮　木香

白茯苓 去皮　甘草 炒　藿香葉 各

右為細末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時

海藏云治發渴四君子加乾葛枇杷葉先以棗湯[illegible]各等分入木瓜少許同煎服亦治虛渴法也

滲濕　五苓散方見[illegible]

小方脈論小兒渴病喫水太多腹脹泄瀉此病得之心心藏熱心與小腸合小腸亦受熱小腸既熱其氣上行衝胃口致移了喫水其水待行小腸被小腸氣熱滲泄不及轉入大腸如治之先下淋藥後下涼心藏湯[illegible]藥然後止渴乃効　按此亦五苓散意也

小方脈論治渴先下淋藥方

滑石各一兩　旱蓮子半兩

右件為末每服半錢煎燈心湯調下忽進二三服涼心藥

小方脈論欲止渴次涼心藏藥方

烏賊魚骨　海浮石各一兩　蒲黃炒半兩

右末每服半錢用枇杷葉煎湯下

黄疸

錢乙論黄相似云身皮目皆黄者黄病也身疼髆背強大小便澀一身盡黄面目指爪皆黄小便如屋塵色看物皆黄渴者難治此黄疸也一證多病於大病後別有一證不因病後身微黄者胃熱也大人亦同又有面黄腹大食土渴者脾疳也又有自生而身黄者胎疸也古書云諸疸皆熱也深黄者是也若淡黄兼白者胃怯胃不和也　雜病云色如熏黄乃濕病也一身盡痛　色如橘子黄者黄病也身不痛　乾黄燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲者梔子蘗皮湯　濕黄脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者大茵陳湯　大便自利而黄者茵陳梔子黄連三物湯　往來寒熱一身盡黄者小柴胡加梔子湯

潔古云陽黄則大小便赤澀身熱見脾[illegible]與心火相摶為陽病法當先利小便後下大便　陰黄則清便自調面目及身黄四肢冷是脾虛不能制腎水當用益黄散下使君子丸[illegible]　凡治黄病腹脹當用茵陳蒿湯調下五苓散若欲利小便去大黄欲利大便則加大黄之類有陽[illegible]

水若是也　湯氏云身疼痛皆疼大小便澀皮膚面
目齒爪皆黃小便如屋塵色利者易治澀者難治宜
服五苓散加茵蔯蒿湯調又宜服導赤散加茵蔯煎
或身熱宜服小柴胡湯甚者服承氣湯　曾氏黃病
者不可一槩而論標本不同證治亦異乃脾胃氣虛
感受濕熱鬱於腠理淫於皮膚蘊積成黃熏發於外
故有此證以脾胃虛弱內因傷積得之而成然有為
亦主皮黃及聲啞大青筋肌肉消瘦外無色澤身必
發黃此又本於有病而作致有是證治法若感濕熱
而得身黃如煙熏之色以四五苓散加麻黃水蓄
黃疸 [illegible]
煎投汗之即愈或用茵蔯蒿湯調下五苓散亦好
若得於飢餓者其形如黃土相類以醒脾散後見
癖丸積醒脾快胃磨積理滯胃氣既和飲食倍進運
化精微榮養百骸灌溉臟腑五色各見於本部精華
乃形於面貌其黃自除　聖濟曰中央黃色入通於
脾故黃疸者脾之色也夫人身之神貴於藏而默用
見於外則內虛矣其證皆因脾氣有虧運化失職濕
熱留於肌膚發而為疸錢仲陽所謂身痛背彊二便
澀滯遍身面目爪甲皆黃是也小便褐色者難治療
法宜固脾為先如專用尅伐寬中流泄利水之藥則

所有不[illegible]色者皆矣若初生及百日半年之間[illegible]
而身黃者胎疸也腹大食土為脾疳兼作[illegible]
冷者用理中散方見小便不利者茵蔯湯方見後發黃腹
休浮腫者用白术散方見病便自調渴飲冷者此皆黃
散理身發黃食不消者調中丸方見及補中益氣湯加茵
蔯身熱濕滿肌膚面目皆黃者加減瀉黃散辨其所
以若胎禀中熱多哭不已大小便赤澀口中熱氣者
避妊娠厚味胎毒之證宜母子並服生地黃湯方見仍
忌酒麪五辛熱物設不自慎恐傷脾土甚則變為驚
風吐瀉疳則肢體浮腫小便不利眼目障閉多成兼證
驚疳
脾疾又有脾虛發黃者當於脾胃中求之
茵陳蒿湯　治陽明病發熱汗出者此為熱越
越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不
利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃傷寒七
八日身黃如橘色小便不利腹微滿者宜此
茵蔯蒿一兩　大黃半兩　梔子三枚
右剉散以水一大盞先煎茵蔯減半次內二味煎
一揃分去滓溫服日三服小便當利如皂角汁狀色
正赤一宿腹減黃從小便中去也量大小加減
梔子蘗皮湯　治傷寒身黃發熱

梔子八枚　黃檗一兩　甘草炙半兩

右㕮咀散每服一錢水一盞煎陸分去滓温服

犀角散　治小兒黃疸一身盡黃

犀角一兩　茵蔯　乾葛

升麻　龍膽草　生地黃各半兩

寒水石七錢半

右㕮咀散水煎服　一方治小兒忽發黃面目皮肉並黃生地黃擣汁和蜜服

連翹赤小豆湯　治小兒傷寒發黃身熱

麻黃去節　連翹　甘草炙

黃芩　各一升入

生薑　赤小豆　生梓白皮各二兩

杏仁去皮尖　大棗十二枚

右剉散以水煎又一方生小麥苗擣汁服之立效

羅謙甫治一小兒季夏身体蒸熱胸膈煩滿皮膚如濱橘之黃眼中白睛亦黃筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以濕氣而蒸熱搏於經絡入於骨髓使臟氣不平故脾遂乘心濕熱相合而成此疾也蓋心火實則身体蒸熱胸膈煩滿脾濕勝則皮膚如濱橘之黃有餘之氣必乘己所勝而侮不勝是腎肝受邪而筋骨痿弱不能行立內經言脾熱者色黃而肉蠕動又言濕熱成痿信哉斯言也所謂子能令母實實則瀉其子也蓋脾土退其本位腎水得復心火自平矣又內經曰治痿獨取於陽明正謂此也加減瀉黃散主之

加減瀉黃散方　此藥退脾土復腎水降心火

黃連　茵蔯各五分

黃芩　山梔　茯苓各三分

澤瀉二分

右㕮咀都作一服水一盞煎至六分去滓稍熱服食後一服減半待五日再服而良愈

經云土位之主其瀉以苦又云脾苦濕急食苦以燥之故用黃連茵蔯之苦寒除濕熱為君腎欲堅急食苦以堅之所以黃檗之苦辛寒強筋骨為臣濕熱成煩以苦瀉之故以黃芩山梔子之苦寒止煩滿為佐濕淫於內以淡滲之故以茯苓澤瀉之甘淡利小便導濕為使也

張渙茵蔯湯　治黃病

蘆根剉一兩　茵蔯　山梔子

黃芩　甘草炙四味各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入薄荷三葉

煎至伍分去滓放溫服

黃芩散 治黃病

黃芩　瓜蔞根　茯神各一兩

甘草　胡黃連各半兩

右件為細末每服壹錢水捌分煎五分去滓溫服

茵陳湯 治小兒發黃脊病身如橘色

茵陳　山梔子仁各一兩　川大黃

川芒硝　木通　寒水石各半兩

右煎服法同前

三黃散 治小兒黃疸

川大黃剉微炒　黃芩　黃連去鬚各一兩

右煎法同前食後服

黃連丹 治小兒病

川黃連半兩　胡黃連各一兩

右件搗羅為細末用黃瓜一枚去穰留一小蓋子入二藥末後以蓋子蓋定用麵裹慢火煨令麵焦去麵搗熟如菉豆大每服溫漿水送至拾粒溫水下無

兒大小以意加減

當歸散 見夜啼門

檳榔丸 治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛或腹中氣滿或時嘔逆不欲飲食

當歸　白芍藥　人參

川芎各三兩　甘草炙　白朮各半兩

右為末水煮麵糊為丸如麻子大三歲兒每服拾丸粥飲下日三服量大小加減冷甚加陳皮

小半夏湯 治黃病小便色不變欲自利腹滿而喘者不可除熱熱去必噦

半夏湯洗七次

右剉散每服叁錢水一盞生薑拾片煎柒分去滓溫服

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲水身體面目俱黃小便不利不得安臥不思飲食

茯苓伍分　澤瀉三分　茵陳陸分

豬苓　黃芩　山梔

黃連　防己　白朮

蒼朮　陳皮　青皮

枳殼各二分

右㕮咀水煎徐徐溫服

消食丸 治小兒脾胃不和常服寬中快氣消

乳食正節色

縮砂仁　陳皮　三稜

蓬莪　神麴炒　麥芽炒

香附子米泔浸炒　枳殼　檳榔

烏梅各半兩　丁香二錢半

右為末麵糊丸菉豆大食後紫蘇湯下二三十丸

丹溪治小兒吐瀉黃疸方

三稜　蓬莪　青皮

陳皮　神麴　麥芽

黃連　甘草　白术

茯苓各等分　[illegible]

右為末溫熟水調服若傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷

[illegible]治黃者胃不和也平胃散不乳調中丸[illegible]

[illegible]术散見渴

瓜蒂散　治小兒忽發心滿堅硬脚手心熱變為黃疸不急治則殺人

瓜蒂米粒　赤小豆米粒　秫米米粒

右為末用一字吹兩鼻內令黃水出餘末蜜水調服之得吐出黃水即愈　一方瓜蒂炒赤小豆[illegible]

每一錢溫湯調服服後即卧當吐清黃汁為效虛者不宜服

千金黃苓主九疸散兼治大人小兒方

胃疸食多喜飲梔子仁主之　心疸煩心心中熱茵陳主之　腎疸身乾[illegible]主之　脚疸尿赤出少惕惕恐[illegible]主之　[illegible]椒瓜蒂主之　[illegible]主之　肉疸小便白凝水石主之　[illegible]目深多嗜臥牡蠣澤瀉主之　肝疸胃熱飲多水激肝白术主之

右一十一味等分隨病所在加半搗篩為散飲服五分匕日三稍稍加至方寸匕兒小者量與之

千金翼治大人小兒黃疸變成黑疸醫所不能治方

右用土瓜根搗汁一升頓服之病當從小便出小兒分減服　葛氏亦治小兒四歲發黃者

千金翼治大人小兒黃黑疸等方

當歸三兩　桂心六兩　乾薑[illegible]

麥門冬一兩　大黃二兩　茵陳

黃芩　黃芪一本無　乾薑

茯苓　芍藥　黃連

石膏研 人參 甘草各二兩

右十五味㕮咀以水一斗煮取叁升半分肆服小兒分減服

千金翼赤苓散 主黑疸身皮大便皆黑通治大人小兒

赤小豆三十枚 茯苓 女萎各陸銖

雄黃一銖 瓜丁肆銖 甘草二銖

右六味以水叁升煮豆茯苓取捌合搗四味為散和半錢匕服之須臾當吐吐則愈亦主一切黃 小兒服半字匕

滯頤

錢氏論滯頤之病是小兒多涎唾流出漬於頤下由脾冷液多故也脾之液為涎脾氣冷不能收制其津液故冷涎流出滯漬於頤也 按內經云舌縱涎下皆屬於熱而此云脾冷亦一偏之見然無處冷熱各一方為備之然以流出為冷不流出為熱恐亦未確

張渙溫脾丹 治脾冷病

丁香 木香各一兩 半夏一兩用生薑六兩同搗

乾薑炮 白朮各半兩 青橘皮 白朮

右件搗羅為細末煉蜜和如黍米大每服拾粒米飲下量兒大小加減

溫胃散 治脾冷流涎

丁香一兩 肉豆蔻 半夏白礬水浸炒黃

白朮 乾薑 甘草

人參去蘆頭各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水八分入生薑二片煎五分去滓溫服食前

金朱丹　治脾熱多涎

金箔二十片研　朱砂細研水飛　半夏湯泡七次取末

天南星牛膽製取末各一兩　白茯苓取末

石膏細研水飛各半兩

右件拌勻再細研用生薑自然汁和如黍米大每服十粒煎人參湯下乳後

牛蒡丹

牛蒡子一兩　鬱金　川朴硝

枳殼去瓤麩炒　皂子炒黃各半兩

右件搗羅為細末用生薑汁打白麵糊和如黍米大每服十粒煎人參湯吞下量兒大小加減

千金治小兒口中涎出方

以白羊屎內口中

又方

以東行牛口中沫塗口中及頤上

又方

白汁塗之差

大小便不通

翰林待詔楊大鄴問小兒大小便秘澀者為何答曰乳食失度使之四大不調滋味有貪遂乃五臟受病甘甜聚食鹹酸滯留結於胃腸風壅積癖於心肺氣脈不順水穀不行雖不從於上焦卻秘結於下部小兒不知疼痛莫說因由啼叫以頻頻但怒脹而不乳不知孩兒痛刺連臍以面色青黃但按脈息與治當不見病根只依外變用藥安能得効　百問調理嬰孩傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚夾食真熱大小便閉澀不通煩躁作渴冷汗痰流夾積傷腸脹滿脹急青黃體瘦日夜大熱及瘡傷風傷暑驚癇客忤臟腑氣等熱並宜脫甲散主之傷寒亦可服大連翹湯瘡疹加大黃神芎治小兒驚風積熱大小便澀滯其効尤速又掩臍法用連根葱一莖不洗帶泥土生薑一塊淡豆豉二十一粒鹽一匙同研爛捏餅烘熱掩臍中以綿扎定良久氣透自通不然再換一劑

神芎丸　治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁多渴或大小

便澁滯或積熱腹滿驚風潮搐並皆治之

大黄生 黄芩各二兩 生牽牛末一兩

滑石肆兩 黄連 薄荷葉

川芎各半兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十丸食後溫水下一方加蒲黄止血證用

錢氏郁李仁丸 治襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲得溏動者

郁李仁去皮 川大黄去麁皮取實者剉酒浸半日控乾炒爲細末各一兩 滑石半兩研細

右先將郁李仁研成膏和大黄滑石丸如黍米大量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

犀角丸 治小兒風熱痰實面赤大小便秘澁三焦邪熱腑臟蘊毒疏導極穩

生犀末一分 人參去蘆 枳實去瓤

檳榔各半兩 黄連一兩 大黄二兩酒浸切片以巴豆去皮一百箇貼在大黄上紙裹飯上蒸三次切炒令黄焦去巴豆不用

右爲細末鍊蜜和丸如麻子大每服一二十丸臨臥熟水下未動加丸數亦治大人孕婦無損

葱根芍藥散 治大小便不通者

芍藥 大黄 甘草炙

當歸 朴硝各壹分

右爲末每服一大錢水一盞瓦器中煎至半盞去滓溫服即通

吉氏治大小便不通方

甘草節炮 槐花洗各壹兩

右件末每服一錢茶半錢湯點下

又方

滑石壹大錢 燈心壹握

右以水三碗煎至一盞溫服

千金秘錄用蜂房燒末酒服壹錢日再

掩臍法

海螄研擣壹箇 葱根帶土半箇 黑豆半箇

鹽少許

握宣丸 治小兒便難燥結或服澁藥腹脹悶亂命在須臾可用此丸不移時大小便自利

巴豆半壹錢 硫黄 良薑

附子 檳榔 甘遂各等分

右爲細末粟米飯和丸如菉豆大用椒湯洗小兒兩手男左女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗

去不用即止

千金灸法小兒大小便不通灸兩口吻各一壯

大便不通

百問小兒大便不通乃兒肺家有熱在裏流入大腸以致祕結不通乃實熱也當以四順清涼飲加柴胡熱甚者加山梔黃芩流利之其表裏俱熱者面黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便焦黃無汗者先解表以柴胡散傷寒汗之解後人便秘或腹疼者以清涼飲大柴胡湯承氣湯並見傷寒皆可下之積熱者神芎丸尤妙 醫因乳母或兒膏粱積熱及六淫七情鬱火傳兒爲患者用清邪解鬱之劑稟賦怯弱早近色慾大小便不通方見前見上便澀而小便牽痛者用滋補肺腎之劑褚氏遺書云男子精未滿而御女以通其精則四體有不滿之處異日有難狀之疾老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗精已耗而復竭之則大小便牽痛如淋今童子即有此患益見今人所稟與古人大徑庭矣人之氣血厚薄既殊而醫之用藥療法又豈可泥執古方而無加減之變乎 一小兒食粽停滯大便不通痛不可忍手足發搐用大柴胡湯調酒麯末一錢下滯穢甚多作嘔不食用五味異功散加升麻柴胡而愈 一小兒大便不通審乳母飲酒厚味所致

用清胃散以治母熱兒間飲以一二匙而愈後乳母感寒腹痛食薑酒之物兒大便秘結兼便血仍用清胃散每日數匙而愈 一小兒因乳母數怒大便不通兒亦患之兼用加味小柴胡湯並用保和丸二服後用五味異功散加升麻柴胡兒日飲數匙並愈

聖惠芎黃散 治小兒大便不通腹脇妨悶

芎藭半兩 川大黄剉碎微炒 郁李仁湯浸去皮微炒 各三分

右件藥搗細羅為散每服一錢以溫水半盞調服量兒大小以意分減以利為度張渙兼治大小便[illegible]

不通

嬰童寶鑑方用麻子以水研汁飲之